

تعداد صفحه: ۲	مدت امتحان: ۱۲۰ دقیقه	تاریخ امتحان: ۱۴۰۲/۰۲/۱۶	ساعت شروع: ۸ صبح
سؤالات میان نوبت درس: ریاضی ۳		رشته: علوم تجربی	نام و نام خانوادگی:
دانش آموزان روزانه دوره دوم متوسطه پایه دوازدهم شهر تهران در اودیبیهشت ماه سال ۱۴۰۲ اداره کل آموزش و پرورش شهر تهران			

ردیف	سؤالات	بارم
۱	<p>درستی یا نادرستی عبارات زیر را مشخص کنید.</p> <p>(الف) تابع <math>f(x) = -x^3 - 1</math> در دامنه‌ی خود اکیداً نزولی است.</p> <p>(ب) دامنه‌ی تابع <math>f(x) = -2 \tan\left(\frac{x}{3}\right)</math> برابر <math>\frac{2\pi}{3}k\pi + 2k\pi</math> است.</p> <p>(پ) نمودار <math>y = \sin 2x</math> از انبساط عمودی نمودار <math>y = \sin x</math> در راستای محور <math>y</math>ها بدست می‌آید.</p>	۰/۷۵
۲	<p>جاهای خالی را با عبارات مناسب کامل کنید.</p> <p>(الف) با توجه به مثبت بودن <math>r</math>، معادله‌ی <math>x^2 + y^2 + ax + by + c = 0</math> معادله‌ی یک دایره است اگر و تنها اگر رابطه‌ی ..... برقرار باشد.</p> <p>(ب) شکل حاصل از دوران یک مربع حول یک ضلع آن، ..... نام دارد.</p> <p>(پ) اگر صفحه <math>p</math> با مولد سطح مخروطی ..... و از رأس .....، شکل حاصل سهتمی نام دارد.</p> <p>(ت) هر نقطه‌ی اکسترم نسبی تابع، یک نقطه‌ی ..... آن است.</p>	۱/۲۵
۳	<p>اگر <math>f(x) = \frac{x}{x-3}</math>، <math>g(x) = \frac{2}{x}</math>، دامنه‌ی <math>fog(x)</math> را به دست آورید.</p>	۱/۲۵
۴	<p>وارون تابع زیر را به دست آورید.</p> $f(x) = 1 + \sqrt{x+2}$	۱
۵	<p>نمودار زیر مربوط به تابعی با ضابطه‌ی <math>y = a \cos bx + c</math> است. ضابطه‌ی تابع را مشخص کنید.</p>	۱/۵
۶	<p>جواب‌های کلی معادله‌ی مثلثاتی <math>\sin x - \cos 2x = 0</math> را به دست آورید.</p>	۱
۷	<p>حدود زیر را در صورت وجود، محاسبه کنید.</p> <p>(الف) <math>\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{x^2 - 1}{x - 1}</math></p> <p>(ب) <math>\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}^-} \frac{1}{\cos x}</math></p> <p>(پ) <math>\lim_{x \rightarrow \frac{1}{2}} \frac{4x^2 - 4x + 1}{2x^2 + x - 1}</math></p>	۰/۷۵
ادامه سوالات در صفحه دوم		

تعداد صفحه: ۲	مدت امتحان: ۱۲۰ دقیقه	تاریخ امتحان: ۱۴۰۲/۰۲/۱۶	ساعت شروع: ۸ صبح
سؤالات میان نوبت درس: ریاضی ۳		رشته: علوم تجربی	نام و نام خانوادگی:
دانش آموزان روزانه دوره دوم متوسطه پایه دوازدهم شهر تهران در اولین بهشت ماه سال ۱۴۰۲ اداره کل آموزش و پرورش شهر تهران			

ردیف	سؤالات	بارم
۸	مشتق بگیرید. (ساده کردن الزامی نیست.) $f(x) = (\sqrt{x} - 1)^2 \left(\frac{1}{x}\right)$	۱
۹	تابع $f(x) = \begin{cases} 2x-1 & x < 0 \\ x^2-1 & x \geq 0 \end{cases}$ را در نظر بگیرید. الف) نشان دهید $f'(0)$ وجود ندارد. ب) ضابطه تابع مشتق را بنویسید. پ) نمودار $f'$ رارسم کنید.	۲
۱۰	معادله حرکت متحرکی به صورت $f(t) = t^2 - 2t$ است. در چه زمانی سرعت لحظه‌ای با سرعت متوسط در بازه‌ی $[0, 4]$ برابر است؟	۱
۱۱	اگر تابع $f(x) = ax^2 + bx$ در $x = -1$ دارای مینیمم نسبی ۱ باشد، مقادیر $a, b$ را بیابید.	۱/۲۵
۱۲	مقدار ماکزیمم و مینیمم مطلق تابع $f(x) = \frac{4}{3}x^3 - x + 2$ در بازه‌ی $[0, 1]$ به دست آورید.	۱/۵
۱۳	نشان دهید در بین تمام مستطیل‌هایی با محیط ثابت ۲۴ سانتی‌متر، مستطیلی بیشترین مساحت را دارد که طول و عرض آن هم اندازه باشد.	۱/۵
۱۴	خروج از مرکز یک بیضی $\frac{2}{3}$ و طول قطر کانونی آن ۱۲ است. طول قطر کوچک بیضی و فاصله کانونی را به دست آورید.	۱/۲۵
۱۵	دو دایره‌ی زیر نسبت به هم چه وضعی دارند? $x^2 + y^2 + 2x - 4y = 9$ , $x^2 + y^2 - 2x + 4y = 4$	۲
	موفق باشید.	۲۰

۱) نادرست

۲) نادرست

۳) افق (۱)

۴) اسکرانه مولزی - عبور نامناسب

۵) افق (۲)

۶) بعتران

$$D_{f \circ g} = \{x | x \in D_g, g(x) \in D_f\}$$

۷) افق (۳)

$$D_g = \mathbb{R} - \{y\} \quad D_f = \mathbb{R} - \{y_0\}$$

$$\rightarrow D_{f \circ g} = \left\{ x | x \in \mathbb{R} - \{y\}, \frac{n}{g(x)} \neq 0 \right\} \rightarrow D_{f \circ g} = \mathbb{R} - \{y_0\}$$

$$f(x) = 1 + \sqrt{x+1} \quad x \geq 1 \rightarrow y - 1 = \sqrt{x+1}$$

۸) افق (۴)

$$(y-1)^2 = x+1 \rightarrow x = (y-1)^2 - 1 \rightarrow f^{-1}(x) = (x-1)^2 - 1$$

$$D_{f^{-1}} = [1, +\infty)$$

$$\max = 1 \rightarrow |a| + c = 1$$

۹) افق (۵)

$$\min = 0 \rightarrow -|a| + c = 0$$

$$\rightarrow c = 1, a = -1$$

$$T = \pi \rightarrow \frac{\pi}{|b|} = \pi \rightarrow |b| = 1$$

$$\rightarrow y = -\cos x + 1$$

$$\sin x - (1 - \sin x) = 0 \rightarrow \sin x + \sin x - 1 = 0$$

۱۰) افق (۶)

$$\rightarrow \sin x = t \rightarrow t^2 + t - 1 = 0 \rightarrow t^2 + t^2 + t - 1 = 0 \rightarrow t(t+1) + (t-1)(t+1) = 0$$

$$\rightarrow (t+1)(t+t-1) = 0 \rightarrow \begin{cases} t = -1 \rightarrow \sin x = -1 \rightarrow x = \frac{\pi}{k\pi} + \frac{\pi}{3} \\ t = \frac{1}{2} \rightarrow \sin x = \frac{1}{2} \rightarrow x = \frac{\pi}{k\pi} + \frac{\pi}{3} \end{cases}$$

$$x = \frac{\pi}{k\pi} + \frac{\alpha\pi}{3}$$

$$11) \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1 - \frac{1}{n^r}}{n-1} = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{n^r - 1}{n^r - n^r} \rightarrow \frac{n^r}{n^r} = 1$$

۱۲) افق (۷)

$$13) \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}^-} \frac{1}{\cos x} = \frac{1}{0^+} = +\infty$$

$$\begin{aligned} \text{1) } & \lim_{n \rightarrow \frac{1}{r}} \frac{r_n^r - rx + 1}{rx^r + x - 1} = \frac{0}{0} \xrightarrow{\text{L'Hopital}} \lim_{n \rightarrow \frac{1}{r}} \frac{(r_n - 1)^r}{r(r_n + 1)(x - \frac{1}{r})} \\ & = \lim_{n \rightarrow \frac{1}{r}} \frac{r(x - \frac{1}{r})^r}{r(r_n + 1)(x - \frac{1}{r})} = 0 \end{aligned}$$

$$f(x) = r(\sqrt{r}-1)(\frac{1}{r})(\frac{1}{r\sqrt{r}}) + (-\frac{1}{r^r})(\sqrt{r}-1)^r \quad (10/J/2020)$$

(الع)  $\lim_{n \rightarrow 0^-} f(x) = \lim_{n \rightarrow 0^+} f(x) = f(0) = -1 \quad (9/J/2020)$

$f'_+(0) = 0 \quad f'_-(0) = r \rightarrow f'_+(0) \neq f'_-(0) \rightarrow$  ممتلك وجورنال

$\therefore f(x) = \begin{cases} r & x < 0 \\ rx & x \geq 0 \end{cases}$

$$\begin{aligned} f(t) &= rt - 1 \quad \bar{v} = \frac{f(t) - f(0)}{t - 0} = \frac{rt - 1}{t} = r \\ \rightarrow rt - 1 &= v \rightarrow rt = 1 \rightarrow t = \frac{1}{r} \end{aligned} \quad (10/J/2020)$$

$$\begin{aligned} f(-1) &= -1 \rightarrow a - b = -1 \rightarrow a - ra = -1 \quad (11/J/2020) \\ f(-1) &= 0 \rightarrow ra(-1) + b = 0 \rightarrow b = ra \rightarrow \boxed{a = 1} \\ &\quad b = r \end{aligned}$$

$$f(x) = rx^r - 1 = 0 \rightarrow x = \pm \frac{1}{r} \quad (11/J/2020)$$

$$\rightarrow x = 0 \rightarrow f(0) = r$$

$$x = 1 \rightarrow f(1) = \frac{r}{r} - 1 + r = \frac{r}{r} \rightarrow \max \text{ values}$$

$$x = \frac{1}{r} \rightarrow f\left(\frac{1}{r}\right) = \frac{1}{r} - \frac{1}{r^r} + r = \frac{1 - r^r + r^r}{r^r} = \frac{1}{r^r} = \frac{1}{r} \rightarrow \min \text{ values}$$

$$y \boxed{x} \rightarrow P(n+y) = P \Sigma \rightarrow n+xy = P \quad (1) \text{ جمله اول}$$

$$\rightarrow y = P - n$$

$$S_{\max} = ny \xrightarrow{y=x} S = (P-n)^r$$

$$\rightarrow S' = P(P-n)(-1) = 0 \rightarrow n = P$$

$$y = P$$

$$e = \frac{r}{p} \quad rQ = P \rightarrow a = q \rightarrow e = \frac{c}{a} = \frac{r}{p} = \frac{c}{q} \quad (K \sqrt{\lambda})$$

$$rb = ? \quad rc = ? \rightarrow c = P$$

$$a^r = b^r + ec^r \rightarrow r^r y = b^r + 1^r \rightarrow b^r = P \rightarrow b = \sqrt[r]{P}$$

$$\rightarrow rb = \sqrt[r]{P}$$

$$rc = 1$$

$$A \text{ اجزا}: n^r + ey^r + Pn - ey - q = 0 \rightarrow {}^0 A = (-1, 1), R_A = \sqrt{1+1^2}$$

$$B \text{ اجزا}: n^r + ey^r - Pn + ey - r^r = 0 \rightarrow {}^0 B = (1, -1), R_B = P$$

$${}^0 A \cdot {}^0 B = \sqrt{(1-(-1))^r + (-1-1)^r} = \sqrt{r+1^r} = \sqrt{r}$$

$$|R_A - R_B| < \sqrt{r} < R_A + R_B \rightarrow \text{این مجموعه از اجزا است}$$

گروه آموزشی عصر