

بسم الله الرحمن الرحيم

تقسيم و پخش پذيرى

حسابان ۲

ماي دايس







یادآوری

توابع یکنوا و اکیدا یکنوا


تابع درجه سوم و ویژگی های آن




تست ۱ (یادآوری) : نمودار تابع $f(x) = |(x - 1)^3| + 2$ کدام است؟




ما درس




$$y = x^3$$



$$y = (x - 1)^3$$



$$y = |(x - 1)^3|$$



$$y = |(x - 1)^3| + 2$$

یک واحد به سمت راست

زیر محور لا ها را حذف
قرینه‌ی آن را با تابع اضافه می‌کنیم

۲ واحد به سمت بالا

تقسیم و بخش پذیری

صورت کلی قضیه تقسیم برای چند جمله ای ها :

$$f(x) = P(x)Q(x) + R(x)$$

مقسوم $\overleftarrow{}$

خارج قسمت $\overrightarrow{}$ مقسوم عليه

باقی مانده $\overrightarrow{}$

$f(x) \quad | \quad P(x)$
 \vdots
 \hline $Q(x)$
 $R(x)$

نگات مربوط به باقی مانده ($R(x)$)

در عبارت $f(x) = P(x)Q(x) + R(x)$

همواره درجهٔ $R(x)$ از $P(x)$ کوچکتر است. 

اگر $R(x) = 0$ آنگاه $f(x)$ بر $P(x)$ بخش پذیر است. 

باقی مانده تقسیم چند جمله‌ای $f(x)$ بر $\underbrace{ax+b}_{P(x)}$ برابر $(-\frac{b}{a})$ می‌باشد. 



تست ۲

باقیمانده تقسیم چند جمله‌ای $P(x)$ بر $-x^2 + 3x + 2$ به ترتیب $1, -4$ است. باقیمانده

تقسیم $P(x)$ بر $x^3 - 6x + 1$ کدام است؟

$$2x - 1 \quad (4)$$

$$-x + 2 \quad (3)$$

$$x + 1 \quad (2)$$

$$x - 1 \quad (1)$$

ما درس



چون درجه عبارت مقسوم عليه ما $(x^2 + x - 6)$ می باشد پس درجه ای باقی مانده ای ما **حداکثر ۱** می باشد یعنی:

$$R(x) = ax + b$$

$$f(x) = (x^2 + x - 6)Q(x) + ax + b \rightarrow \begin{cases} x=2: f(2)=1 \rightarrow 2a+b=1 \\ x=-3: f(-3)=-4 \rightarrow -3a+b=-4 \end{cases} \rightarrow \begin{cases} a=1 \\ b=-1 \end{cases}$$

$$R(x) = x - 1$$

ما درس

تست ۳



چندجمله ای $P(x) = (x^3 - 2)^n + (x - x^3 - 1)^{n-1}$ بر چند تا از عبارت های زیر قطعاً بخش پذیر است؟

پ) $x + 2$

ب) $x + 1$

الف) $x - 1$

۳) ۴

۲) ۳

۱) ۲

۰) صفر

ما درس

بررسی گزینه ها:

$$x = 1 \rightarrow P(1) = ((1)^3 - 2)^n + (1 - (1)^3 - 1)^{n-1} = (-1)^n + (-1)^{n-1}$$

۷ و ۱ - n دو عدد پشت سر هم بوده و قطعاً یکی از این دو زوج است در نتیجه یک جمله توان زوج داشته و مثبت شده



(+) و دیگری به توان فرد رسیده و منفی باقی می ماند (-) در نتیجه مجموع آن ها صفر و بخش پذیر است.

$$b) x = -1 \rightarrow P(-1) = ((-1)^3 - 2)^n + ((-1) - (-1)^3 - 1)^{n-1} = (-1)^n + (-1)^{n-1}$$



به همان شیوه ای بالا اثبات می شود !

$$p) x = -2 \rightarrow P(x) = ((-2)^3 - 2)^n + ((-2) - (-2)^3 - 1)^{n-1} = (2)^n + (5)^{n-1}$$



تُجزیه عبارات خاص

$$1) x^n - a^n = (x - a)(x^{n-1} + ax^{n-2} + \dots + a^{n-2}x + a^{n-1})$$

(به ازای تمامی مقادیر n)


$$2) x^n - a^n = (x + a)(x^{n-1} - ax^{n-2} + \dots + \color{red}{\textcircled{+}} a^{n-2}x \color{red}{\textcircled{-}} a^{n-1})$$

(به ازای n های زوج)

$$3) x^n + a^n = (x + a)(x^{n-1} - ax^{n-2} + \dots \color{red}{\textcircled{-}} a^{n-2}x \color{red}{\textcircled{+}} a^{n-1})$$

(به ازای n های فرد)

نکات پخش پذیری مربوط به اسلاید قبل



تست ۲



$$\frac{1-x+x^r-\dots+x^s-x^t+x^k}{1-x^r+x^s} = 5 \text{ کدام است؟}$$

-۲ (۴)

۲ (۳)

۱ (۳)

-۱ (۱)

ما درس

طبق نکته گفته شده داریم:

$$\begin{cases} (1+x^q) = (1+x)(1-x+x^r-\dots+x^s-x^v+x^w) \rightarrow 1-x+x^r-\dots+x^s-x^v+x^w = \frac{1+x^q}{1+x} \\ (1+x^q) = (1+x^r)(1-x^r+x^s) \rightarrow 1-x^r+x^s = \frac{1+x^q}{1+x^r} \end{cases}$$

$$\frac{1-x+x^r-\dots+x^s-x^v+x^w}{1-x^r+x^s} = \frac{\frac{1+x^q}{1+x}}{\frac{1+x^r}{1+x^q}} = \frac{1+x^r}{1+x} = 1-x+x^r = 0$$

$$\rightarrow x^r - x - 0 \rightarrow S = -\frac{b}{a} = -\left(\frac{-1}{1}\right) = +1$$

توجه:

یکی دیگر از روش هایی که برای پیدا کردن باقی مانده تقسیم به کار میرود (به ویژه برای معادلاتی که مقسوم علیه آن درجه دوم باشد) به صورت زیر است:

* برخلاف روش های قبلی ما معادله مقسوم علیه $ax^2 + bx + c = 0$ را حل نمی کنیم ولی با جابجا کردن جملات در طرفین

تساوی می توان با جایگذاری در معادله اصلی به نتایج جالبی برسیم !

مثال: $ax^2 + bx + c = 0 \rightarrow$
$$\begin{cases} x^2 = \frac{bx + c}{a} \\ ax^2 + bx = -c \\ \vdots \end{cases} \longrightarrow \text{(نیاز به حفظ کردن نمی باشد)}$$

ما درس



تست ۵:

اگر عبارت $a x^3 + 4x^3 - 14x + 10 - ax$ بخش پذیر

باشد a کدام است؟

۱ (۱)

۲ (۲)

۳ (۳)

۴ (۴)

ما درس

$$\begin{aligned}
 x^3 - 2x + 1 &= 0 \rightarrow x^3 = 2x - 1 \\
 \rightarrow ax^3 + 4x^3 - 14x + 1 &- a \\
 = axx^2 + 4x^3 - 14x + 1 &- a \\
 = ax(2x - 1) + 4(2x - 1) - 14x + 1 &- a \\
 = 2ax^2 - ax + 8x - 4 - 14x + 1 &- a \\
 = 2a(2x - 1) + (-a - 6)x + 6 - a & \\
 = (3a - 6)x + 6 - 3a &
 \end{aligned}$$

چون بخش پذیر است پس باقی مانده‌ی ما باید صفر باشد یعنی: $P(x^3 - 2x + 1) = 0$

$$\rightarrow 3a - 6 = 0 \rightarrow \boxed{a = 2}$$