








اداره مدارس استعدادی «دانشان» تهران

باسمه تعالی
سوالات آزمون نیمسال دوم
سال تحصیلی
درس: شیمی

مدت آزمون: ۱۲۰ دقیقه تعداد صفحات: ۴ صفحه



نام و نام خانوادگی:
نام دبیر: خانم‌ها ایمانی - ویسی‌زاده
پایه / رشته: یازدهم تجربی و ریاضی
تاریخ امتحان: ۱۳/۲۰
شماره صندلی:

ردیف	سوالات	بارم								
۱	کدام جمله درست و کدام نادرست است، در موارد نادرست جمله را بدون تغییر فعل اصلاح کنید. الف) واکنش: $MO(s) + X(s) \rightarrow$، در صورتی انجام‌پذیر است که واکنش‌پذیری $X < M$ باشد. ب) در شرایط یکسان، یک تکه سیب‌زمینی سریع‌تر از یک تکه نان خنک می‌شود، پس ظرفیت گرمایی ویژه سیب‌زمینی کم‌تر است. پ) از واکنش اتن، با هیدروژن کلرید، وینیل کلرید به دست می‌آید. ت) آرایش الکترونی یون X^{2+} به $3d^4$ ختم می‌شود پس تعداد الکترون‌ها با $L = 0$ در آرایش الکترونی اتم X، شش است.	۲								
۲	واکنش ترموشیمیایی مقابل را در نظر بگیرید: $2SO_3(g) \rightarrow 2SO_2(g) + O_2(g) \quad \Delta H = +192 \text{ kJ}$ اگر مقداری گوگرد تری اکسید در واکنشی بطور کامل تجزیه شود و برای تأمین گرمای واکنش از سوزاندن ۱۰ گرم کیک شامل ۳۰ درصد چربی، ۴۰ درصد کربوهیدرات و ۳۰ درصد پروتئین استفاده شود، با در نظر گرفتن جدول زیر، پس از پایان واکنش در شرایطی که چگالی گاز اکسیژن $\frac{g}{L} = 1.43$ است، چند لیتر گاز در ظرف واکنش وجود دارد؟ ($O = 16, S = 32 : \frac{g}{mol}$) <table><tr><th>ماده غذایی</th><th>کربوهیدرات</th><th>چربی</th><th>پروتئین</th></tr><tr><td>ارزش سوختی $\frac{kJ}{g}$</td><td>۲۰</td><td>۴۰</td><td>۲۰</td></tr></table>	ماده غذایی	کربوهیدرات	چربی	پروتئین	ارزش سوختی $\frac{kJ}{g}$	۲۰	۴۰	۲۰	۳/۲۵
ماده غذایی	کربوهیدرات	چربی	پروتئین							
ارزش سوختی $\frac{kJ}{g}$	۲۰	۴۰	۲۰							
بقیه سوالات در صفحه ۲ نمره با عدد: نمره با حروف: امضای دبیر										

۳	از واکنش ۱۶۰ گرم آهن (III) اکسید ۸۰ درصد خالص با گاز هیدروژن، چند گرم آهن با خلوص ۹۵٪، به دست می‌آید. بازده درصدی این واکنش را برابر ۷۰ درصد در نظر بگیرید. ($O = ۱۶, Fe = ۵۶$) $Fe_2O_3(s) + H_2(g) \rightarrow Fe(s) + H_2O(g)$ (واکنش موازنه نشده است)	۲/۲۵
۴	گروه‌های عاملی ساختار زیر را با ذکر نام مشخص کنید. آیا این ترکیب محلول در آب است یا چربی؟ چرا؟ 	۲
۵	جاهای خالی خواسته شده را با فرمول یا نام خواسته شده پر کنید. $CH_3 \quad H \quad H \quad H$ $ \quad \quad \quad $ $H_3C - C - C - C - C - CH_3$ $ \quad \quad \quad $ $CH_3 \quad OH \quad H \quad H$ (الف) + $H_2O \xrightarrow{H^+}$ (ب) n :  $\xrightarrow{\text{گرما و فشار}}$ (نام مونومر) (پ)  +  $\xrightarrow{\text{.....}}$ + H_2O (نام و ساختار استر) (ت) n + n $\rightarrow$  + nH_2O	۲

۶	با توجه به داده‌های زیر، حساب کنید آنتالپی پیوند $O - F$ چند kJ/mol است؟ $O_2(g) + 2HF(g) \rightarrow OF_2(g) + H_2O(g) \quad \Delta H = -231 \text{ kJ}$ <table><tr><td>آنتالپی kJ/mol</td><td>۴۶۳</td><td>۵۶۷</td><td>۴۹۵</td></tr><tr><td>پیوند</td><td>$O - H$</td><td>$H - F$</td><td>$O = O$</td></tr></table>	آنتالپی kJ/mol	۴۶۳	۵۶۷	۴۹۵	پیوند	$O - H$	$H - F$	$O = O$	۱
آنتالپی kJ/mol	۴۶۳	۵۶۷	۴۹۵							
پیوند	$O - H$	$H - F$	$O = O$							
۷	از بین کلمات داخل پرانتز، برای هر مورد واژه صحیح را انتخاب کنید. الف) در ساختار رازیانه گروه عاملی (هیدروکسیل / اتر) وجود دارد. ب) کولار از جمله پلیمرهایی است که در (جلیقه ضدگلوله / بدنه هواپیما) بکار می‌رود. پ) (کلر / برم) با گاز هیدروژن در دمای اتاق واکنش نمی‌دهد. ت) عنصر (Pb / Si) بر اثر ضربه تغییر شکل می‌دهد و خرد نمی‌شود.	۱								
۸	با توجه به واکنش‌های ترموشیمیایی زیر در واکنش: $ClF(g)$ با $F_2(g)$ که منجر به تشکیل $ClF_3(l)$ می‌شود به ازای تولید $18/5$ گرم محصول، چند kJ گرما مبادله می‌شود. ($F = 19, Cl = 35/5$) $2ClF(g) + O_2(g) \rightarrow Cl_2O(g) + OF_2(g) \quad \Delta H = 167/5 \text{ kJ}$ $2F_2(g) + O_2(g) \rightarrow 2OF_2(g) \quad \Delta H = -43/5 \text{ kJ}$ $2ClF_3(l) + 2O_2(g) \rightarrow Cl_2O(g) + 3OF_2(g) \quad \Delta H = 394/1 \text{ kJ}$	۲								

۲/۲۵	۹	۵/۶ لیتر گاز N_2O_5 را در شرایط STP در ظرفی گرما می‌دهیم و پس از گذشت ۲۰ ثانیه، ۲۰ درصد آن تجزیه می‌شود. $2N_2O_5(g) \rightarrow 4NO_2(g) + O_2(g)$ الف) سرعت متوسط تولید گاز NO_2 بر حسب مول بر دقیقه چقدر است؟ ب) سرعت واکنش چند مول بر ثانیه است؟ پ) استفاده از بازدارنده چه تأثیری بر واکنش دارد؟
۱/۲۵	۱۰	در هر مورد با توجه به ویژگی‌های خواسته شده آن‌ها را با هم مقایسه کنید. الف) انحلال پذیری در آب ☐ اتانویک اسید ☐ هگزانویک اسید ب) تعداد اتم‌های سازنده ☐ نایلون ☐ گلوکز پ) مقاومت ☐ ۱۰۰۰ گرم فولاد ☐ ۱۰۰۰ گرم کولار ت) نقطه جوش ☐ اتانویک اسید ☐ متیل متانوات ث) آنتالپی سوختن ☐ اتانول ☐ اتان
۱	۱۱	به سوالات زیر پاسخ کوتاه و کامل دهید. الف) یک نمونه پلیمر سبز مثال بزنید و دو کاربرد برای آن بنویسید. ب) یکی از ویژگی‌های تفلون را نام ببرید.
۲۰	جمع	

ردیف	کلید	بارم
۱	الف) نادرست $X > M$ (ب) دیرتر خنک می شود. پ) نادرست (کلرو اتان) $C \equiv C + HCl \rightarrow CH_3CH_2Cl$ $X:L = ۰$ تا ۸ $3d^4 4s^2$: آرایش الکترونی (ت)	۲
۲	$۱۰ \times \frac{۳۰}{۱۰۰} \times \frac{۴۰ \text{ kJ}}{۱ \text{ g}} = ۱۲۰ \text{ kJ}$ انرژی حاصل از چربی جمع کل انرژی آزاد شده $۱۲۰ + ۸۰ + ۶۰ = ۲۶۰ \text{ kJ}$ $۱۰ \times \frac{۴۰}{۱۰۰} \times \frac{۲۰ \text{ kJ}}{۱ \text{ g}} = ۸۰ \text{ kJ}$ انرژی حاصل از کربوهیدرات $۱۰ \times \frac{۳۰}{۱۰۰} \times \frac{۲۰ \text{ kJ}}{۱ \text{ g}} = ۶۰ \text{ kJ}$ انرژی حاصل از پروتئین $۲۶۰ \text{ kJ} \times \frac{۱ \text{ mol}}{۱۹۲ \text{ kJ}} \times \frac{۳۲ \text{ g}}{۱ \text{ mol}} \times \frac{۱ \text{ L}}{۰/۶ \text{ g}} = ۷۲/۲ \text{ LO}_۲$ چون ضریب مولی $SO_۲$ دو برابر $O_۲$ است پس حجم آن می شود: $۷۲/۲ \times ۲ = ۱۴۴/۴ \text{ LSO}_۲$ $۷۲/۲ + ۱۴۴/۴ = ۲۱۶/۴ \text{ L}$	۳/۲۵
۳	$\cancel{۱۶۰} \times \cancel{۱} \times \frac{۱ \text{ mol}}{\cancel{۱۶۰} \text{ g}} \times \frac{۲ \text{ mol}}{۱ \text{ mol}} \times \frac{۵۶ \text{ g}}{۱ \text{ mol Fe}} \times \frac{۸۰}{۱۰۰} \times \frac{۷۰}{\cancel{۱۰۰}} \times \frac{\cancel{۱۰۰}}{۹۵} = ۶۶/۰۲$	۲/۲۵
۴	آمینو - کربوکسیلیک اسید - آمیدی - کتونی - اتری - آروماتیک محلول در آب، چون مولکول قطبی می باشد و توانایی تشکیل پیوند هیدروژنی را دارد.	۲
۵	الف) $C \begin{array}{c} \\ C-C-C \\ \end{array} = C \begin{array}{c} C \\ \\ C-C \end{array}$ (۰/۲۵) ب) نام مونومر: ۱ و ۱ دی کلرو - ۱ - پروپین $\left(\begin{array}{c} Cl \\ \\ (CH_2-CH) \\ \\ Cl \end{array} \right)$ پ) بوتیل پنتانوات  ت) $H_۲N-(CH_۲)_۲-NH_۲$ 	۲

هنمای تصحیح آزمون درس: شیمی پایه‌ی: یازدهم رشته‌ی: ریاضی و تجربی نیمسال دوم												
دیران‌فرزادگان ۷ صفحه‌ی ۲												
ردیف	کلید	بارم										
۶	۱ $O_2(g) + 2HF(g) \rightarrow OF_2(g) + H_2O(g) \quad \Delta H = -231$ [مجموع آنتالپی پیوند فرآورده‌ها] - [مجموع آنتالپی پیوند واکنش‌دهنده‌ها] = ΔH واکنش $O=O + 2H-F \rightarrow O-F + \begin{array}{c} O \\ / \quad \backslash \\ F \quad H \quad H \end{array}$ <table><tr><th>پیوند</th><th>آنتالپی kJ/mol</th></tr><tr><td>O - H</td><td>۴۶۳</td></tr><tr><td>H - F</td><td>۵۶۷</td></tr><tr><td>O = O</td><td>۴۹۵</td></tr></table> $[495 + 2(567)] - [2(O-F) + 2(463)] = -231$ $1629 + 230 - 926 = 2(O-F) \Rightarrow O-F = 467$	پیوند	آنتالپی kJ/mol	O - H	۴۶۳	H - F	۵۶۷	O = O	۴۹۵	۱		
پیوند	آنتالپی kJ/mol											
O - H	۴۶۳											
H - F	۵۶۷											
O = O	۴۹۵											
۷	الف) اتر (ب) جلیقه ضد گلوله (پ) برم (ت) Pb هر قسمت ۰/۲۵	۱										
۸	۲ $ClF(g) + F_2(g) \rightarrow ClF_3(l)$ واکنش اصلی واکنش ۱) $\times \frac{1}{2}$ واکنش ۲) $\times \frac{1}{2} \quad 83/5 + (-21/75) + (-197/0.5) = -135/0.5 \text{ kJ}$ واکنش ۳) $\times \frac{1}{2}$ عکس $? \text{ kJ} = 18/5 \text{ g ClF}_3 \times \frac{1 \text{ mol}}{92/5 \text{ g}} \times \frac{135/0.5}{1 \text{ mol}} = 27/0.1 \text{ kJ}$	۲										
۹	۲/۲۵ $5/6 \times \frac{20}{100} = 1/12 \text{ L}$ $1/12 \times \frac{1 \text{ mol}}{22/4} = 0.05 \text{ mol} \quad 20 \text{ s} \rightarrow \frac{1}{3} \text{ min}$ $\overline{RN_2O_5} = \frac{-\Delta n}{\Delta t} - \frac{-(-0.05)}{\frac{1}{3}} = +0.15 \frac{\text{mol}}{\text{min}}$ $\frac{\overline{RN_2O_5}}{RNO_2} = \frac{2}{4} \Rightarrow RNO_2 = 0.3 \frac{\text{mol}}{\text{min}}$ $R_{\text{واکنش}} = \frac{\overline{RNO_2}}{2} = \frac{\overline{RNO_2}}{4} = \frac{0.3}{4} \times \frac{1 \text{ min}}{60 \text{ s}} = 1/25 \times 10^{-3}$ (پ) سرعت واکنش را کاهش یا زمان انجام واکنش کوتاه می‌شود.	۲/۲۵										
۱۰	الف) اتانوائیک اسید < هگزانوائیک اسید (ب) نایلون < گلوکز (پ) فولاد > کولار (ت) اتانوائیک اسید < متیل متانوات (ث) اتان < اتانول	۱/۲۵										
۱۱	الف) پلی لاکتیک اسید. سفره سطل زباله - وسائل آشپزخانه - کیسه پلاستیکی (دو مورد کافی است). (ب) نجسب بودن، نقطه ذوب بالا - در حلال‌های آلی حل نمی‌شود.	۱/۲۵										
جمع بarm: ۲۰												