

زاویه مرکزی، وتر

دایره: مکان هندسی نقاطی از صفحه که از نقطه ثابتی واقع در آن صفحه به فاصله یکسان هستند. نقطه ثابت را مرکز

دایره و فاصله یکسان را شعاع دایره می‌گویند.

هر دایره صفحه را به ۳ بخش افزای می‌کند:

الف) نقاط درون دایره: نقطه A داخل دایره‌ای به مرکز O و شعاع R قرار دارد اگر $\overline{OA} < R$


ب) نقاط روی محیط دایره: نقطه A روی محیط دایره‌ای به مرکز O و شعاع R قرار دارد اگر $\overline{OA} = R$

ج) نقاط خارج دایره: نقطه A خارج دایره‌ای به مرکز O و شعاع R قرار دارد اگر $\overline{OA} > R$


وضعیت نسبی یک خط و یک دایره

خط قاطع نسبت به دایره: خط راستی که دایره را در دو نقطه قطع کند.

خط مماس بر دایره: خطی که فقط در یک نقطه دایره را قطع می‌کند که در آن نقطه هم بر شعاع دایره عمود است.




خط Δ : قاطع نسبت به دایره




خط d : مماس بر دایره

اگر قاطع رسم شده از نقطه M واقع در صفحه‌ی یک دایره، آن دایره را در دو نقطه‌ی A و B قطع می‌کند، آنگاه پاره خطهای MA و MB را دو قطعه‌ی قاطع رسم شده از نقطه‌ی M و یا به صورت خلاصه، دو قطعه‌ی قاطع می‌نامند.



(نقطه‌ی M داخل دایره است)




(نقطه‌ی M خارج دایره است)

شعاع: پاره خطی که مرکز دایره را به نقطه‌ای روی محیط دایره وصل می‌کند.

وتر: پاره خطی که دو نقطه متمایز از محیط یک دایره را به هم وصل می‌کند.


قطر: بزرگترین وتر دایره است که از مرکز دایره عبور می‌کند. هر قطر دایره را به دو کمان مساوی تقسیم می‌کند. این کمان‌های مساوی را نیم‌دایره می‌نامند.

زاویه‌ی مرکزی: زاویه‌ای که رأس آن روی مرکز دایره و دو ضلع آن، دو شعاع از دایره می‌باشند. این زاویه، روی محیط دایره، کمانی بوجود می‌آورد که به آن کمان نظیر آن زاویه‌ی مرکزی می‌گویند. بنا به قرارداد اندازه‌ی این کمان را با اندازه‌ی زاویه‌ی مرکزی یکسان می‌گیرند.



تذکر: دقت کنید که نباید اندازه یک کمان را با طول آن اشتباه گرفت. برای درک این مطلب به شکل روبرو نگاه کنید. در این شکل سه دایره هم‌مرکز رسم شده است. با توجه به مطلب بالا، اندازه کمان‌های AB , A_1B_1 و A_1B_2 برابرند.

***نکته:** الف) اندازه طول کمان AB به صورت زیر محاسبه می‌شود:



ب) اندازه مساحت قطاع حاصل از این کمان هم به صورت زیر می‌باشد:


مای‌درس

گروه آموزشی عصر


www.my-dars.ir

قضیه: یک خط و یک دایره بر هم مماس‌اند اگر و تنها اگر این خط در نقطه تماس با دایره بر شعاع آن نقطه عمود باشد.


مسئله ۱: در هر دایره، قطر عمود بر وتر، آن وتر و کمان‌های نظیر آن را نصف می‌کند.




مسئله ۲: ثابت کنید در هر دایره، خطی که مرکز دایره را به وسط یک وتر وصل می‌کند، بر آن وتر عمود است.




مسئله ۳: ثابت کنید در هر دایره، خطی که مرکز دایره را به وسط کمان نظیر یک وتر از آن دایره وصل می‌کند، عمودمنصف آن وتر است.




مسئله ۴: ثابت کنید خطی که وسط یک کمان و وتر متناظر آن کمان را به هم وصل می‌کند، از مرکز دایره می‌گذرد.



مسئله ۵: ثابت کنید در یک دایره، کمان‌های نظیر دو وتر مساوی، باهم برابرند و برعکس.




مسئله ۶: ثابت کنید در هر دایره، وترهای مساوی، از مرکز دایره به یک فاصله‌اند و برعکس.




مسئله ۷: ثابت کنید در یک دایره، اگر دو وتر نامساوی باشند، آنگاه وتری که بزرگتر است به مرکز دایره نزدیکتر است و

بر عکس.



مسئله ۸: ثابت کنید، کوچکترین وتری که از یک نقطه واقع در درون یک دایره می‌توان رسم کرد، وتری است که بر قطر گذرنده از آن نقطه، عمود است.




مای درس

گروه آموزشی عصر

www.my-dars.ir


- ۱- با توجه به شکل‌های انتهای صفحه یک ثابت کنید در هر دو حالت در بین نقطه‌های روی دایره، A نزدیک‌ترین نقطه به M و B دورترین نقطه به M است.

۲- در دایره‌ی $(O, 26)$ ، فاصله‌ی وتر AB از مرکز دایره 10 می‌باشد. طول وتر AB چقدر است؟



۳- در دایره‌ای به مرکز O و به قطر CI ، داریم $CA \parallel ON$. ثابت کنید $\widehat{AN} = \widehat{NI}$.

۴- در شکل مقابل اگر طول کمان AB برابر 2π و زاویه مرکزی نظیر آن 40° درجه باشد، طول OA را بدست آورید.





مای درس

گروه آموزشی عصر

www.my-dars.ir

- ۵- در دو دایره شکل مقابل، طول های دو کمان AB و CD برابرند. اگر شعاع دایره ها 5 و 2 و زاویه $\angle BOA = 30^\circ$ باشد، اندازه زاویه $\angle DKC$ چند درجه است؟



- ۶- ثابت کنید قطر دایره بزرگترین وتری است که می توان در دایره رسم کرد.

مای درس

گروه آموزشی عصر


www.my-dars.ir

انواع زاویه در دایره

(۱) زاویه مرکزی

تعریف (یادآوری): زاویه‌ای که رأس آن روی مرکز دایره و دو ضلع آن، دو شعاع از دایره می‌باشند. این زاویه، روی محیط دایره، کمانی بوجود می‌آورد که به آن، کمان نظیر آن زاویه مرکزی می‌گویند. بنا به قرارداد اندازه‌ی این کمان را با اندازه‌ی زاویه مرکزی یکسان می‌گیرند.

مثال: در هریک از دایره‌های زیر اندازه مقادیر مجهول را بدست آورید.



مای درس

گروه آموزشی عصر


(۲) زاویه مختصی

www.my-dars.ir


تعریف: زاویه‌ای که رأس آن روی دایره و اضلاعش دو وتر از دایره باشند.

کمان‌هایی از دایره را که به دو ضلع زاویه مختصی محدود و در داخل زاویه واقع است، را کمان روبرو به آن زاویه می‌نامند.


قضیه: اندازه‌ی هر زاویه‌ی محاطی برابر با نصف کمان روبرویش است. (برای اثبات اول باید از شکل ۱ شروع کرد، سپس سراغ ۲ شکل دیگر رفت. در ضمن باید بدانیم به غیر از این ۳ حالت، حالت دیگری وجود ندارد)



(شکل ۱)




(شکل ۲)



(شکل ۳)

مثال: در دایره شکل مقابل اندازه زاویه A را بدست آورید.





اثبات:

مای درس

گروه آموزشی عصر



نتیجه ۱: در هر دایره، اندازه زاویه‌های محاطی روبروی یک کمان، با هم برابرند.

www.my-dars.ir




نتیجه ۲: زاویه محاطی روبرو به قطر دایره ۹۰ درجه است. چون قطر دایره، دایره را به دو کمان ۱۸۰ درجه تقسیم می‌کند.


مثال: در هریک از دایره‌های زیر، اندازهٔ مقدارهای مجهول را بدست آورید.



مثال: در دایره مقابله AB قطر و $CD = BC$ است. مقدار α چند درجه است؟



قضیه: در هر دایره، کمان‌های محصور بین دو وتر موازی، باهم برابرند. (راهنمایی: از ویژگی زاویه محاطی یا قطر عمود بر وتر استفاده شود)



ماهی درس

گروه آموزشی عصر



* عکس این قضیه صحیح است؟

www.my-dars.ir

تمرین: با استفاده از تعریف زاویه محاطی، نشان دهید مجموع زوایای داخلی هر مثلث 180° است.

ساده حسن نیری یور ۱۱


مثال: در شکل مقابل، AB قطر نیم‌دایره و O مرکز آن است. اگر $CD \parallel AB$ باشد. اندازه کمان CD را بدست آورید.



مثال: در شکل مقابل، AB قطر دایره و $DE \parallel BC$ نسبت اندازه کمان‌های CE و AC برابر ۵ به ۶ است. اندازه کمان DE چند درجه است؟


(۳) زاویه‌ی ظلی

تعریف: زاویه‌ای که رأس آن روی محیط دایره، یک ضلعش وتری از دایره و ضلع دیگرش مماس بر دایره است.




قضیه: اندازه هر زاویه‌ی ظلی برابر است با نصف کمان روبرویش. ($T\hat{A}B = \frac{\widehat{AB}}{2}$)


مثال: در دایره زیر مقدار مجهول را بدست آورید.



مثال: در شکل مقابل، AC در نقطه A بر دایره مماس، $AB = AC$ و $B\hat{A}D = 60^\circ$ است. اندازه $D\hat{A}C$ کدام است؟



مثال: در شکل رویرو $AB = AC$ و $\widehat{AC} = 130^\circ$ و CT در نقطه C بر دایره مماس است. اندازه زاویه BCT چقدر است؟



ماهی درس


گروه آموزشی عصر

www.my-dars.ir


تمرین: دو روش دیگر برای اثبات رابطه زاویه ظلی به شرح زیر است: (۱) با استفاده از ویژگی قطر عمود بر AB (۲) با

استفاده از خطی موازی AT از نقطه‌ی B

مسئله: خط XY در نقطه‌ی A بر دایره مماس است. وتر BB' را موازی XY رسم کرده‌ایم. ثابت کنید: $\widehat{AB} = \widehat{AB'}$



مای درس




مثال: در دایره مقابل با مرکز O اگر AT مماس بر دایره و $\hat{A} = \hat{B}$ باشد، اندازه‌ی کمان TC کدام است؟


www.my-dars.ir

۱۴) زاویه‌ی بین دو وتر و بین امتداد دو وتر

قضیه: اندازه‌ی زاویه‌ای که از برخورد دو وتر در یک دایره ایجاد می‌شود برابر نصف مجموع دو کمانی از دایره است که به




$$(AM\widehat{B} = \frac{\widehat{AB} + \widehat{A'B'}}{2})$$




مثال: در شکل زیر اندازه x را محاسبه کنید.

قضیه: اندازه‌ی زاویه‌ای که از برخورد امتداد دو وتر از دایره ایجاد می‌شود، برابر قدر مطلق نصف تفاضل اندازه‌ی کمان‌هایی






$$(AM\widehat{B} = \frac{|\widehat{AB} - \widehat{A'B'}|}{2})$$

مثال: در شکل مقابل اندازه زاویه α را بدست آورید.



مثال: در هر دایره اندازه مقادیر مجهول را تعیین کنید.




مای درس

گروه آموزشی عصر

www.my-dars.ir

۵) زاویه بین مماس و وتر و بین دو مماس


مسئله: خط مماس بر دایره در نقطه‌ی T امتداد وتر AA' از دایره را در نقطه‌ی M قطع کرده است. ثابت کنید:



$$\widehat{AMT} = \frac{\widehat{AT} - \widehat{A'T}}{2}$$

مسئله: ثابت کنید زاویه‌ی بین دو خط مماس رسم شده از دو نقطه‌ی T و T' بر یک دایره، برابر قدر مطلق نصف تفاضل

دو کمان ایجاد شده بین نقاط T و T' است.




مای درس



گروه آموزشی عصر

www.my-dars.ir



مثال: در شکل مقابل اندازه زاویه A چند درجه است؟



۱) در دایره‌های زیر به مرکز O مقدارهای مجهول را بدست آورید.



۲) در شکل مقابل ABCD متوازی‌الاضلاع و BC قطر نیم‌دایره است. مساحت متوازی‌الاضلاع کدام است؟




۳) مماس AC با وتر AB برابر است.

ثابت کنید مثلث DCA متساوی‌الساقین است.

مای درس

گروه آموزشی عصر


www.my-dars.ir




۴) DIAN متوازی‌الاضلاع است.




نقاط I، A و M روی یک خط راست هستند.

ثابت کنید: $DM = DI$






لطفاً.

۶) در شکل مقابل اندازه زاویه α را بدست آورید.۷) در شکل زیر اضلاع زاویه‌های B و C بر دایره مماس‌اند. اندازه زاویه A چند درجه است؟۸) در شکل روبرو، O مرکز نیم‌دایره است و $AB \parallel CD$. اندازه کمان CD را بدست آورید.۹) در شکل زیر AB قطری از دایره است و وترهای AC و BD موازی‌اند. ثابت کنید

$$AC = BD$$

مای درس




گروه آموزشی عصر

۱۰) دایره $C(O,R)$ مفروض است. از نقطه M در خارج دایره خطی چنان رسم کردہ‌ایم که دایره را در دو نقطه A و B قطع کرده است و $MA = R$ نشان

$$\beta = 3\alpha$$

تمرینات تکمیلی


۱) در هر یک از اشکال زیر، x و y را بدست آورید.



۲) از نقطه‌ی M خارج دایره، مماسی بر دایره رسم کنید.

۳) در درون مثلث ABC ، نقطه‌ای مانند M چنان بپیدا کنید که $\widehat{AMB} = \widehat{BMC} = \widehat{CMA}$ باشد.

۴) از مثلث ABC ، معلومات $\widehat{A} = \alpha$ ، $BC = a$ و r شعاع دایره‌ی محاطی را داریم. این مثلث را رسم کنید.






۵) با توجه به شکل رویرو، هر یک از موارد زیر را تعیین کنید.

الف) اگر $\widehat{AMB} = 65^\circ$ باشد، اندازه‌ی $\widehat{A'B} + \widehat{AB'}$ را بدست آورید.

ب) اگر $\widehat{AMB} = 60^\circ$ و $\widehat{AB'} = 160^\circ$ باشد، اندازه‌ی $\widehat{A'B}$ را بدست آورید.

ج) اگر $\widehat{AB} = 2\widehat{A'B}$ و $\widehat{A'MB} = 120^\circ$ باشد، اندازه‌ی \widehat{AB} را بدست آورید.

۶) در شکل‌های زیر، مجهولات خواسته شده را بدست آورید.




۷) در شکل زیر، O مرکز دایره و $OC = AE$ است. مقدار x را بدست آورید.

www.my-dars.ir


۸) خط مماس بر دایره در نقطه‌ی T و امتداد وتر AB ، در نقطه‌ی M متقاطعند. اگر اندازه‌ی کمان‌های \widehat{AT} ، \widehat{BA} و \widehat{TB} به

ترتیب با اعداد ۱، ۴ و ۷ متناسب باشند، اندازه‌ی زاویه‌ی M چقدر است

۹) با توجه به شکل x را بدست آورید.




۱۷) در شکل زیر اگر \widehat{M} کدام است؟ $\frac{a}{2} = \frac{b}{3} = \frac{c}{5}$ باشد،




۱۸) ذوزنقه‌ی متساوی الساقینی محاط در دایره است. اگر کمان‌های نظیر قاعده‌ی کوچک و ساق آن به ترتیب 50° و 70° باشد،


زوایای بین دو قطر و امتداد ساق‌ها به ترتیب از راست به چپ کدام است؟



۱۹) در شکل زیر حاصل $x + y$ کدام است؟




۲۰) در شکل زیر O مرکز دایره است. اگر $\hat{AOE} = 130^\circ$ و $\hat{A} = 30^\circ$ باشد، اندازه‌ی \hat{BDE} کدام است؟




ماه درس

۱۰) در شکل مقابل اگر $\hat{EF} = 110^\circ$ ، $\hat{CD} = 40^\circ$ و $\hat{AB} = 60^\circ$ باشد، آنگاه زاویه‌ی $F\hat{C}D$ چند درجه است؟




www.my-dars.ir


۱۱) در شکل زیر اگر a ، b ، c و d به ترتیب با اعداد ۸ ، ۹ ، ۱۲ و ۷ متناسب باشند، اندازه‌ی x بر حسب درجه کدام است؟




۱۲) در شکل زیر میانگین M وسط کمان EF و $\widehat{BC} = 50^\circ$ است. اندازهای $\widehat{B} + \widehat{D}$ چند درجه است؟



۱۳) در شکل زیر $\widehat{E} = 17^\circ$ و H وسط قطر CB میباشد. کمان \widehat{CD} چند درجه است؟



۱۴) در دایره‌ای به مرکز O ، قطر AB و وتر AC از آن مفروض‌اند. نیمساز $C\hat{A}B$ را رسم می‌کنیم تا دایره را در نقطه‌ی D قطع کند. تفاضل دو زاویه‌ی $C\hat{A}D$ و $A\hat{C}D$ کدام است؟




۱۵) با توجه به شکل روی‌رو :

الف) اگر $\widehat{y} = 140^\circ$ ، آنگاه اندازهی x را بدست آورید.

ب) اگر $\widehat{x} = 165^\circ$ ، آنگاه اندازهی کمان \widehat{y} را بدست آورید.


۱۶) با توجه به شکل روی‌رو :



الف) اگر طول شعاع 10 و $PR = 6$ ، آنگاه طول AP و AB را بدست آورید.

ب) اگر $RC = \sqrt{2}$ و $RQ = CQ = QD = DQ$ ، آنگاه طول پاره خط‌های CQ ، DQ و CD را بدست آورید.


۱۷) در شکل زیر، اگر $DF = AC$ و $BC = EF$ باشد، ثابت کنید : $AB = DE$



www.my-dars.ir

۱۸) در دایره‌ای به قطر AB وتر CD موازی قطر AB رسم شده است. اندازهای $\widehat{ACD} - \widehat{ADC}$ کدام است؟

۱۹) در شکل زیر O مرکز دایره و $\hat{A} = 56^\circ$ است. کمان \widehat{AE} چند درجه است؟



مای درس


گروه آموزشی عصر

www.my-dars.ir


«درس دوم: رابطه‌های طولی در دایره»

روابط طولی در دایره

قضیه: دو وتر AA' و BB' یکدیگر را داخل دایره در نقطه M قطع می‌کنند. ثابت کنید :




قضیه: امتداد دو وتر AA' و BB' یکدیگر را خارج دایره در نقطه M قطع می‌کنند. ثابت کنید :




عكس قضیه: اگر دو پاره خط AA' و BB' در نقطه‌ی M یکدیگر را طوری قطع کنند که $MA \times MA' = MB \times MB'$

آنگاه چهار نقطه‌ی A ، A' ، B و B' روی یک دایره‌اند.

قضیه: اگر از یک نقطه، یک مماس و یک قاطع نسبت به یک دایره رسم کنیم، قطعه‌ای از خط مماس مخصوص بین آن نقطه و نقطهٔ تماس، واسطهٔ هندسی بین دو قطعهٔ قاطع است.



عكس قضیه: سه نقطهٔ M ، A و A' روی یک خط و نقطهٔ T خارج آن قرار دارند. اگر $MT^r = MA \cdot MA'$ باشد، از سه نقطهٔ A ، A' و T دایره‌ای می‌گذرد که در نقطهٔ T بر خط MT مماس است.









مای درس

گروه آموزشی عصر


www.my-dars.ir

مثال: مقادیر مجهول را بدست آورید.


	$MA = 4, MB = 3, MA' = 6, BB' = ?$
	$AA' = 32, MB = 14, BB' = 22, MA = ?$
	$AA' = 14, MA = 6, BM = 8, BB' = ?$
	$AA' = 5, MA = 4, MT = ?$
	$MA' = 18, MT = 12, AA' = ?$



$$x = ?$$





$$x, y = ?$$



در شکل زیر $IS = ID$ ، $IN = IE$ ثابت کنید :

مثال: اندازه‌های x و y را در هر یک از شکل‌های زیر بدست آورید.









مای درس

گروه آموزشی عصر

www.my-dars.ir

وضعیت دو دایره نسبت به هم


وضع ۲ دایره $C'(O', R')$ و $C(O, R)$ را با فرض $OO' = d$ و $R > R'$ ، می‌توان به صورت زیر دسته‌بندی کرد.

	$d > R + R'$	دو دایردهای متفاوت (برون هم)
	$d = R + R'$	دو دایردهای مماس خارج
	$R - R' < d < R + R'$	دو دایردهای متقاطع
	$d = R - R'$	دو دایردهای مماس داخل
	$d < R - R'$	دو دایردهای متدافع
	$d = 0$	دو دایردهای متمددالمرکز (هم مرکز)

مثال: طول خط‌المرکزین دو دایره مماس داخل ۵ و مساحت ناحیه بین دو دایره 85π است. محیط هر یک از دایرها را بدست آورید.

رسم مماس بر دایره از نقطه‌ای خارج از دایره

مسئله: چگونه می‌توان از نقطه مفروض M خارج از دایره $C(O, R)$ مماس MT را بر دایره رسم کرد؟




خطهای مماس نسبت به دایره

از هر نقطه خارج دایره می‌توان ۲ مماس بر دایره رسم کرد.

قضیه: طول مماس‌های رسم شده بر یک دایره از هر نقطه‌ای خارج آن باهم برابرند.

ما درس

مسئله: دو خط MT و MT' در نقاط T و T' بر دایره‌ی $C(O, R)$ مماسند. H نقطه‌ی برخورد وتر TT' با خط OM است. ثابت کنید:



الف) خط OM نیمساز زاویه‌های $\angle TMT'$ و $\angle TOT'$ است.

ب) خط OM عمودمنصف پاره خط TT' است.


$$OH \cdot OM = R^2 \quad (ج)$$

$$TT'^2 = 4OH \cdot HM \quad (د)$$

$$TT' \cdot OM = 2R \cdot MT \quad (ه)$$

مثال: دایره‌ی $C(O, 6)$ و نقطه‌ی M به فاصله‌ی ۱۲ سانتی‌متر از مرکز این دایره

را در نظر بگیرید. خطهای MT و MT' بر این دایره مماسند. (T و T' نقاط تماسند).



الف) طول مماس‌های MT و MT' را تعیین کنید.

ب) طول وتر TT' را بدست آورید.

ج) اندازه‌ی زاویه‌ی TMT' و نوع مثلث MTT' را تعیین کنید.

مثال: دو دایره هم مرکز به شعاع های ۸ و ۱۲ مفروضاند. وتری از دایره بزرگتر مماس بر دایره کوچکتر است. اگر دو مماس مرسوم از دو سر این وتر بر دایره بزرگتر در نقطه M متقاطع باشند. آنگاه فاصله M تا مرکز دایره ها کدام است؟

مثال: از نقطه A دو مماس بر دایره C(O,R) رسم شده است. اگر زاویه بین دو مماس ۱۲۰ درجه باشد، نسبت $\frac{R}{OA}$ چقدر است؟

مثال: خطوط AF، AE و BC به ترتیب در نقاط E، F و D بر دایره ای مماس هستند. مماس BC، خطوط AE و


را به ترتیب در نقاط B و C قطع کرده است. ثابت کنید با تغییر مکان نقطه D روی دایره بین دو نقطه ای ثابت



مماض‌های مشترک دو دایره


مماض مشترک دو دایره خطی که بر هر دو دایره مماس می‌شود.

- ۱) مماض مشترک خارجی: اگر دو دایره در یک طرف خط مماس باشند، این خط، مماض مشترک خارجی دو دایره نامیده می‌شود.




مسئله: طول پاره‌خط TT' را محاسبه کنید.

طریقۀ رسم: ابتدا مساله را حل شده فرض می‌کنیم، یعنی فرض می‌کنیم TT' مماض مشترک خارجی دو دایره باشد. از O' خطی موازی TT' رسم کرده تا OT را در H قطع کند. چهارضلعی $O'T'TH$ مستطیل است. (فکر!) پس $TH = T'H$ و $OH = OT - TH = R - R'$. حال برای ترسیم ابتدا به مرکز O و به شعاع R دایره‌ای رسم می‌کنیم، سپس از O مماس $O'H$ را بر این دایره رسم می‌کنیم. حال از O به H وصل می‌کنیم و امتداد می‌دهیم تا دایره‌ی (C) را در نقطه‌ی T قطع کند. از T موازی $O'H$ رسم کرده تا دایره‌ی (C) را در T' قطع کند. با معلوم شدن




T و T' ، مماض مشترک TT' رسم می‌شود.

۲) مماس مشترک خارجی: اگر دو دایره در دو طرف خط مماس باشند، این خط، مماس مشترک داخلی دو دایره نامیده می‌شود.



مسئله: طول پاره خط TT' را محاسبه کنید.

طریقہ رسم: ابتدا مساله را حل شده فرض می‌کنیم، یعنی فرض می‌کنیم TT' مماس مشترک داخلی دو دایره باشد. از O' خطی موازی TT' رسم کرده تا امتداد OT را در H قطع کند. چهارضلعی $O'H TT'$ مستطیل است. (فکر!) پس $TH = T'O' = R'$ در نتیجه $OH = R + R'$. حال برای ترسیم ابتدا به مرکز O و به شعاع $R + R'$ دایره‌ای رسم می‌کنیم، سپس از H به O وصل کرده تا دایره‌ی (C) را در T قطع کند. سپس از T موازی $O'H$ رسم کرده تا دایره‌ی (C') را در T' قطع کند، با مشخص شدن T و T' و وصل کردن آنها به هم، مماس مشترک داخلی TT' رسم می‌شود.



$$TT' = \sqrt{d^2 - (R \pm R')^2} : OO' = d$$

طول مماس مشترک داخلی و خارجی دو دایره به شعاع‌های R و R' و طول خط‌المرکزین d

مثال: دو دایره به شعاع‌های ۶ و ۹ و طول خط‌المرکزین ۲۱ مفروض‌اند. طول مماس مشترک خارجی دو دایره را محاسبه کنید.

مثال: شعاع‌های دو دایره ۲ و ۱۰ و طول خط‌المرکزین و طول مماس مشترک خارجی آنها به ترتیب $1 + 4x$ و $3x + 3$ است. مقدار x و طول خط‌المرکزین و مماس مشترک خارجی دو دایره را محاسبه کنید.

مثال: دو دایره به شعاع‌های ۳ و ۴ و طول خط‌المرکزین ۹ مفروض است. اندازه مماس مشترک داخلی آن را بدست آورید.

ماه درس

مثال: اندازه‌های مماس مشترک‌های داخلی و خارجی دو دایره به ترتیب $\sqrt{24}$ و $\sqrt{48}$ است. حاصل ضرب شعاع‌های این دو دایره کدام است؟

۳) دو دایره مماس: دو دایره را که فقط یک نقطه مشترک داشته باشند، مماس می‌نامند. در این نقطه مشترک یک خط بر هر دو مماس است. اگر مرکزهای دو دایره در دو طرف این مماس باشند، آن دو دایره مماس برونوی است و اگر هر دو مرکز در یک طرف این مماس باشند، آنها را مماس درونی می‌نامند.




مماس خارج‌اند؛
سه مماس مشترک دارند.
 $OO' = R + R'$

مماس داخل‌اند؛
 فقط یک مماس مشترک دارند.
 $OO' = |R - R'|$

مسئله: نشان دهید در دو دایره طول مماس مشترک خارجی $TT' = 2\sqrt{RR'}$ خواهد بود.


۴) دو دایره متقاطع: دو دایره را که فقط دو نقطه مشترک داشته باشند متقاطع می‌نامند. در این حالت دو دایره تنها دو مماس مشترک دارند.



$$|R - R'| < OO' < R + R'$$







پارهخطی که دو سر آن روی دو سر دایره قرار دارد، وتر مشترک دو دایره متقاطع است. پارهخط OO' عمود منصف این وتر مشترک می‌باشد.

www.my-dars.ir



۵) دو دایره متداخل: دو دایره که تمام نقاط یکی درون دیگری باشد، متداخل می‌نامیم. دو دایره متداخل هیچ مماس مشترکی ندارند. و در آنها $|R - R'| < OO'$

اوضاع نسبی دو دایره و تعداد مماس‌های مشترکشان

وضعیت دو دایره	شرط	تعداد مماس مشترک	شكل
۱ متاخرج	$OO' > r + r'$	۴	
۲ مماس خارج	$OO' = r + r'$	۳	
۳ متقطع	$ r - r' < OO' < r + r'$	۲	
۴ مماس داخل	$OO' = r - r' $	۱	
۵ متداخل	$OO' < r - r' $	صفر	
۶ هم مرکز	$OO' = 0$	صفر	

مثال: به ازای چه مقادیری از m دو دایره به شعاع‌های $m+2$ و $m-2$ با خط‌المرکزین $3m-12$ دارای دقیقاً ۳ مماس مشترک هستند؟

مثال: اندازهٔ مماس مشترک خارجی و داخلی دو دایرهٔ $O(0,7)$ و $C'(0',1)$ با فرض $OO' = 10$ چقدر است؟

مثال: دو دایره به شعاع‌های ۴ و ۹ سانتی‌متر، مماس بروان هستند. اندازهٔ مماس مشترک خارجی آنها چقدر است؟


مثال: مقدار a را چنان بیابید که اندازهٔ مماس مشترک خارجی دو دایره به شعاع‌های ۳ و ۸ و خط‌المرکزین $d = 13$ ، برابر با $5a - 3$ باشد.

مای درس


مثال: شعاع‌های دو دایرهٔ هم‌مرکز ۵ و ۳ سانتی‌متر هستند. اندازهٔ وتری از دایرهٔ بزرگ‌تر را که بر دایرهٔ کوچک‌تر مماس است پیدا کنید.

www.my-dars.ir

تمرین شماره (۳)



- ۱) در دایره (O,R) وتر AB ، وتر CD به طول ۹ سانتی‌متر را به نسبت ۱ به ۲ تقسیم کرده است. اگر $AB = 11\text{cm}$ ، آنگاه وتر CD وتر AB را به چه نسبتی قطع می‌کند؟




۲) با توجه به شکل نشان دهید:

الف) اگر $AC = BD$ ، آنگاه $AD = BC$


ب) اگر $AD = BC$ ، آنگاه $AC = BD$

- ۳) نقطه‌ی C بر روی وتر AB به طول ۹ واحد از دایره‌ای چنان قرار دارد که آن وتر را به نسبت ۱ و ۲ تقسیم کرده است. طول کوتاه‌ترین وتر گذرنده از نقطه‌ی C کدام است؟




۴) با توجه به شکل زیر، مقدار x کدام است؟

www.my-dars.ir




۵) در شکل زیر x کدام است؟

- ۶) از نقطه P در خارج از دایره‌ای، مماس PA به طول $10\sqrt{3}$ را بر آن رسم کرده‌ایم (روی دایره است). همچنین خط راستی از P گذرانده‌ایم که دایره را در دو نقطه B و C قطع کرده است و $BC=20$. طول‌های PB و PC را بدست آورید.




- ۷) در شکل مقابل دو دایره بر هم مماس و دو قطر AB و CD از دایره بزرگتر بر هم عمودند. اگر $ND=10$ و $AM=16$ ، شعاع‌های دو دایره را محاسبه کنید.



- ۸) مطابق شکل مقابل، تمام دایره‌ها در نقطه T بر هم مماس‌اند و از نقطه M روی مماس مشترک آنها بر دایره‌ها مماس رسم کرده‌ایم؛ ثابت کنید:

$$MT_1 = MT_2 = MT_3 = MT_4 = \dots$$



۹) در شکل زیر مساحت مثلث PAB برابر مساحت مثلث ACB است و پاره خط BP برابر واحد می‌باشد. ارتفاع وارد بر BC در مثلث ACB چقدر است؟ ($BC = 3$)

۱۰) طول شعاع‌های دو دایره متتارج را بدست آورید که طول مماس مشترک خارجی آنها مساوی $3\sqrt{7}$ و طول مماس مشترک داخلی آنها $15\sqrt{7}$ و طول خط‌المرکزین آنها مساوی ۸ واحد است.

۱۱) طول خط‌المرکزین دو دایره مماس درونی ۲ سانتی‌متر و مساحت ناحیه محدود بین آنها 16π سانتی‌متر مربع است. طول شعاع‌های دو دایره را بدست آورید.

مای‌درس

۱۲) نقطه‌ی P بیرون دایره‌ای به شعاع ۶ قرار دارد. فاصله‌ی P تا نزدیکترین نقطه‌ی دایره، ۴ واحد است. اندازه‌ی مماسی که از P بر دایره رسم شود، چقدر است؟

۱۳) دو دایرهٔ متقاطع به شعاع‌های ۵ و ۳ مفروض‌اند. اگر زاویهٔ بین مماس مشترک‌های خارجی 60° باشد، طول خط‌المرکزین این دو دایرهٔ کدام است؟

۱۴) شعاع دو دایرهٔ خارج هم به ترتیب $\frac{22}{5}$ و $\frac{7}{5}$ است. اگر زاویهٔ بین مماس مشترک داخلی و خط‌المرکزین 30° باشد، طول خط‌المرکزین کدام است؟

۱۵) طول مماس مشترک خارجی دو دایرهٔ به شعاع‌های ۳ و ۱ برابر با $\sqrt{46}$ می‌باشد. طول مماس مشترک داخلی این دو دایرهٔ چقدر است؟


۱۶) زاویهٔ بین دو مماس رسم شده از نقطهٔ A بر دایرهٔ $(O, 5)$ برابر 60° است. طول پاره‌خط OA را بدست آورید.

۱۷) دو دایرهٔ به شعاع‌های ۳ و ۷ و طول مماس مشترک خارجی $4\sqrt{3}$ مفروض‌اند. وضعیت این دو دایرهٔ نسبت به هم چگونه است؟


۱۸) سه دایرهٔ مطابق شکل برهم مماس‌اند و مرکز آنها روی یک خط راست قرار دارند. اگر $r = 1$ و $r' = 2$ باشد، شعاع دایرهٔ بزرگ‌تر کدام است؟

ما درس


آموزشی عصر



۱۹) در شکل دو دایره‌ی $C(O', 2)$ و $C'(O, 3)$ مماس خارج‌اند و مرکز هر سه دایره‌ی شکل بر روی یک خط راست قرار دارند. فاصله‌ی "O" تا خط d که بر هر سه دایره مماس است، کدام است؟




۲۰) در شکل زیر، نقطه‌ی P محل برخورد مماس مشترک‌های خارجی در دایره‌ی $C'(O', 1)$ و $C(O, 2)$ می‌باشد. اگر دو دایره در نقطه‌ی A مماس باشند، نزدیکترین فاصله‌ی P تا دایره‌ی O' کوچکتر کدام است؟



۲۱) در شکل مقابل هر سه دایره دارای شعاع‌های برابر R می‌باشند. طول نخ پیچیده شده دور آنها چقدر است و نیز مساحت ناحیه محدود بین سه دایره را محاسبه کنید.

ماهی درس

گروه آموزشی عصر



۲۲) مطابق شکل دایره به شعاع ۴، مساحت ناحیه سایه‌زده را محاسبه کنید. این ناحیه، یک قطعه دایره نام دارد.


www.my-dars.ir

سوالات تکمیلی

۱) ثابت کنید مماس مشترک‌های داخلی (یا خارجی) و خط‌المرکزین دو دایره همسنند.


۲) دو دایره به شعاع‌های R و r مماس خارج‌اند. فاصله‌ی نقطه‌ی تماس دو دایره تا مماس مشترک کدام است؟

۳) از نقطه‌ی دلخواه D روی وتر BC از مثلث قائم‌الزاویه‌ی ABC خطی بر آن وتر عمود خارج می‌کینیم تا ضلع AB را در E قطع کند. ثابت کنید: $BE \cdot AB = BD \cdot BC$




۴) دو دایره به شعاع‌های ۴ و ۶ و طول خط‌المرکزین ۱۲ مفروض‌اند. چند خط می‌توان رسم کرد که از مرکز دایره‌ی اول به فاصله‌ی ۶ و از مرکز دایره‌ی دوم به فاصله‌ی ۴ باشد؟

۵) در مثلث ABC دو ارتفاع ' BB' و ' CC' را رسم کرده‌ایم. با توجه به مقادیر تعیین شده در شکل، x را بدست آورید.




۶) در شکل زیر MN را بدست $\frac{9}{16}EF$ است. مقدار $\frac{MB}{EA}$ را بدست آورید. (O مرکز دایره است)



۷) سه دایره به مراکز O , O' و O'' و شعاع‌های ۲، ۲ و ۳ دوبه‌دو مماس بیرون هستند. مساحت مثلث $O O' O''$ چقدر است؟

۸) دو دایره‌ی متقاطع $C'(O', R')$ و $C(O, R)$ مفروض‌اند. مماس مشترک خارجی آنها را رسم کرده‌ایم. ثابت کنید امتداد وتر مشترک این دو دایره، مماس مشترک را نصف می‌کند.

۹) در شکل زیر، اگر $AT = 4$ باشد و بدانیم مساحت مثلث ATT' برابر ۶ است، طول TT' را بدست آورید.



۱۰) دو دایره‌ی مماس خارج به شعاع‌های R و r مفروض‌اند. دایره‌ای مماس بر دو دایره و مماس خارجی آنها رسم کردہ‌ایم. شعاع این دایره را بر حسب R و r محاسبه کنید.

۱۱) دو دایره‌ی $C(O', R')$ و $C(O, R)$ مماس خارج هستند. اگر اندازه‌ی زاویه‌ی بین دو مماس مشترک خارجی آنها

$$\sin \frac{\alpha}{2} = \frac{R - R'}{R + R'} \quad R > R' \quad \text{باشد، ثابت کنید: } \alpha$$

۱۰) از نقاط A ، B و C بر دایره‌ای به شعاع ۲، سه مماس CT'' و BT' و AT به طول $2\sqrt{3}$ رسم شده‌اند. اگر مثلث ABC متساوی‌الاضلاع باشد، مساحت مثلث چقدر است؟ (آزاد-۸۰)

۱۱) دایره‌ی C با شعاع ۲ از نقطه‌ی A با زاویه‌ی 60° دیده می‌شود. اگر O مرکز دایره و T نقطه‌ی تماس خطی که از A می‌گذرد و بر دایره مماس است، باشد، مساحت مثلث AOT کدام است؟ (سراسری-۷۵)

مای درس

گروه آموزشی عصر

www.my-dars.ir

چندضلعی‌های محیطی و محاطی

چندضلعی محیطی و دایره‌ی محاطی


یک چندضلعی محیطی است اگر و فقط اگر دایره‌ای وجود داشته باشد که بر همهٔ ضلع‌های آن چندضلعی مماس باشد.



۶ ضلعی محیطی

توجه: چندضلعی را محیطی یا محیط بر دایره می‌نامند و دایره را محاط در چندضلعی یا دایره‌ی محاطی چندضلعی می‌نامند.

مرکز دایره محاطی




چهارضلعی محیطی روبرو در نظر بگیرید. می‌دانیم شعاع دایره در نقطه تماس بر خط مماس عمود است. به عبارت دیگر فاصله مرکز دایره تا خطی که بر آن مماس شده است برابر شعاع دایره است. بنابراین مرکز دایره محاطی از همهٔ ضلع‌های چهارضلعی به یک فاصله است.


از طرف دیگر، می‌دانیم هر نقطه که از دو ضلع یک زاویه به یک فاصله باشد، روی نیمساز آن زاویه قرار دارد. پس می‌توان گفت اگر یک چندضلعی محیطی باشد، نیمسازهای زاویه‌های داخلی آن همرساند و این نقطه همرسی مرکز دایره محاطی است. به سادگی می‌توان درستی عکس این مطلب را بررسی کرد. اکنون می‌توان گفت:

یک چندضلعی محیطی است، اگر و فقط اگر نیمسازهای زاویه‌های داخلی آن همرس باشند. محل همرسی نیمسازها مرکز دایرهٔ محاطی چندضلعی است.

مثال: محیطی بودن چندضلعی‌های لوزی و مثلث را بررسی کنید.

قضیه: اگر در یک n ضلعی محیطی، P نصف محیط، r شعاع دایرهٔ محاطی و S مساحت باشند، داریم:






یک چندضلعی محاطی است اگر و فقط اگر دایره‌ای وجود داشته باشد که از همه رأس‌های آن چندضلعی بگذرد.

توجه: این چندضلعی را محاطی یا چندضلعی محاط بر دایره نامند و دایره را محیط بر چندضلعی یا دایره‌ی محیطی چندضلعی می‌نامند.

مرکز دایره محیطی



چهارضلعی محاطی روبرو را در نظر بگیرید. دایره محیطی این چهارضلعی را رسم می‌کنیم. در این چهارضلعی، مرکز دایره محیطی از تمام رأس‌ها به یک فاصله است و این فاصله برابر شعاع دایره محیطی است.

از طرف دیگر، می‌دانیم هر نقطه‌ای که از دو سر یک پاره‌خط به یک فاصله باشد، روی عمود منصف آن پاره‌خط قرار دارد. بنابراین O محل همسی عمودمنصف‌های ضلع‌های این چهارضلعی است. این مطلب قابل تعمیم برای n ضلعی‌های محاطی است و عکس آن هم به سادگی قابل اثبات است. اکنون می‌توان نتیجه گرفت:

یک چندضلعی محاطی است اگر و تنها اگر عمودمنصف‌های ضلع‌های آن همسی باشند. محل همسی عمودمنصف‌ها مرکز دایره محیطی چندضلعی است.

مثال: محاطی بودن چندضلعی‌های مستطیل و مثلث را بررسی کنید.

مای درس

گروه آموزشی عصر

www.my-dars.ir

یادآوری: یک چندضلعی را منتظم می‌گوییم، هرگاه تمام ضلع‌های آن با هم و همچنین تمام زاویه‌های آن با هم برابر باشند. به عنوان مثال، مثلث متساوی‌الاضلاع و مربع به ترتیب سه ضلعی و چهارضلعی منتظم هستند.

قضیه: هر چندضلعی منتظم قابل محاط شدن در یک دایره و همچنین قابل محیط شدن بر یک دایره است.



ما درس

گروه آموزشی عصر

توجه: نقطه ۰ را که مرکز دایره محاطی و مرکز دایره محیطی چندضلعی منتظم است، مرکز این چندضلعی می‌نامیم.

نتیجه: ۱) اگر دایره‌ای را به کمان‌های مساوی تقسیم کنیم و نقطه‌های تقسیم را به طور متوالی به هم وصل کنیم، یک چندضلعی منتظم محاط در دایره پدید می‌آید.

۲) اگر دایره‌ای را به کمان‌های مساوی تقسیم کنیم و در نقطه‌های تقسیم مماس‌هایی بر دایره رسم کنیم، از برخورد مماس‌های متوالی یک چندضلعی منتظم محیط بر دایره پدید می‌آید.


* دایره‌ای که هر ۳ ضلع مثلث (یا امتداد ۲ ضلع و خود یکی از اضلاع) بر آن مماس می‌شوند را دایره‌ی ممکن می‌نامند. هر مثلث ۱ دایره‌ی ممکن داخلی و ۳ دایره‌ی ممکن خارجی دارد.

* مرکز دایره‌ی ممکن داخلی : محل برخورد نیمسازهای داخلی

* مرکز دایره‌های ممکن خارجی : محل برخورد ۲ نیمساز خارجی با امتداد یکی از نیمسازهای داخلی

* شعاع دایره‌ی ممکن داخلی برابر است با:


* شعاع دایره‌ی ممکن خارجی (مماس بر ضلع BC) برابر است با:



مثال: در مثلث متساوی‌الاضلاع به ضلع a شعاع دایره محاطی داخلی چقدر است؟

مثال: در مثلث قائم‌الزاویه‌ای به ضلع‌های قائمة ۶ و ۸، شعاع دایرة محاطی داخلی را بدست آورید.

مثال: با توجه به شکل مقابل ثابت کنید:



$$AE = AF = P - a$$

$$BE = BD = P - b$$


$$CF = CD = P - c$$

مای درس


گروه آموزشی عصر

www.my-dars.ir

دایرهٔ محیطی مثلث




می‌دانیم سه عمود منصف ضلع‌های مثلث همسنند و نقطهٔ همرسی آنها از سه رأس مثلث به یک فاصله است. پس اگر O نقطهٔ همرسی سه عمود منصف ضلع‌های مثلث ABC باشد، آن‌گاه دایره‌ای که به مرکز O و شعاع OA رسم شود از هر سه رأس مثلث می‌گذرد. در نتیجهٔ مثلث قابل محاط شدن در یک دایره است، یعنی دایرهٔ محیطی دارد.



نکته: در مثلث قائم‌الزاویه، مرکز دایرهٔ محیطی وسط وتر است.

دلیل:



نکته: در مثلث متساوی‌الاضلاع نقطهٔ تلاقی عمودمنصف‌ها همان نقطهٔ تلاقی میانه‌ها است. بنابراین مرکز دایرهٔ محیطی مثلث (O در شکل مقابل) نقطهٔ تلاقی میانه‌ها است. می‌دانیم میانه‌های مثلث یکدیگر را به نسبت $\frac{2}{3}$ به 1 قطع می‌کنند. پس شعاع دایرهٔ محیطی یعنی OA مساوی $\frac{2}{3}$ ارتفاع AH است. حال می‌توان نوشت:

مثال: اگر مساحت مثلث متساوی‌الاضلاعی $4\sqrt{3}$ باشد، آن‌گاه شعاع دایرهٔ محیطی آن چقدر است؟

گروه آموزشی عصر


مثال: در مثلث متساوی‌الاضلاعی به ضلع $\sqrt{3}$ ، طول خط‌المرکزین دو دایرهٔ محیطی و محاطی خارجی آن چند است؟

مسئله: ثابت کنید در مثلث ABC اگر S مساحت مثلث و R شعاع دایره محیطی آن باشد، آن‌گاه


$$R = \frac{abc}{4S}$$

چهارضلعی‌های محیطی

برخلاف مثلث‌ها، چهارضلعی‌ها همواره محیطی نیستند. برای محیطی بودن چهارضلعی‌ها می‌توان علاوه بر بررسی شرط همسی نیمسازها از موارد دیگری نیز استفاده کرد که در زیر مهمترین آنها را بیان می‌کنیم.




قضیه: ثابت کنید چهارضلعی $ABCD$ محیطی است، اگر و تنها اگر

$$AB + CD = AD + BC$$


مای درس

گروه آموزشی عصر

www.my-dars.ir



مثال: اگر P , Q , R و S ، نقاط تماس اضلاع چهارضلعی $ABCD$ با دایره باشند،

آنگاه محیط این چهارضلعی را بدست آورید.

مثال: سه نیمساز داخلی یک چهارضلعی از یک نقطه می‌گذرند و اندازه سه ضلع متواالی آن به ترتیب ۱۰۷، ۷۲ و ۹۱

است. اندازه ضلع چهارم چقدر است؟

مثال: یک ذوزنقه متساوی الساقین بر دایره‌ای به شعاع ۳ محیط است. اگر مساحت ذوزنقه ۴۵ واحد مربع باشد، طول ساق


آن را بدست آورید.

مای درس

گروه آموزشی عصر

www.my-dars.ir



مثال: در شکل زیر ذوزنقه‌ی متساوی الساقین $ABCD$ بر دایره محیط شده است. مساحت آن چقدر است؟



چهارضلعی‌های محاطی

برخلاف مثلث‌ها، چهارضلعی‌ها لزوماً محاطی نیستند. برای محاطی بودن چهارضلعی‌ها می‌توان علاوه بر بررسی شرط همرسی عمودمنصف‌ها از موارد دیگری نیز استفاده کرد که در زیر مهمترین آنها را بیان می‌کنیم.

قضیه: ثابت کنید یک چهارضلعی محاطی است اگر و تنها اگر، زوایای مقابل آن مکمل هم باشند.




مای درس


گروه آموزشی عصر

www.my-dars.ir

مثال: دو زاویه‌ی مجاور یک چهارضلعی محاطی 80° و 120° است. قدر مطلق تفاضل دو زاویه‌ی دیگر کدام است؟



مثال: در شکل مقابل، اگر بدانیم $M = 2\alpha$ و $N = 3\alpha$. اندازه α بر حسب درجه چقدر است؟



مثال: با توجه به شکل x را بدست آورید.

مای درس

گروه آموزشی عصر

www.my-dars.ir

تمارین شماره (۱۴)

۱) ثابت کنید یک ذوزنقه، محاطی است، اگر و تنها اگر متساوی الساقین باشد.

۲) مساحت مثلث متساوی الاضلاعی را بدست آورید که در دایره‌ای به شعاع R محاط شده باشد.

۳) ثابت کنید عمود منصف یک ضلع هر مثلث و نیمساز زاویه مقابل به آن ضلع، یکدیگر را روی دایره محیطی مثلث قطع می‌کنند.

۴) یک ذوزنقه، هم محیطی است و هم محاطی. ثابت کنید مساحت این ذوزنقه برابر است با میانگین حسابی دو قاعده آن ضرب در میانگین هندسی آنها.

ماهی درس

گروه آموزشی عصر


www.my-dars.ir

۵) اگر r_a ، r_b و r_c شعاع‌های سه دایره محاطی خارجی مثلث و r_a شعاع دایره محاطی داخلی باشد، نشان دهید:

$$\frac{1}{r_a} + \frac{1}{r_b} + \frac{1}{r_c} = \frac{1}{r}$$

به همین ترتیب اگر h_a ، h_b و h_c اندازه‌های ۳ ارتفاع باشند، نشان دهید:

$$\frac{1}{h_a} + \frac{1}{h_b} + \frac{1}{h_c} = \frac{1}{r}$$



۶) اگر نقاط تماس دایره محاطی داخلی مثلث ABC با اضلاع آن M و N باشند، و نقطه‌های تماس یک دایره محاطی خارجی با خطهای شامل دو ضلع باشند، نشان دهید:

$$AM = AN = p - a$$

$$BN = BP = p - b$$

$$CM = CP = p - c$$


$$AT = AT' = p$$

مای درس

ب) اگر S نقطه تلاقی دایره محاطی خارجی با ضلع BC باشد و $AB = 6, AC = 7, BC = 8$ اندازه PS را محاسبه کنید.

۷) یک دایره به شعاع r و n ضلعی‌های منتظم محاطی و محیطی در آن در بگیرید. نشان دهید اگر CD و AB اندازه‌های

ضلع‌های n ضلعی منتظم محیطی و محاطی باشند، آن‌گاه:



$$AB = 2r \tan \frac{180}{n}$$


$$CD = 2r \sin \frac{180}{n}$$



۸) شش ضلعی منتظم $ABCDEF$ مفروض است با امتداد دادن اضلاع شش ضلعی

مطابق شکل مقابل مثلث MNP را ساخته‌ایم.

الف) نشان دهید MNP متساوی‌الاضلاع است.




ب) نشان دهید مساحت شش ضلعی، دو سوم مساحت مثلث MNP است.


ج) از نقطه دلخواه T درون شش ضلعی عمودهای TH , TH' و TH'' را به ترتیب بر AF , BC , ED , AB و CD رسم کنید. با

توجه به آنچه از هندسه ۱ می‌دانید(!) مجموع طولهای این سه عمود با کدام جزء از مثلث MNP برابر است؟

د) مجموع مساحت‌های مثلث‌های TAF , TDE , TBC و TCD چه کسری از مساحت مثلث MNP است؟ نشان دهید:

$$S_{TBC} + S_{TDE} + S_{TAF} = S_{TAB} + S_{TEF} + S_{TCD}$$





۹) دو قطر عمود بر هم AC و BD از یک دایره را رسم می‌کنیم؛ چهارضلعی $ABCD$ یک مربع است؛ چرا؟ عمود منصفهای ضلعهای این مربع را رسم کنید تا دایره را قطع کنند. نشان دهید هشت ضلعی $AMBQCPDN$ منتظم است.

مای درس

گروه آموزشی عصر

www.my-dars.ir

سوالات تکمیلی

۱) دایره‌ی $C(O, R)$ داده شده است. مکان هندسی نقطه‌ای را تعیین کنید که مماس‌های رسم شده از این نقطه بر دایره، برهم عمود باشند.

۲) در مثلث متساوی‌الاضلاع، مساحت دایره‌ی محیطی چند برابر مساحت دایره‌ی محاطی داخلی است؟


۳) در نیم‌دایره‌ای به شعاع R مثلث قائم‌الزاویه‌ای را که وتر آن منطبق بر قطر است را محاط کرده‌ایم. اگر مساحت مثلث نصف نیم‌دایره باشد، ارتفاع کدام مضرب از R است؟

۴) در ربع دایره‌ای به شعاع R ، یک دایره محاط است. شعاع این دایره برحسب R کدام است؟

۵) در مثلث با طول اضلاع ۷، ۵ و ۳ واحد، دایره‌ای محاطی خارجی بر ضلع متوسط و امتداد دو ضلع دیگر مماس است. نقطه‌ی تماس، ضلع متوسط را به کدام نسبت تقسیم می‌کند؟

۶) در مثلث متساوی‌الاضلاع به طول ضلع $\sqrt{3}$ ، طول خط‌المرکزین دو دایره‌ی محاطی داخلی و محاطی خارجی کدام است؟

۷) دو مماس AE و AF را بر دایره رسم کرده‌ایم. از نقطه‌ی D روی دایره، مماسی بر دایره رسم کرده‌ایم تا این دو مماس یا امتداد آنها را در B و C قطع کند. ثابت کنید با تغییر مکان D روی دایره، بین E و F ، مقدار $AB + AC - BC$ ثابت است.



۸) ذوزنقه‌ی متساوی‌الساقین بر یک دایره محیط است. ثابت کنید قطر دایره‌ی محاطی آن، واسطه‌ی هندسی بین دو قاعده‌ی ذوزنقه است.

۹) اگر I ، I_a ، I_b و I_c مرکز دایره‌های محاطی مثلث باشند، I برای مثلث $I_a I_b I_c$ چه نقطه‌ای است؟


مجله ریاضی: کمان درخور(حاوی) یک زاویه

*** پاره خط AB داده شده است. می خواهیم نقطه C را طوری قرار دهیم که $\hat{ACB} = \alpha$ باشد. تمامی نقاطی از صفحه

که C می تواند در آنها قرار گیرد باهم تشکیل یک شکل می دهند که آن شکل کمان درخور زاویه α روبرو به پاره خط AB است. (دقت کنید که پاره خط AB ثابت است و کمان درخور همیشه شامل دو کمان از دو دایره می باشد ولی شامل A و B نیست.)

*** کمان درخور زاویه α وابسته به پاره خط AB : مکان هندسی نقاطی از صفحه است که از آنها می توان پاره خط AB را با زاویه α رویت کرد. این مکان، قسمتی از دو دایره متقاطع است.

قضیه : مکان هندسی راس زاویه ای برابر α که اضلاعش از دو نقطه می گذرند، کمان هایی از دو دایره مساوی است که از آن دو نقطه ثابت می گذرند و زاویه مركزی روبرو به وتر مشترک آنها برابر 2α است. (اثبات در صفحات ۶۲ و ۶۴ کتاب)




برهان : دو نقطه A و B را در یک صفحه در نظر می گیریم. آنها را به هم وصل کرده، وسط پاره خط AB را H می نامیم.

آنگاه خط Δ ، عمودمنصف پاره خط AB را رسم می کنیم. از نقطه دلخواه P واقع بر خط Δ ، نیم خط PX را چنان رسم می کنیم که $\hat{HPX} = \alpha$ باشد. از نقطه A خطی موازی PX رسم می نماییم تا خط Δ را در نقطه O قطع کند.

به مرکز O و به شعاع OA یک دایره رسم می کنیم. این دایره از نقطه B نیز می گذرد و اندازه کمان

است (چرا؟). کمان \widehat{AFB} مکان هندسی مورد نظر، یعنی مکان هندسی راس زاویه ای برابر α است که اضلاعش از دو نقطه A و B می گذرند، زیرا :



(۱) هر نقطه مانند M که روی این کمان باشد و از این نقطه به دو نقطه A و B وصل کنیم،

$$\widehat{AMB} = \frac{\widehat{AEB}}{2} = \frac{2\alpha}{2} = \alpha$$

اندازه زاویه \widehat{AMB} برابر α است، چون :


(۲) نقطه N ، راس هر زاویه مانند $\widehat{ANB} = \alpha$ که اضلاعش از دو نقطه ثابت A و B می گذرد و در طرف کمان \widehat{AFB} واقع است، روی کمان


قرار دارد. زیرا اگر نقطه N روی این کمان نباشد، یا داخل دایره (O, R) واقع است، که در این صورت

خواهد بود، یا نقطه N خارج این دایره قرار دارد که در این صورت $\widehat{ANB} < \alpha$ است. زیرا اگر در حالت نخست نقطه

برخورد امتداد AN با دایره را M' بنامیم و از B وصل کنیم، داریم :

$$\widehat{ANB} = \widehat{AM'B} + \widehat{M'BN} \xrightarrow{\widehat{AM'B} = \alpha} \widehat{ANB} = \alpha + \widehat{M'BN} \longrightarrow \widehat{ANB} > \alpha$$






و در حالت دوم، اگر نقطه‌ی بروخورد $\widehat{ANB} = \alpha$ با دایره را بنامیم، داریم :

$$\widehat{ANB} = \widehat{AM'B} - \widehat{M'BN} \xrightarrow{\widehat{AM'B} = \alpha} \widehat{ANB} = \alpha - \widehat{M'BN} \longrightarrow \widehat{ANB} < \alpha$$

بنابراین، در هر دو حالت، نتیجه بدست آمده خلاف فرض است. در نتیجه نقطه‌ی N روی کمان AFB است. این کمان، کمان درخور یا کمان حاوی زاویه‌ی α روبرو یا وابسته به پاره‌خط AB ، نامیده می‌شود.



در صورتی که از نقطه‌ی B خطی موازی PX رسم کنیم تا عمودمنصف پاره‌خط O' را در نقطه‌ی A قطع کند، و

سپس دایره‌ای به مرکز O' و به شعاع $O'A = O'B$ رسم نماییم تا عمودمنصف پاره‌خط AB را در نقاط

A و F' قطع کند(شکل روبرو)، کمان $AF'B$ نیز کمان درخور زاویه‌ی α روبرو به پاره‌خط AB است.

بنابراین، مکان هندسی راس زاویه‌ای برابر α که اضلاعش از دو نقطه‌ی ثابت A و B می‌گذرند کمان‌هایی از


دو دایره‌ی مساوی است که بر A و B مرور می‌کنند و زاویه‌ی مرکزی روبرو به وتر مشترک آنها، برابر 2α است.

نتیجه ۱ : کمان‌های $\widehat{AE'B}$ و \widehat{AEB} از دو دایره شکل بالا، کمان درخور زاویه $\alpha - 180^\circ$ روبرو به پاره‌خط AB هستند.

نتیجه ۲ : کمان درخور زاویه‌ی 90° روبرو به پاره‌خط AB ، دایره‌ای به قطر AB است.

نکته : در هر یک از حالات ذکر شده، دو نقطه‌ی A و B جزء کمان درخور زاویه‌ی α یا $\alpha - 180^\circ$ نیستند.

نتیجه ۳ : شعاع دایره‌ای که کمان درخور زاویه‌ی α روبرو به پاره‌خط BC به طول a بخشی از آن است، $R = \frac{a}{2\sin \alpha}$ و



فاصله‌ی مرکز دایره از وتر BC ، برابر با $OH = \frac{a}{2|\tan \alpha|}$ است.