

$$\frac{x}{2-x} \geq 1 \rightarrow \frac{x}{2-x} - 1 \geq 0 \rightarrow \frac{x-2+x}{2-x} \geq 0 \rightarrow \frac{2x-2}{2-x} \geq 0.$$

$$2x-2=0 \rightarrow x=1$$

$$2-x=0 \rightarrow x=2$$

x	$-\infty$	1	2	$+\infty$
$2x-2$	-	o	+	+
$2-x$	+		+	-
$\frac{2x-2}{2-x} \geq 0$	-	o	+	namien

= مجموعه جواب

فصل ۵ : تابع

۱ : اگر مجموعه زیر یک تابع باشد، مقدار m را بیابید.


$$f = \{(1, 3), (2, 0), (-1, 4), (1, m^2 - 2m), (m, 7)\}$$

۲ : معادله یک تابع خطی را بنویسید که از دو نقطه $(2, 7)$ و $(5, 3)$ می گذرد.

۳ : معادله ی تابعی را بنویسید که دامنه آن $\{-5\} - R$ باشد.

$$\frac{f(b) - f(a)}{b - a} = a^2 + b^2 + ab \quad f(x) = x^2 - 1 \quad ۴ :$$

۵ : محیط نیم دایره را به عنوان تابعی بر حسب r بنویسید.



www.my-dars.ir

حل :

: ۱

$$m^2 - 2m = 3 \rightarrow m^2 - 2m - 3 = 0 \rightarrow (m+1)(m-3) = 0 \rightarrow m = -1 \text{ and } m = 3$$

بنابراین تابع مقدار $m = -1$ قابل قبول نیست.

: ۲

$$(5,3) \in f \rightarrow 3 = 5a + b$$

$$(2,7) \in f \rightarrow 7 = 2a + b$$

$$\begin{cases} 5a + b = 3 \\ 2a + b = 7 \end{cases} \xrightarrow{(-1) \times (-1)} \begin{cases} 5a + b = 3 \\ 2a + b = 7 \end{cases} \rightarrow \begin{cases} -5a - b = -3 \\ 2a + b = 7 \end{cases} \rightarrow -3a = 4 \rightarrow a = \frac{4}{-3}, b = \frac{13}{3}$$

$$f(x) = ax + b \rightarrow f(x) = -\frac{4}{3}x + \frac{13}{3} \quad \text{معادلهٔ تابع خطی}$$



: ۳

$$f(x) = \frac{1}{x+5}$$

: ۴

$$\begin{aligned} \frac{f(b) - f(a)}{b - a} &= \frac{(b^3 - 1) + (a^3 - 1)}{b - a} = \frac{b^3 - 1 - a^3 + 1}{b - a} \\ &= \frac{b^3 - a^3}{b - a} = \frac{(b - a)(b^2 + ab + a^2)}{b - a} = a^2 + b^2 + ab \end{aligned}$$

: ۵

$$p = \frac{2\pi r}{2} + 2r = \pi r + 2r = r(\pi + 2)$$

گروه آموزشی عصر

فصل ۶: شمارش بدون شمردن

www.my-dars.ir

۱: عبارت های زیر را با نماد فاکتوریل نمایش دهید.

(الف) $7 \times 6 \times 5 \times 4 \times 3 \times 2 \times 1 =$

(ب) $8 \times 7 \times 6 \times 5 =$

(ج) $5 \times 24 =$

۲: تعداد قطر های یک ۱۲ ضلعی محدب را محاسبه کنید.

۳: اگر $C(n, 4) = P(n - 1, 3)$ ، عدد n را بیابید.

گروه آموزشی عصر

ASR_Group @outlook.com

@ASRschoo2

۴ : دو خط موازی داده شده است و روی هر کدام از این دو خط ۵ نقطه قرار دارد. چند مثلث با این نقاط می توان ساخت؟

۵ : برای هر یک از موارد زیر یک مسئله بنویسید.

$$\text{(الف)} \binom{5}{3} \times \binom{6}{5} \times \binom{7}{5}$$

$$\text{(ب)} \binom{5}{3} + \binom{6}{4} + \binom{7}{5}$$

حل :

۱ : عبارت های زیر را با نماد فاکتوریل نمایش دهید.

$$\text{(الف)} 7 \times 6 \times 5 \times 4 \times 3 \times 2 \times 1 = 7!$$

$$\text{(ب)} 8 \times 7 \times 6 \times 5 = \frac{(8 \times 7 \times 6 \times 5) \times 4 \times 3 \times 2 \times 1}{4 \times 3 \times 2 \times 1} = \frac{8!}{4!}$$

$$\text{(ج)} 5 \times 4 \times 3 \times 2 \times 1 = 5!$$

۲ : اگر از تعداد حالات انتخاب ۲ نقطه از کل نقاط تعداد اصلاح را کم کنیم. تعداد قطرها به دست می آید.

$$\binom{n}{2} - n = \binom{12}{2} - 12 = 66 - 12 = 54$$

: ۳

$$C(n, 4) = P(n - 1, 3)$$

$$\rightarrow \frac{n!}{4!(n-4)!} = \frac{(n-1)!}{(n-1-3)!} \rightarrow \frac{n(n-1)!}{4!(n-4)!} = \frac{(n-1)!}{(n-4)!} \rightarrow \frac{n}{4!} = 1 \rightarrow n = 4! = 24$$

۴ : باید یکی از دو خط را انتخاب کنیم. سپس از آن خط دو نقطه و از خط دیگر یک نقطه بر داریم.

$$\binom{5}{1} \times \binom{5}{2} + \binom{5}{2} \times \binom{5}{1} = 2 \binom{5}{1} \times \binom{5}{2} = 2 \times 5 \times \frac{5 \times 4}{2} = 100$$

: ۵

الف : به چند طریق می توان از بین ۵ دانش آموز نهم و ۶ هفتم و ۷ دانش آموز پایه ی هشتم به تعداد ۱۳ نفر انتخاب کرد ، طوری که ۳ دانش آموز از پایه ی نهم و از پایه های دیگر هر کدام ۵ نفر باشند.

ب : در جعبه ای ۵ مهره سفید و ۶ مهره آبی و ۷ مهره قرمز وجود دارد. می خواهیم به تصادف دو مهره از این جعبه استخراج کنیم. تعداد حالت هایی را تعیین کنید که این حالت ها هم رنگ باشند.

$$\text{توجه : از تساوی } \binom{5}{3} + \binom{6}{4} + \binom{7}{5} = \binom{5}{2} + \binom{6}{2} + \binom{7}{2}$$

فصل ۷: آمار و احتمال

۱: اگر $P(A \cap B) = \frac{1}{10}$ و $P(B) = \frac{5}{10}$ و $P(A) = \frac{2}{10}$ باشد. تساوی های زیر را کامل کنید.

الف : $P(A') =$

ج : $P(A \cup B) =$

هـ : $P(A \cup B)' =$

ب : $P(B') =$

د : $P(A \cap B)' =$

۲: اگر A و B دو پیشامد دلخواه و $B \subseteq A$ باشند، هر یک از موارد زیر را ثابت کنید.

(الف) $P(A - B) = P(A) - P(B)$

(ب) $P(B) \leq P(A)$

۳: برای هر دو پیشامد دلخواه A و B از فضای نمونه ای S ثابت کنید که :

$$P(A' \cup B) - P(A \cap B) = P(A')$$

۴: دوازده نقطه مطابق شکل زیر روی دو خط موازی قرار دارند، از این نقطه ها، سه نقطه به تصادف انتخاب

می کنیم. احتمال اینکه این سه نقطه رأس های یک مثلث باشند، را به دست آورید.



گروه آموزشی عصر

۵: نوع هریک از متغیر های زیر را بنویسید.

ب) تعداد معلمان یک مدرسه

الف) سرعت اتومبیل

د) نمره ی دانش آموز

ج) وضع سواد

حل :

: ۱

$$P(A^c) = 1 - P(A) = 1 - \frac{2}{10} = \frac{10 - 2}{10} = \frac{8}{10} = \frac{4}{5}$$

$$P(B^c) = 1 - P(B) = 1 - \frac{5}{10} = \frac{10 - 5}{10} = \frac{5}{10} = \frac{1}{2}$$

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B) = \frac{2}{10} + \frac{5}{10} - \frac{1}{10} = \frac{6}{10} = \frac{3}{5}$$

$$P(A \cap B)^c = 1 - P(A \cap B) = 1 - \frac{1}{10} = \frac{10 - 1}{10} = \frac{9}{10}$$

$$P(A \cup B)^c = 1 - P(A \cup B) = 1 - \frac{3}{5} = \frac{5 - 3}{5} = \frac{2}{5}$$

: ۲

الف :

$$P(A - B) = P(A) - P(A \cap B) \xrightarrow{A \cap B = B} P(A - B) = P(A) - P(B)$$

ب :

$$\begin{aligned} B \subseteq A \rightarrow \Phi \subseteq A - B \rightarrow P(\Phi) &\leq P(A - B) \xrightarrow{P(\Phi) = \cdot} \cdot \leq P(A - B) \\ \rightarrow \cdot &\leq P(A) - P(B) \rightarrow P(B) \leq P(A) \end{aligned}$$

: ۳

$$P(A' \cup B) - P(A \cap B) = P(A') - P(A' \cap B) + P(B) - P(A \cap B)$$

$$= P(A') - \underbrace{P(B \cap A')}_{\text{نقطه از یک گروه}} + \underbrace{P(B) - P(A \cap B)}_{\text{نقطه از یک گروه و یک نقطه از گروه دیگر انتخاب کرد. در این صورت داریم:}}$$

$$= P(A') - P(B - A) + P(B - A) = P(A')$$

۴ : می توان این نقطه ها را دو گروه ۵ نقطه ای و ۷ نقطه ای در نظر گرفت. حال برای ایجاد مثلث باید دو

نقطه از یک گروه و یک نقطه از گروه دیگر انتخاب کرد. در این صورت داریم:

$$P(x) = \frac{\binom{5}{1} \times \binom{7}{2}}{\binom{12}{3}} + \frac{\binom{5}{2} \times \binom{7}{1}}{\binom{12}{3}} = \frac{5 \times 21}{220} + \frac{10 \times 7}{220} = \frac{175}{220} = \frac{35}{44}$$

د) کمی گستته

ج) کیفی اسمی

ب) کمی گستته

۵ : الف) کمی پیوسته