

درس اول : مفهوم تابع

مثال: کرایه تاکسی برای هر سوار شدن ۲۰۰۰ تومان است و به ازای هر ۱ کیلومتر مسیر، ۳۰۰ تومان به آن اضافه می شود. کرایه تاکسی را به صورت یک رابطهٔ ریاضی بنویسید.

رابطهٔ کرایه تاکسی به ازای هر کیلومتر یک رابطهٔ خطی است.

- در رابطهٔ خطی بالا y تابعی از تغییرات مستقل x است. یعنی وقتی x را به دلخواه و مستقل تغییر دهیم، y نیز تغییر خواهد کرد.

به رابطهٔ خطی $y = 2x + 2000$ دقت کنید. می‌خواهیم مقادیر y را به ازای $x = 1, 2, 3$ بدست آوریم.

با محاسبهٔ مقادیر $y = 2 \cdot 1 + 2000 = 2002$ بدست می‌آید.


اگر x, y را روی محور مختصات نشان دهیم به شکل (x, y) خواهند بود که ترتیب قرار گرفتن آنها اهمیت دارد.

تعريف: هرگاه یک رابطه‌ای را به صورت مجموعه‌ای از زوج نشان دهیم که در آن ترتیب قرار گرفتن مولفه‌ها اهمیت داشته باشد به آن زوج مرتب می‌گویند.

برای مثال رابطهٔ بالا را به صورت زیر نمایش می‌دهیم.

$$y = \{(1, -1), (2, 1), (3, 3)\}$$


- یک روش دیگر برای نمایش تابع استفاده از نمودار پیکانی می‌باشد. به این صورت که مولفه‌های اول در یک مجموعه و مولفه‌های دوم در مجموعه‌ی دیگر به هم وصل خواهد شد.



روش چهارم برای نشان دادن یک تابع استفاده از نمودار مختصات است.

اگر هر یک از زوج‌های مرتب را یک نقطه در صفحه فرض کنیم نمودار مختصاتی تابع بدست خواهد آمد.

مثال: برای رابطه $y = x^3$ که $x \in A, \{1, 2, 3\}$ می‌باشد، نمودار مختصاتی به صورت زیر است.



روش حل: استفاده از جدول برای نمایش تابع

x ها در ردیف اول و y ها در ردیف دوم قرار می‌دهیم.

x	-1	0	1	2
y	-1	0	1	8

مفهوم تابع

تعريف: یک رابطه بین دو مجموعه‌ی A و B یک تابع نامیده می‌شود، هرگاه متناظر با هر عنصر از مجموعه A یک عضو از مجموعه B را بتوان مربوط کرد.

مای درس




نکته: اگر یک نمودار پیکانی تابع باشد شرایط زیر را دارد.

الف) از همه‌ی اعضای مجموعه اول باید فلش خارج شود.

ب) از هر یک از اعضای مجموعه اول باید یک فلش خارج شود.

www.my-dars.ir

مثال: کدام یک از نمودارهای زیر یک تابع را نمایش می‌دهد.



نمودار ج یک تابع را نمایش می‌دهد.

نکته: یک مجموعه زوج مرتب زمانی یک تابع را نمایش می‌دهد که هیچ دو زوج مرتبی دارای مولفه‌ی اول یکسانی نباشد.

مثال: کدام مجموعه نمایش یک تابع است.

(الف) $f = \{(2,3), (3,4), (4,5), (2,7)\}$




(ب) $f = \{(1,5), (2,3), (7,2)\}$

(پ) $f = \{(2,4), (3,5), (2,4)\}$



گزینه‌های ب و پ یک تابع را نمایش می‌دهند.

نکته: اگر نمودار مختصاتی یک رابطه رسم شود، در صورتی تابع است که هیچ دو نقطه‌ای روی خطی که موازی محور y ها باشد، قرار نگیرد.

مثال: کدام رابطه یک تابع را نشان می‌دهد.



رابطه‌های الف و پ تابع نیستند، چون اگر خطی موازی محور y ها رسم کنیم تابع را در بیش از دو نقطه قطع می‌کند.



درس دوم: ضابطه‌ی جبری تابع

گاهی اوقات می‌توانیم رابطه‌ی بین مولفه‌ی اول و دوم زوج مرتب‌های مربوط به یک تابع را توسط یک ضابطه ریاضی بنویسیم.

که به طور مثال به صورت $y = 3x + 1$ نمایش داده می‌شود.

تعریف: در نمایش زوج مرتبی برای یک تابع مجموعه‌ی شامل همه‌ی مولفه‌های اول را دامنه و مجموعه‌ی شامل همه‌ی مولفه‌های دوم را برد تابع می‌گویند.

نکته: دامنه تابع f را با D_f و برد تابع f را با R_f نمایش می‌دهند.

تعريف دیگر از تابع : یک تابع مانند f از مجموعه A به مجموعه B قانون یا ضابطه‌ای است که به هر عضو از A دقیقاً یک عضو از مجموعه B را نسبت می‌دهد.

$$\begin{cases} f : A \rightarrow B \\ y = f(x) \end{cases}$$

نکته : برای نمایش تابع با ضابطه‌ی $f(x)$ و دامنه A داریم :

مثال : با توجه به ضابطه و دامنه، برد تابع مقابله آورده و روی جدول نشان دهید.

$$\begin{cases} f : A \rightarrow I\!\!R \\ f(x) = 3x - x^2 \end{cases}$$

$$A = \{1, -1, 2, \sqrt{5}\}$$


پاسخ

x	1	-1	2	$\sqrt{5}$
$f(x)$	$3(1) - (1)^2 = 2$	-4	2	$3\sqrt{5} - 5$

$$\longrightarrow R_f = \{2, -4, 2, 3\sqrt{5} - 5\}$$

مثال : دامنه و برد توابع زیر را مشخص کنید.

(الف) $f = \{(2, 1), (3, 4), (5, 6), (7, -1)\}$



$$D_f = \{2, 3, 5, 7\}$$

$$R_f = \{1, 4, 6, -1\}$$


$$D_f = \{a, b, c, d\}$$

$$R_f = \{1, 2, 3, 4\}$$

پاسخ (الف)

پاسخ (ب)

مثال : دامنه و برد



$$D_f = [-1, 1]$$

$$R_f = [-1, 1]$$


$$f(x) = x = \text{ضابطه}$$

www.my-dars.ir

درس سوم : نمودار تابع خطی

مثال : تابع $f(x) = 4x - 1$ مفروض است. مقادیر $f(0), f(1), f(-1)$ و $f(2)$ را بدست آورید. و سپس روی محور نشان دهید.

$$f(\cdot) = -1, f(1) = 3, f(-1) = -5, f(2) = 7$$



اگر دامنهٔ تابع فوق k باشد نمودار آن به صورت خط خواهد بود.

تعریف : هر تابع به صورت $y = f(x) = mx + h$ که در آن $y = mx + h$ ، یک تابع خطی نامیده می‌شود.

رسم نمودار تابع درجه یک

نکته : اگر $f(a) = b$ باشد با استفاده از فرمول $m = \frac{d-b}{c-a}$ شیب خط بدست می‌آید و با استفاده از فرمول $y - d = m(x - c)$ با استفاده از فرمول $f(a) = b$ و $f(a) = b$ رابطهٔ خط بدست خواهد آمد.

مثال : اگر $f(x) = 2x - 1$ باشد، ضابطهٔ نمودار را بدست آورده و نمودار $y = f(x)$ را رسم کنید.


$$m = \frac{1 - (-1)}{2 - 1} = \frac{2}{1} = 2$$

$$y - 1 = 2(x - 1) \Rightarrow$$

$$y - 1 = 2x - 2 \rightarrow y = 2x - 1$$

گروه آموزشی عصر

www.my-dars.ir



درس چهارم : نمودار تابع درجه ۲

معادله تابع درجه دوم در حالت کلی به صورت $y = ax^2 + bx + c$ که در آن $a \neq 0$ می‌باشد.

نمودار آن به یکی از دو صورت \cap یا \cup می‌باشد که به آن سهمی می‌گویند.

نکته : در سهمی نقطه‌ای به طول $x = -\frac{b}{2a}$ رأس سهمی است.

نکته : اگر $a > 0$ باشد سهمی رو به بالا و دارای مینیمم است.


نکته : اگر $a < 0$ باشد سهمی رو به پایین و دارای ماکزیمم است.

رسم سهمی : برای رسم سهمی مختصات رأس آن و دو نقطه‌ی دیگر سهمی را تعیین می‌کنیم. این نقاط بهتر است نسبت به رأس سهمی قرینه باشند.

مثال : معادله سهمی $y = 2x^2 - 4x + 1$ را رسم کنید.


$$x = \frac{-b}{2a} = \frac{-(-4)}{2 \times 2} = 1$$

x	0	1	2
$f(x)$	1	-1	1



نکته : اگر معادله‌ی سهمی به صورت $y = a(x - h)^2 + k$ باشد، مختصات رأس آن (h, k) و معادله‌ی محور تقارن آن $x = h$ است.

مثال : نمودار تابع $y = -(x - 1)^2 + 1$ را رسم کنید.



مای درس
گروه آموزشی عصر

www.my-dars.ir



۱۵- اگر تابع f به صورت $\{(-1,2), (3,1), (2,-2), (0,4), (1,3)\}$ تعریف شود ، مطلوب است:

الف) $f(f(-1))$

$$\frac{2f(3)+f(2)}{f(0)}$$

۱۶- معادله‌ی محور تقارن هر یک از سهمی‌های زیر را بنویسید.

$$y = -(2x - 1)^2 - 2$$

$$y = -\frac{1}{4}(4 - 3x)^2 - \frac{5}{4}$$

$$y = -5x^2 - 10x - 20$$

$$y = (x - 3)^2 + 2x - 1$$

۱۷- نمودار هر یک از سهمی‌های زیر رارسم کنید.

$$y = -4x^2 + 4$$

$$y = -2(x - 3)^2 + 9$$

$$y = x^2 - 2x + 3$$

$$y = -x^2 - 4x - 3$$

$$-x^2$$

۱۸- به ازای کدام مقادیر m تابع

مای درس

گروه آموزشی عصر

www.my-cars.ir
گروه آموزشی عصر

ASR_Group@outlook.com

@ASRschool2

آزمون فصل سوم

۱	۲	۳
	<p>درستی یا نادرستی عبارت های زیر را مشخص کنید.</p> <p>(الف) در تابع $f(x) = 2x+1$، $f(2)$ قرینه $f(-2)$ است.</p> <p>(ب) زوج مرتب $\{(1,5), (1,6), (1,7)\}$ یک تابع است.</p> <p>(پ) تابعی که حجم کره را بر حسب شعاع بیان می کند، یک تابع چند جمله ای است.</p> <p>(ت) مجموعه های مولفه ای اول زوج مرتب های تشکیل دهنده تابع را دامنه تابع می گویند.</p>	
	<p>هر یک از جملات زیر را با اعداد یا کلمات مناسب کامل کنید.</p> <p>(الف) تابع $f(x) = x^3 - x^2 + \dots$ یک تابع است.</p> <p>(ب) برد تابع $f(x) = x - 1$ برابر بازه \dots است.</p> <p>(پ) اگر $f(x) = 5x-1$ باشد، $f(-1)$ برابر است.</p> <p>(ت) اگر $f(a) = \{ \dots, a, 2, a \}$ یک تابع باشد، در جای خالی باید عدد قرار داد.</p>	۲
	<p>گزینه های مناسب را انتخاب کنید.</p> <p>(الف) R^+ برد تابع $f(x) = 3$ برابر است با :</p> <p>(ب) $R > 0$ دامنه تابع $f(x) = x^3 + x^2$ برابر است با :</p> <p>(پ) $R - \{-1\}$ مجموعه $\{a, \frac{2a}{3}, b, \frac{3b}{3}, c, \frac{4c}{4}\}$ یک تابع است.</p> <p>(ت) چند جمله ای $\{ (a,x), (a,y), (a,a) \}$ کدام یک از زوج مرتب های زیر یک تابع را نشان می دهد؟</p> <p>(الف) ثابت $\{(1,2), (1,4), (2,5)\}$</p> <p>(ب) همانی $\{(-5,-5), (-5,2), (5,-2)\}$</p> <p>(پ) $\{(a,b), (c,d)\}$</p>	۳
۲		

۱	<p>جدول زیر دمای هوای شهری در هفت روز اول ماه را نشان می دهد. این جدول را به صورت نمودار پیکانی و زوج مرتب نشان دهید.</p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <th>روز</th><th>۱</th><th>۲</th><th>۳</th><th>۴</th><th>۵</th><th>۶</th><th>۷</th></tr> <tr> <th>دما</th><td>۲۰</td><td>۲۱</td><td>۲۲</td><td>۲۱</td><td>۱۹</td><td>۲۰</td><td>۲۱</td></tr> </table>	روز	۱	۲	۳	۴	۵	۶	۷	دما	۲۰	۲۱	۲۲	۲۱	۱۹	۲۰	۲۱	۴
روز	۱	۲	۳	۴	۵	۶	۷											
دما	۲۰	۲۱	۲۲	۲۱	۱۹	۲۰	۲۱											
۱	<p>مجموعه‌ی زوج‌های مرتب زیر را روی نمودار رسم کنید و بگویید که یک تابع است یا خیر؟</p> $F=\{(0,-1), (2,3), (5,-1), (2,-3)\}$	۵																
۱	<p>مقدار m را طوری بیابید که مجموعه‌ی زوج‌های مرتب مقابل یک تابع باشد.</p> $F=\{(2,5), (7,1), (4,3), (2,3m-1)\}$	۶																
۱	<p>رابطه‌ی ((به اعداد طبیعی کمتر از ۴ مکعب آن‌ها را نسبت می‌دهد)) را در نظر بگیرید. این رابطه را با جدول نشان دهید. آیا این رابطه یک تابع است.</p>	۷																
۱	<p>با توجه به جدول زیر ابتدا تابع g را به صورت زوج‌های مرتب بنویسید. سپس دامنه و برد آن را تعیین کنید.</p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td>x</td><td>۲</td><td>۳</td><td>۴</td><td>۵</td><td>۶</td></tr> <tr> <td>$g(x)$</td><td>۵</td><td>۶</td><td>۷</td><td>۸</td><td>۹</td></tr> </table>	x	۲	۳	۴	۵	۶	$g(x)$	۵	۶	۷	۸	۹	۹				
x	۲	۳	۴	۵	۶													
$g(x)$	۵	۶	۷	۸	۹													
۱	<p>دامنه و نمایش جبری یک تابع به صورت مقابل است . الف) $f(x)=x-\frac{1}{2}$ را در یک جدول مشخص کنید. ب) برد آن را تعیین کنید.</p>	۱۰																
۱	<p>اگر در تابع $(x)h$ داشته باشیم $h(1)=-2$ و $h(-2)=-7$ ضابطه تابع را به دست آورید.</p>	۱۱																
۱	<p>در تابع $g(x)=\frac{2x-1}{x}$ حاصل $g(-2)+g(2)$ را به دست آورید.</p>	۱۲																
۱	<p>تابع $f(x)=2x-2$ را در دو حالت زیر رسم کنید. الف) دامنه‌ی آن مجموعه‌ی اعداد طبیعی باشد. ب) دامنه‌ی آن \mathbb{R} باشد.</p>	۱۳																
۱	<p>دامنه و برد تابع زیر را به دست آورید و بگویید چه نوع تابعی است ?</p> $h(x)=\{(a,5),(b,5),(c,5),(d,\frac{10}{3})\}$	۱۴																

۱		دامنه و برد توابع رسم شده را بنویسید.	۱۵
۱	$f(x) = \begin{cases} 2x + 1 & : x \geq 1 \\ -3 < x < 1 \end{cases}$	دامنه‌ی تابع مقابل را مشخص کرده و آن را رسم کنید.	۱۶
۱		تابع $h(x) = x^3$ را به کمک انتقال تابع $g(x) = (x - 2)^2$ و $f(x) = x^3$ رسم کنید.	۱۷
۱		با استفاده از رسم تابع $h(x) = - x + 1 $ دامنه و برد آن را تعیین کنید.	۱۸

مای درس
گروه آموزشی عصر
www.my-dars.ir