

با سمه تعالی

نام و نام خانوادگی :	تاریخ امتحان: ۱۴/۱۰/۹۸	ساعت شروع: ۱۰ صبح	سؤالات امتحان نهایی درس : حسابان ۲
مدت امتحان:	۲۰ دقیقه	رشنده: ریاضی و فیزیک	پایه دوازدهم دوره دوم متوسطه
دانش آموزان روزانه، بزرگسال و داوطلبان آزاد سراسر کشور در فوبت دی ماه سال ۱۳۹۸			

ردیف	استفاده از ماشین حساب ساده دارای چهار عمل اصلی مجاز می باشد سؤالات (پاسخ نامه دارد)
------	---

۱	درستی یا نادرستی عبارات زیر را مشخص کنید. الف) اگر تابع f در یک بازه نزولی باشد، آنگاه در این بازه اکیدا نزولی نیز می باشد. ب) سرعت لحظه ای در $t = 2$ برای متوجهی با معادله حرکت $s(t) = t^3 + 3t$ برابر ۷ است.	۱
۲	در جاهای خالی کلمه یا عبارت مناسب را بنویسید. الف) اگر $\frac{1}{64} \leq \frac{1}{2^{3x-2}}$ باشد، حدود x برابر است. ب) حاصل $\lim_{x \rightarrow +\infty} (3 - 2x - 5x^3)$ برابر با است. پ) اگر $-1 = f(2)$ و $3 = g(2)$ در این صورت $(2f' + 3g')'(2)$ برابر با است. ت) طول نقطه عطف تابع $y = x^3 - 6x^2$ برابر است.	۲
۱/۲۵	نمودار تابع $f(x)$ در شکل زیر رسم شده است. نمودار تابع $g(x) = f(2x + 1)$ را رسم کرده و دامنه و برد آن را تعیین کنید. 	۳
۱/۲۵	در چند جمله ای $p(x) = x^3 + ax^2 + b$ مقادیر a, b را چنان بیابید که باقی مانده تقسیم آن بر $x - 1$ برابر با ۴ باشد و بر $x + 2$ بخش پذیر باشد.	۴
۱/۵	ضابطه تابعی به صورت $y = a \sin bx + c$ را بنویسید که دوره تناوب آن π ، مقدار ماکزیمم آن ۶ و مقدار مینیمم آن -۲ باشد.	۵
۱/۵	معادله $2 \cos 3x - \sqrt{3} = 0$ را حل کنید.	۶
۱	مجانب های قائم و افقی تابع $f(x) = \frac{x^3 + x}{x^2 - x}$ را بیابید.	۷
	«ادامه سوالات در صفحه دوم»	

نام و نام خانوادگی :	تاریخ امتحان: ۱۴/۱۰/۹۸	ساعت شروع: ۱۰ صبح	سوالات امتحان نهایی درس : حسابان ۲
مدت امتحان:	۲۰ دقیقه	رشته: ریاضی و فیزیک	پایه دوازدهم دوره دوم متوسطه
دانش آموزان روزانه، بزرگسال و داوطلبان آزاد سراسر کشور در فوبت دی ماه سال ۱۳۹۸			

ردیف	استفاده از ماشین حساب ساده دارای چهار عمل اصلی مجاز می باشد سوالات (پاسخ نامه دارد)
------	---

۱/۵	$\lim_{x \rightarrow 2^+} \frac{\lfloor x \rfloor - 2}{3-x}$ (الف)	$\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{3x+1}{x-5} - \frac{2}{x} \right)$ (ب)	حاصل حدهای زیر را به دست آورید.
۱		<p>در شکل رو برو نمودار تابع $f(x)$ و خط مماس بر منحنی آن در نقطه $x = 2$ داده شده است:</p> <p>الف) مشتق تابع $f(x)$ را در نقطه $x = 2$ را بیابید.</p> <p>ب) معادله خط مماس بر نمودار تابع در نقطه A را بنویسید</p>	۹
۱/۲۵	$f(x) = \begin{cases} x^3 + 3 & x \geq 1 \\ 3x + 1 & x < 1 \end{cases}$		مشتق پذیری تابع مقابل را در نقطه $x = 1$ برسی کنید.
۱/۷۵	$f(x) = \frac{2x+3}{x^3-2x}$ (الف)	$g(x) = \sin^3(2x+1)$ (ب)	مشتق توابع زیر را به دست آورید. (ساده کردن مشتق الزامی نیست.)
۱		<p>نمودار تابع f, g را در شکل مقابل در نظر بگیرید.</p> <p>اگر $h(x) = \frac{f(x)}{g(x)}$ باشد ، $(h'(1))$ را بیابید.</p>	۱۲
۱		<p>شکل زیر را در نظر بگیرید . در کدام یک از پنج نقطه مشخص شده در نمودار:</p> <p>الف) $f'(x)$ و $f''(x)$ هر دو منفی اند.</p> <p>ب) $f'(x)$ منفی و $f''(x)$ مثبت است.</p>	۱۳
۱/۲۵		<p>اکسٹرمم های مطلق تابع $f(x) = 2x^3 + 3x^2 - 12x$ را در بازه $[-1, 2]$ مشخص کنید.</p>	۱۴
۱/۷۵		<p>جدول تغییرات و نمودار تابع $f(x) = \frac{2x}{x-1}$ رارسم کنید.</p>	۱۵
۲۰	جمع نمره	موفق و سر بلند باشید.	

با سمه تعالی

مدت امتحان: ۱۲۰ دقیقه	تعداد صفحه: ۲	رشته: ریاضی فیزیک	راهنمای تصحیح درس: حسابان ۲
تاریخ امتحان: ۱۴ / ۱۰ / ۱۳۹۸			پایه دوازدهم دوره دوم متوسطه
دانش آموزان روزانه، بزرگسال و داوطلبان آزاد سراسر کشور در دی ماه سال ۱۳۹۸			

ردیف	راهنمای تصحیح	نمره
۱	هر مورد (۵/۰) نمره ب) درست الف) نادرست	۱
۲	هر مورد (۵/۰) نمره ت) ۲ پ) ۷ ب) $-\infty$ الف) $\left[\frac{1}{3}, +\infty \right)$	۲
۳	(۰/۲۵) $R = [-1, 2]$ و $D = [-2, 1]$ رسم درستتابع (۰/۷۵)	۱/۲۵
۴	$x - 1 = 0 \rightarrow x = 1 \rightarrow p(1) = 4 \rightarrow a + b = 3 \quad (0/25)$ $x + 2 = 0 \rightarrow x = -2 \rightarrow p(-2) = 0 \rightarrow 4a + b = 8 \Rightarrow (0/5)$ $a = \frac{8}{3} \quad (0/25), b = \frac{4}{3} \quad (0/25)$	۱/۲۵
۵	$\frac{2\pi}{ b } = \pi \Rightarrow b = 2 \quad (0/5)$ $\begin{cases} a + c = 6 \\ - a + c = -2 \end{cases} \Rightarrow a = 4 \quad (0/25)$ $c = 2 \quad (0/25)$ هر یک از توابع $y = 4\sin(-2x) + 2$ و $y = -4\sin(2x) + 2$ یا $y = 4\sin(2x) + 2$ و یا $y = -4\sin(-2x) + 2$ صحیح است هر مورد نوشته شود مورد قبول است. (۰/۵)	۱/۵
۶	$\cos 3x = \frac{\sqrt{3}}{2} = \cos \frac{\pi}{6} \quad (0/5) \Rightarrow 3x = 2k\pi \pm \frac{\pi}{6} \quad (0/5) \Rightarrow x = \frac{2k\pi}{3} \pm \frac{\pi}{12} \quad (0/5)$	۱/۵
۷	$x^r - x = 0 \rightarrow \begin{cases} x = 1 & (0/25) \\ x = 0 & (0/25) \end{cases}$ مجانب قائم قابل قبول نیست $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{x^r + x}{x^r - x} = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{x^r}{x^r} = 1 \quad (0/25) \Rightarrow y = 1 \quad (0/25)$	۱
۸	الف) $\frac{\overbrace{[3^+]-2}^{(0/25)}}{3-3^+} = \frac{3-2}{0^-} = \frac{1}{0^-} = -\infty \quad (0/5)$ ب) $\lim_{x \rightarrow -\infty} \left(\frac{3x}{x} - 0 \right) \quad (0/5) = 3 - 0 = 3 \quad (0/25)$	۱/۵
۹	الف) $f'(2) = \frac{3-1}{2-0} = 1 \quad (0/5)$ ب) $y - 3 = 1(x - 2) \Rightarrow y = x + 1 \quad (0/5)$	۱

مدت امتحان: ۱۲۰ دقیقه	تعداد صفحه: ۲	رشته: ریاضی فیزیک	راهنمای تصحیح درس: حسابان ۲
تاریخ امتحان: ۱۴ / ۱۰ / ۱۳۹۸			پایه دوازدهم دوره دوم متوسطه
دانش آموزان روزانه، بزرگسال و داوطلبان آزاد سراسر کشور در دی ماه سال ۱۳۹۸			

ردیف	راهنمای تصحیح	نمره												
۱۰	$f'_+(1) = \lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{f(x) - f(1)}{x - 1} = \lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{x^3 + 3 - 4}{x - 1} = 2 \quad (0/5)$ $f'_-(1) = \lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{3x^2 + 1 - 4}{x - 1} = \lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{3x^2 - 3}{x - 1} = 3 \quad (0/5) \rightarrow f'_-(1) \neq f'_+(1)$ <p>بنابراین تابع f را در $x = 1$ مشتق پذیر نیست. (۰/۲۵)</p>	۱/۲۵												
۱۱	<p>(۰/۵)</p> $\text{الف) } y' = \frac{\overbrace{2(x^3 - 2x^2)}^{(0/5)} - (3x^2 - 4x)(2x + 3)}{\underbrace{(x^3 - 2x^2)^2}_{(0/5)}}$ $\text{ب) } y' = \underbrace{3 \times 2}_{(0/25)} \underbrace{\sin^2(2x + 1)}_{(0/25)} \underbrace{\cos(2x + 1)}_{(0/25)}$	۱/۷۵												
۱۲	$h'(1) = \frac{\overbrace{f'(1)g(1) - f(1)g'(1)}^{(0/5)}}{g^2(1)} = \frac{\overbrace{2 \times 3 - (2)(-1)}^{(0/25)}}{9} = \frac{8}{9} \quad (0/25)$	۱												
۱۳	<p>الف) نقطه C (۰/۵)</p> <p>ب) نقطه D (۰/۵)</p>	۱												
۱۴	$f'(x) = 6x^2 + 6x - 12 = 0 \quad (0/25) \Rightarrow \begin{cases} x = 1 \\ x = -2 \end{cases} \quad (0/5)$ <p>قابل قبول نیست</p> $f(-1) = 13, f(2) = 4, f(1) = -7 \Rightarrow \min : (1, -7) \quad (0/25), \max : (-1, 13) \quad (0/25)$	۱/۲۵												
۱۵	<p>مجانب قائم $x = 1$ و $y = 2$ (۰/۲۵)</p> <p>مجانب افقی (۰/۲۵)</p> <table border="1"> <tr> <td>x</td> <td>$-\infty$</td> <td>1</td> <td>$+\infty$</td> </tr> <tr> <td>f'</td> <td>-</td> <td></td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>f</td> <td>\downarrow</td> <td>\nearrow</td> <td>\downarrow</td> </tr> </table> <p>جدول (۰/۵) نمره</p> <p>شکل (۰/۵) نمره</p>	x	$-\infty$	1	$+\infty$	f'	-		-	f	\downarrow	\nearrow	\downarrow	۱/۷۵
x	$-\infty$	1	$+\infty$											
f'	-		-											
f	\downarrow	\nearrow	\downarrow											
۲۰	جمع نمره	« همکاران گرامی لطفا به راه حل های صحیح دیگر به تناسب نمره دهید . »												