





نام درس: فیزیک ۳
نام دبیر: بهنام شریعتی
تاریخ امتحان: ۱۰/۱۳/۹۹
ساعت امتحان: ۰۰:۰۸ صبح/عصر
مدت امتحان: ۹۰ دقیقه

آزمون پایان تاریخ نوبت اول سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹

نام و نام فانوادگی:
مقطع و رشته: دوازدهم ریاضی و تجربی
نام پدر:
شماره داوطلب:
تعداد صفحه سوال: ۲ صفحه

نام دبیر:	تاریخ و امضاء:	نامه به حروف:	نمره به عدد:	نامه به حروف:									
نامه به حروف:	نامه به عدد:	نمره به حروف:	نمره به عدد:	نامه به حروف:									
سؤالات													
۱	برای تکمیل جملات زیر، عبارت مناسب را انتخاب کنید. الف) در حرکت یکنواخت شتاب جسم (ثابت/صفرا) است. ب) مساحت زیر نمودار نیرو-زمان برابر (تفییرات شتاب/تفییرات تکانه) است. پ) تا قبل از حرکت جسم، اصطکاک بین جسم و سطح (بزرگتر از / برابر با) نیروی خارجی وارد بر جسم است. ت) نوسان دوره‌ای کسینوسی را (حرکت نوسانی کامل / حرکت هماهنگ ساده) می‌نامند.	۱											
۱	هر کدام از عبارات ستون A مربوط به کدام مفهوم ستون B است؟	۲											
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">B</th> <th style="text-align: center;">A</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>تکانه</td><td>الف) حاصلضرب جرم در سرعت</td></tr> <tr> <td>دامنه</td><td>ب) بیشترین فاصله نوسانگر از مرکز تعادل</td></tr> <tr> <td>شتاب گرانش</td><td>پ) حرکتی که در آن تندی متوسط با تندی متحرک در هر لحظه برابر است.</td></tr> <tr> <td>حرکت یکنواخت</td><td>ت) با افزایش ارتفاع از سطح زمین، کاهش می‌یابد.</td></tr> </tbody> </table>	B	A	تکانه	الف) حاصلضرب جرم در سرعت	دامنه	ب) بیشترین فاصله نوسانگر از مرکز تعادل	شتاب گرانش	پ) حرکتی که در آن تندی متوسط با تندی متحرک در هر لحظه برابر است.	حرکت یکنواخت	ت) با افزایش ارتفاع از سطح زمین، کاهش می‌یابد.		
B	A												
تکانه	الف) حاصلضرب جرم در سرعت												
دامنه	ب) بیشترین فاصله نوسانگر از مرکز تعادل												
شتاب گرانش	پ) حرکتی که در آن تندی متوسط با تندی متحرک در هر لحظه برابر است.												
حرکت یکنواخت	ت) با افزایش ارتفاع از سطح زمین، کاهش می‌یابد.												
۱	با ذکر دلیل توضیح دهید در چه صورتی تندی متوسط و سرعت متوسط برابر خواهند بود؟	۳											
۲	نمودار مکان-زمان یک خودرو تاکسی در ۹۰ ثانیه ابتدایی شروع کارش به صورت زیر است:  الف) نوع حرکت تاکسی در ۳۰ ثانیه اول را مشخص کنید. ب) در چه بازه‌هایی راننده با شتاب منفی (ترمزی) حرکت کرده است? پ) در کدام بازه زمانی راننده می‌توانسته مسافر سوار کند? ت) جابجایی تاکسی در مدت ۹۰ ثانیه چند متر بوده است? ث) نمودار سرعت-زمان تاکسی را به صورت کیفی رسم کنید.	۴											
۱	"در سکانسی از فیلم گرانش (Gravity)، سوخت موتور حرکتی یکی از فضانوردان در هنگام راهپیمایی فضایی به اتمام رسیده و او مسیر مستقیمی را که در حال پیمودنش بود، ادامه می‌دهد و دیگر به فضایپیما برنمی‌گردد." دلیل فیزیکی این اتفاق را بیان کنید.	۵											
۱	دو نفر که جرم اولی ۲ برابر جرم دومی است یکدیگر را هل می‌دهند. نسبت شتاب فرد دوم به شتاب نفر اول را محاسبه کنید.	۶											
۱	عکس العمل نیروهای زیر به چه جسمی وارد می‌شود? ب) نیروی وزن	۷											
صفحه ۱ از ۲													

ردیف	سؤالات	نوع
۱	در چه بازه‌های از حرکت یک نوسانگر جرم و فنر، حرکت تندشونده است؟	۸
۱/۵	در یک مسابقه، شخص شرکت کننده باید یک گوی را طوری روی یک کanal به حرکت درآورد که گوی در انتهای کanal روی علامت مشخصی متوقف شود. اگر شتاب متوقف کننده حرکت گوی روی کanal $\frac{m}{s^2}$ باشد. شرکت کننده گوی را با چه تندی اولیه‌ای رها کند که توپ در مکان مشخص متوقف شود؟ 	۹
۲	نمودار مکان-زمان یک دونده دو صد متر، به صورت لحظه‌ای دونده در لحظه $t = 4s$ چند برابر سرعت متوسط آن بین لحظات $t = 1s$ تا $t = 4s$ است؟ 	۱۰
۲	وزنهای به جرم ۲ کیلوگرم را به انتهای فنری به طول ۱۲ سانتی متر که ثابت آن ۲۰ نیوتون بر سانتی متر است می‌بندیم و فنر را از سقف یک آسانسور آویزان می‌کنیم. طول فنر را در هر یک از حالات زیر محاسبه کنید. الف) آسانسور ساکن است. ب) آسانسور با شتاب ثابت ۲ متر بر مجدور ثانیه به سمت بالا حرکت کند.	۱۱
۲	جسمی به جرم یک کیلوگرم را روی سطح افقی با نیروی افقی F می‌کشیم. اگر ضریب اصطکاک جسم با سطح 0.2 باشد، نیروی F را در شرایط زیر محاسبه کنید: الف) جسم با سرعت ثابت حرکت کند. ب) جسم با شتاب ثابت ۲ متر بر مجدور ثانیه حرکت کند.	۱۲
۱	یک نوسانگر در مدت ۱ دقیقه، 600 نوسان انجام می‌دهد. دوره تناوب، بسامد و بسامد زاویه‌ای این نوسانگر را محاسبه کنید.	۱۳
۱/۵	نمودار مکان-زمان نوسانگری به صورت زیر است: الف) دوره تناوب این نوسانگر را محاسبه کنید. ب) معادله حرکت این نوسانگر را بنویسید. پ) مقدار t_1 را محاسبه کنید. 	۱۴
۱	یک نوسانگر هماهنگ ساده وزنه-فنر با فنری با ضریب سختی $200 \frac{N}{m}$ و وزنهای به جرم $2kg$ در حال نوسان است. الف) دوره تناوب حرکت نوسانگر را به دست آورید. ب) اگر دامنه نوسان، 5 سانتی متر باشد، بیشترین سرعت نوسانگر را محاسبه کنید.	۱۵



نام درس: فیزیک ۳

نام دبیر: بهنام شریعتی

تاریخ امتحان: ۱۴۰۰ / ۱۰ / ۱۳

ساعت امتحان: ۸:۰۰ صبح / عصر

مدت امتحان: ۹۰ دقیقه

کلید سوالات پایان ترم نوبت اول سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹

ردیف	راهنمای تصحیح	محل مهر یا امضاء مدیر
۱	الف) صفر هر مورد ۰,۲۵ نمره دارد.	ت) حرکت هماهنگ ساده پ) برابر با
۲	الف) تکانه هر مورد ۰,۲۵ نمره دارد.	پ) حرکت یکنواخت ت) شتاب گرانش ب) دامنه
۳	در صورتی که جابجایی با مسافت طی شده برابر باشد (۰,۵) در این حالت متوجه در خط مستقیم حرکتی بدون بازگشت را دارد. (۰,۵)	
۴	هر کدام از موارد الف تا ت ۰,۲۵ دارد. ث) هر کدام از بازه های زمانی ۰,۲۵ در مجموع ۱ نمره	الف) تندشونده ب) ۳۰ تا ۴۵ ثانیه و ۶۰ تا ۹۰ ثانیه پ) ۴۵ تا ۶۰ ثانیه ت) ۰
۵	طبق قانون اول تیوتن (۰,۲۵) در صورتی که برآیند نیروهای وارد بر یک جسم صفر باشد، اگر ساکن باشد ساکن خواهد و اگر در حرکت باشد ، به حرکت خود با سرعت ثابت ادامه خواهد داد.(۰,۵) چون در فضا به فضانورد هیچ نیرویی وارد نمی شود، او با همان سرعت ثابت به حرکت خود ادامه می دهد و به فضاییما برنمی گردد.(۰,۲۵)	
۶	نیرویی که این دو به هم وارد می کنند، یکسان است. پس هر کدام که جرم بیشتری داشته باشد، شتابش کمتر است. بنابراین نسبت شتاب فرد دوم ۲ برابر شتاب فرد اول است.	
۷	الف) عکس العمل نیروی وزن از طرف جسم به زمین وارد می شود. (۰,۵) ب) عکس العمل نیروی اصطکاک از طرف جسم به سطح وارد می شود. (۰,۵)	
۸	از زمان $0 \text{ تا } \frac{T}{4}$ حرکت تندشونده - از $\frac{T}{4} \text{ تا } \frac{3T}{4}$ کندشونده - از $\frac{3T}{4} \text{ تا } T$ تندشونده و از $T \text{ تا } \frac{3T}{2}$ کندشونده است. (هر مورد ۰,۲۵ دارد.)	
۹	(هر سطر ۰,۵ نمره)	$V_2^2 - V_1^2 = 2a\Delta x$ $0 - V_1^2 = -2(4.5)$ $V_1 = 3 \frac{m}{s}$
۱۰	محاسبه سرعت لحظه‌ای (۰,۷۵) محاسبه سرعت متوسط (۰,۷۵) محاسبه نسبت خواسته شده (۰,۵)	$V_4 = \tan(\alpha) = \frac{20}{2} = 10 \frac{m}{s}$ $\overline{V}_{1-4} = \frac{V_4 - V_1}{t_4 - t_1} = \frac{20 - 8}{4 - 1} = \frac{12}{3} = 4 \frac{m}{s}$ $\frac{V_4}{V_{1-4}} = \frac{10}{4} = 2.5$

الف) در حالت ساکن، نیروی کشش فنر با نیروی نیروی وزن برابر است:

$$F_e = m g \rightarrow K \Delta x = m g \rightarrow 20 \Delta x = 20 \rightarrow \Delta x = 1 \text{ cm}$$

$$\Delta x = x_2 - x_1 \rightarrow x_2 = 13 \text{ cm}$$

محاسبه تغییرات طول (۰,۵) و محاسبه طول ثانویه (۰,۲۵)

$$F_e - m g = m a \rightarrow K \Delta x - m g = m a \rightarrow 20 \Delta x - 20 = 4$$

$$\Delta x = \frac{24}{20} = \frac{6}{5} = 0.12 \text{ cm}$$

(ب)

$$\Delta x = x_2 - x_1 \rightarrow x_2 = 12.12 \text{ cm}$$

نوشتن معادله اصلی (۰,۷۵) به دست آوردن تغییرات (۰,۲۵) و طول ثانویه (۰,۲۵)

ابتدا قانون دوم نیوتون را در راستای عمودی می‌نویسیم تا نیروی عمودی سطح به دست آید (۰,۵)

$$F_N - m g = 0 \rightarrow F_N = m g \rightarrow F_N = 10 N$$

اکنون قانون دوم نیوتون را در راستای افقی می‌نویسیم: (۰,۵)

$$F - f_s = m a \rightarrow F - \mu_s F_N = m a \rightarrow F - \mu_s m g = m a$$

$$a = 0 \rightarrow F = 0.2 \times 1 \times 10 = 2 N$$

$$a = 2 \rightarrow F = 1 \times 2 + 0.2 \times 1 \times 10 = 4 N$$

$$T = \frac{t}{n} = \frac{60}{600} = \frac{1}{10} s$$

$$f = \frac{1}{T} = 10 Hz$$

$$\omega = 2\pi f = 20\pi$$

بخش اول (۰,۵) نمره و بخش های دوم و سوم هر کدام (۰,۲۵)

$$\frac{5T}{4} = 0.5 \rightarrow T = 0.4 s$$

الف) (۰,۲۵) با توجه به اعداد روی محور افقی:

ب) (۰,۷۵) با به دست آوردن دامنه و بسامد زاویه‌ای می‌توان معادله حرکت را نوشت:

$$A = 0.04 m, \omega = \frac{2\pi}{T} = \frac{2\pi}{0.4} = 5\pi$$

$$x = A \cos(\omega t) = 0.04 \cos(5\pi t)$$

پ) (۰,۵) با داشتن معادله حرکت و مکان نوسانگر می‌توان زمان مورد نظر را یافت:

$$x = 0.04 \cos(5\pi t) \rightarrow 0.02 = 0.04 \cos(5\pi t_1) \rightarrow \frac{1}{2} = \cos(5\pi t_1)$$

$$5\pi t_1 = \frac{\pi}{3} \rightarrow t_1 = \frac{1}{15} s$$

$$T = 2\pi \sqrt{\frac{m}{K}} = 2\pi \sqrt{\frac{2}{200}} = \frac{\pi}{5}$$

الف) (۰,۵)

$$v_{\max} = A \omega = 5 \times 10^{-2} \times 10 = 0.5 \text{ m/s}$$

ب) (۰,۵)

امضا:

نام و نام خانوادگی مصحح : بهنام شریعتی

جمع بارم : ۱۰ نمره