

۱ مولاریتهٔ محلول ۴۹ درصد جرمی سولفوریک اسید که چگالی آن برابر $1,25 \text{ g} \cdot \text{mL}^{-1}$ است، کدام است؟

$$(H = 1, O = 16, S = 32 : \text{g} \cdot \text{mol}^{-1})$$

۸,۲۵ ۲

۷,۱۲ ۳

۶,۲۵ ۲

۵,۱۲ ۱

۲ برای تهیهٔ ۶,۷۲ لیتر گاز کلر، در شرایط STP از واکنش منگنز دی اکسید با هیدروکلریک اسید، چند میلی لیتر محلول $14,6$ درصد جرمی این اسید با چگالی $1 \text{ g} \cdot \text{mL}^{-1}$ مصرف می‌شود؟

$$(H = 1, Cl = 35,5 : \text{g} \cdot \text{mol}^{-1})$$

۳۲۵ ۲

۲۰۰ ۳

۲۵۰ ۲

۳۰۰ ۱

۳ برای تهیهٔ 400 میلی‌لیتر محلول $3,0$ (مول بر لیتر) سدیم کلرید، چند گرم از این نمک (به صورت خالص)، لازم است؟ $Na = 23, Cl = 35,5$

۱۰,۳۵ ۲

۹,۷۹ ۳

۷,۰۲ ۲

۳,۰۱ ۱

۴ اگر محلول‌های اشباعی از مواد زیر در دمای 20°C موجود باشد و دمای محلول‌ها به 60°C افزایش یابد، در کدام ظرف بخشی از مادهٔ ته نشین می‌شود؟

۲ پتانسیم نیترات

۳ سدیم کلرید

۲ پتانسیم کلرات

۱ سدیم هیدروکسید

۵ قابلیت حل شدن گاز معمولاً بر اثر:

۱ افزایش فشار و کاهش دما، افزایش می‌یابد.

۳ کاهش فشار و کاهش دما، افزایش می‌یابد.

۶ اگر در حجم برابر از محلول سدیم هیدروکسید و پتانسیم هیدروکسید، جرم برابر از آن‌ها موجود باشد و محلول پتانسیم هیدروکسید $5,0$ مولار باشد، مولاریتهٔ محلول سدیم هیدروکسید کدام است؟

$$(Na = 23, O = 16, H = 1, K = 39 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1})$$

۰,۸ ۲

۰,۷ ۳

۰,۶ ۲

۰,۵ ۱

۷ در 25°C ۲۹,۲۵ گرم محلول 20°C درصد جرمی سدیم کلرید، چند مول $NaCl$ وجود دارد؟

$$(Na = 23, Cl = 35,5 : \text{g} \cdot \text{mol}^{-1})$$

۰,۲۵ ۲

۰,۲۰ ۳

۰,۱۵ ۲

۰,۱ ۱




در ۵۰۰ میلی لیتر محلول ۲٪ مولار $Al(NO_3)_3$, چند مول یون NO_3^- موجود است؟

۰,۶ ۱





۰,۴ ۲

۰,۳ ۳

۰,۲ ۴



با توجه به شکل مقابل، واکنش موازن شده مربوطه به کدام صورت زیر است؟



۲۰۰ میلی لیتر محلول ۱٪ مولار سدیم هیدروکسید با آهن (II) سولفات چند گرم رسوب تولید می کند؟

($H = 1, O = 16, Fe = 56 : g \cdot mol^{-1}$)

۱,۸ ۱

۱,۲ ۲

۰,۹ ۳

۰,۶ ۴

۱۱ در ۲۵ میلی لیتر محلول ۳٪ درصد جرمی آمونیاک با چگالی $0.98 g \cdot mL^{-1}$ چند مول آمونیاک وجود دارد و

این محلول چند مولار است؟ (گزینه ها را از راست به چپ بخوانید). ($H = 1, N = 14 : g \cdot mol^{-1}$)

۱۹,۶, ۰,۵۲ ۱

۱۵,۷, ۰,۵۲ ۲

۱۹,۶, ۰,۴۹ ۳

۱۵,۷, ۰,۴۹ ۴

۱۲ در رابطه با واکنش محلول های سدیم فسفات و کلسیم کلرید، کدام موارد صحیح نمی باشند؟

آ) یکی از فرآورده های واکنش، محلولی بی رنگ می باشد.

ب) نسبت تعداد کاتیون ها به آنیون ها در فرآورده نامحلول، $\frac{2}{3}$ می باشد.

پ) اختلاف مجموع ضرایب استوکیومتری فرآورده ها با واکنش دهنده ها در معادله موازن شده آن برابر ۱ می باشد.

ت) کاتیون موجود در رسوب حاصل، در آهک نیز یافت می شود.

آ - ت ۱

ب - پ - ت ۲

ب - پ - ت ۳

آ - ب ۴

۱۳ با قرار دادن حجم های برابری از آب دریا و آب مقطر در کنار هم و به وسیله ی یک غشاء نیمه تراوا، با ایجاد

فشار خارجی کدام یک از اتفاق های زیر روی نمی دهد؟

۱) از این روش برای نمک زدایی از آب دریا می توان استفاده کرد.

۲) حجم آب مقطر کاهش و حجم آب دریا افزایش می یابد.

۳) یون های سدیم و کلرید از غشاء نیمه تراوا عبور نمی کنند.

۴) با گذشت زمان محلول آب دریا غلیظ تر می شود.


۱۴ در فرآيند شيرين کردن آب دريا با روش اسمز معکوس کدام يك از گزينه هاي زير درست می باشد؟

۱ محلول غليظ آب دريا از بالاي ظرف خارج می شود.

۲ بدون نياز به پمپ ايجاد فشار کار می کند.

۳ باز گرداندن محلول باقيماده آب دريا، به دليل افزایش يونها، برای محیط زیست مناسب است.

۴ بازدهی اين فرآيند بسیار کم می باشد.



۱۵ چند مورد از مطالب زير، درباره‌ی شكل داده شده درست‌اند؟

آ) با گذشت زمان حجم آب در سمت راست غشای نيمه تراوا کاهش می یابد.

ب) C می‌تواند دیواره‌ی سلولی در گیاهان باشد که در آب قرار گرفته است.

پ) B می‌تواند يك مولکول درشت باشد که با گذشت زمان، غلظت آن رو به کاهش است.

ت) A می‌تواند يك يون آب پوشیده باشد که بار الکتریکی آن، با بار الکتریکی يون آمونیم مشابه است.

۴ ۲

۳ ۲

۲ ۱

۱ ۱

۱۶ کدام موارد از مطالب زير درست‌اند؟

آ) فرآيند تقطير علاوه بر نافلزها، آلاندنه‌ها و فلزهای سمی می‌تواند حشره‌کش‌ها و آفت‌کش‌ها را نيز از آب حذف کند.

ب) آب به دست آمده از تصفیه با روش اسمز معکوس، آلاندنه کم‌تری نسبت به تصفیه با صافی کربن دارد.

پ) آب تصفیه شده با روش صافی کربن پيش از مصرف، نيازي به کلرزنی ندارد.

ت) عدم توانايی در حذف ميكروب‌ها از آب در هر سه روش تقطير، اسمز معکوس و صافی کربن مشترك است.

۴ ب و ت

۳ آ و پ

۲ ب و پ

۱ آ و ت

۱۷


تمام عبارت‌های زير صحيح هستند، به جز

۱ هرچه ميزان مصرف گندم در يك كشور بيش تر باشد، رديپاي آب سنگين تر است.

۲ ميزان آب مصرفی برای تولید يك کيلوگرم چرم بيش تر از تولید يك کيلوگرم گوجه فرنگی است.

۳ آب دريابها و دريماچه‌ها به دليل شور بودن باید قبل از مصرف، نمک‌زدایی و تصفیه شوند.

۴ آب آشاميدني را نمي‌توان از تصفیه آب رودها، دريماچه‌ها و چاه‌ها تهيه کرد.



www.my-dars.ir

۱۸ چه تعداد از عبارت‌های زير صحيح هستند؟

آ) در روش عبور جريان برق از درون آب و انجام واكنش می‌توان ميزان يون های موجود در آب را به درستی نشان داد.

ب) شكل روبرو، نشان‌دهنده‌ی فرآيند تقطير است که در طی آن، با انجام دو

پ) واكنش فيزيکي، آبی حاصل می‌شود که با کلرزنی کامل‌ا سالم و بدون هیچ آلودگی است.

پ) با عبور آب از صافی کربن و به دنبال آن انجام کلرزنی، آب کامل‌ا تصفیه شده حاصل می‌شود.

ت) در روش اسمز معکوس، با گذشت زمان تعداد مولکول‌های آب در محیط رقيق بيش تر می‌شود.

۴ ۲

۳ ۲

۲ ۱

۱ ۱



۱۹ در جدول زیر نام چند ترکیب و فرمول شیمیایی درست نوشته شده است؟

فرمول شیمیایی	نام ترکیب	فرمول شیمیایی	نام ترکیب
$Fe_2(SO_4)_3$	آهن(II) سولفات	$CuNO_3$	مس نیترات
Al_2PO_4	آلومینیم فسفات	$MgOH$	منیزیم هیدروکسید
$ZnCO_3$	روی(II) کربنات	NH_4I	آمونیوم بدید

۴ ۲

۳ ۳

۲ ۲

۱ ۱

۲۰ کدام گزینه نادرست است؟

۱ هوایی که تنفس می‌کنیم، محلولی از گازها و سرم فیزیولوژی، محلول نمک در آب است.

۲ ضدیخ، محلول اتیلن گلیکول است که خواصی مانند رنگ و غلظت در سرتاسر آن یکنواخت است.

۳ هر محلول از دو جزء حلال و حل شونده تشکیل شده که در آن میزان حلال بیشتر است.

۴ گلاب یک مخلوط ناهمگن از چند ترکیب آلی در آب است.

۲۱ ۲۵۰ میلی لیتر محلول آبی، شامل x مول پتاسیم نیترات است. اگر غلظت این محلول 20 ppm باشد. x کدام است؟ (چگالی محلول ۱ گرم بر میلی لیتر است، $K = ۳۹, N = ۱۴, O = ۱۶\text{ g} \cdot mol^{-1}$)

۵ $\times 10^{-3}$ ۲۵ $\times 10^{-4}$ ۳

۵۰,۵ ۲

۵,۰۵ $\times 10^{-2}$ ۱

۲۲ درصد جرمی محلول ۱ مولار کلسیم برمید ($CaBr_2$) با چگالی ۱,۵ گرم بر میلی لیتر چقدر است؟ ($Ca = ۴۰, Br = ۸۰\text{ g} \cdot mol^{-1}$)

۲۵ ۲

۱۵ ۳

۲۰ ۲

۱۰ ۱

۲۳ به 75 mL محلول ۴,۰ مولار سدیم فسفات، چند میلی لیتر آب اضافه کنیم تا غلظت آن $۳,۰\text{ M}$ مولار شود؟

۲۲۵ ۲

۹۲۵ ۳

۱۰۰۰ ۲

۳۰۰ ۱

۲۴ در حل شدن نمک خوراکی در آب، کاتیون‌ها به وسیله قطب..... مولکول آب جذب شده و اگر این

محلول در مدار الکتریکی قرار بگیرد. آنیون‌ها به سمت قطب حرکت می‌کنند.

۲ منفی - مثبت

۳ مثبت - منفی

۱ مثبت - مثبت

۲۵ در چه تعداد از موارد زیر، رسانایی از طریق الکترونی انجام می‌شود؟

«سدیم کلرید، ید، گرافیت، مس، استون»

۴ ۲

۳ ۳

۲ ۲

۱ ۱

اینها را بزنید

۲۶ همه محلول‌های یونی در آب دارای رسانایی الکتریکی یکسانی زیرا که

۱ نمی‌باشند - میزان انحلال پذیری متفاوت دارند.

۲ می‌باشند - میزان انحلال پذیری یکسان دارند.

۳ می‌باشند - به یون‌ها تفکیک می‌شوند.



۳۷ اطلاعات داده شده در کدام ردیف از جدول زیر کاملاً صحیح هستند؟

رسانایی محلول	نوع الکترولیت	ماده	ردیف
رسانای خوب	ضعیف	HCl	۱
رسانای خوب	قوی	Li_2SO_4	۲
رسانای ضعیف	ضعیف	CH_3OH	۳
رسانای خوب	قوی	$AgCl$	۴

۴ ۱۶

۳ ۱۷

۲ ۱۸

۱ ۱۹

۳۸ در ارتباط با انحلال اکسیژن در آب چند عبارت زیر نادرست است؟

آ) با افزایش دما انحلال پذیری اکسیژن به صورت خطی در آب کاهش می‌یابد.

ب) با افزایش مقدار نمک در آب، انحلال پذیری گاز اکسیژن کاهش می‌یابد.

پ) در هر دمایی انحلال پذیری گاز اکسیژن در آب دریا بیش تر از آب آشامیدنی است.

ت) جاذبه یون-دوقطبی ایجاد شده بین یون‌های نمک و آب دریا قوی تر از جاذبه مولکول‌های اکسیژن و آب دریا است.

ث) در هوای گرم، ماهی‌ها به سطح آب می‌آیند چون میزان اکسیژن حل شده در آب کم است.

۴ ۱۶

۳ ۱۷

۲ ۱۸

۱ ۱۹

۳۹ کدام گزینه نادرست است؟

۱) با حل کردن قرص جوشان در آب، گاز CO_2 تولید می‌شود که در آب گرم مقدار گاز آزاد شده کم تر است.

۲) با افزایش فشار گازها، انحلال پذیری آن‌ها با شبیث ثابت افزایش می‌یابد.

۳) انحلال پذیری گازها در آب به سه عامل، نوع گاز، دما و فشار بستگی دارد.

۴) ماهی‌های درون آبزی دان با عبور آب از درون آبشش خود، اکسیژن مولکولی حل شده در آب را جذب می‌کنند.


۴۰ با توجه به نمودار رو برو چه تعداد از عبارت‌های زیر درست است؟

آ) در دمای ${}^{\circ}C 5$ ، انحلال پذیری گاز اکسیژن در آب دریا برابر ۱ میلی گرم است.

ب) با افزودن مقداری نمک به آب، انحلال پذیری گاز اکسیژن کاهش می‌یابد.

پ) در تمام دماها، انحلال پذیری گاز اکسیژن در آب آشامیدنی بیش تر از آب دریاست.

ت) تأثیر دما بر انحلال پذیری گاز اکسیژن در آب آشامیدنی و آب دریا تقریباً یکسان است.



۴ ۱۶

۳ ۱۷

۲ ۱۸

۱ ۱۹



۳۱ در فشار 1 atm و دمای ${}^{\circ}\text{C}$ حداقل $65,0$ لیتر گاز اکسیژن در 2 کیلوگرم آب حل شده است انحلال پذیری گاز اکسیژن در این شرایط چند گرم است؟ ($O = 16\text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}$)

$$4 \times 10^{-3} \quad \text{(F)}$$

$$4,2 \times 10^{-3} \quad \text{(W)}$$

$$6 \times 10^{-3} \quad \text{(Z)}$$

$$2,5 \times 10^{-3} \quad \text{(I)}$$

۳۲ در دمای ${}^{\circ}\text{C}$ و فشار 2 اتمسفر، $50,0$ گرم گاز اکسیژن در 500 گرم آب حل شده و محلول سیر شده به دست می‌آید. در این دما انحلال پذیری گاز اکسیژن در فشار 5 اتمسفر کدام است؟

$$2,4 \times 10^{-3} \quad \text{(F)}$$

$$1,5 \times 10^{-1} \quad \text{(W)}$$

$$1,02 \times 10^{-2} \quad \text{(Z)}$$

$$1,75 \times 10^{-2} \quad \text{(I)}$$

۳۳ با افزایش دمای دو کیلوگرم آب سیر شده از گاز کلر از 20°C تا 53°C چند لیتر گاز کلر در شرایط آزاد می‌شود و چند گرم کلر در محلول باقی می‌ماند؟ (انحلال پذیری کلر در آب در دماهای 20°C و 53°C به تقریب برابر $73,0$ و $375,0$ گرم در 100 گرم آب است). ($Cl = 35,5\text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}$)

$$7,5 \text{ و } 4,48 \quad \text{(F)}$$

$$3,75 \text{ و } 4,48 \quad \text{(W)}$$

$$7,5 \text{ و } 2,24 \quad \text{(Z)}$$

$$3,75 \text{ و } 2,24 \quad \text{(I)}$$

۳۴ ترکیب‌هایی همانند می‌توانند به هر نسبتی در آب حل شوند به همین دلیل محلول سیر شده‌ای از آن‌ها تعییه کرد.

۱ هگزان و استون - می‌توان ۲ هگزان و اتانول - نمی‌توان ۳ استون و اتانول - نمی‌توان

۳۵ کدام یک از عبارت‌های داده شده نادرست است؟

الف) بنزین یک ماده خالص با فرمول مولکولی C_8H_{18} است.

ب) گشتاور دوقطبی اغلب هیدروکربن‌ها در حدود صفر است.

پ) در مخلوط‌های ناهمگن به حالت مایع، مانند آب و هگزان، اجزای مخلوط به میزان ناچیزی در یکدیگر حل می‌شوند که قابل چشم پوشی نیست.

ت) کمتر از نیمی از آب بدن درون یاخته‌ها و مابقی در مایع‌های برون سلولی است.

۱ ب و ت

۲ الف و پ و ت

۳۶ در یک انحلال مولکولی کدام یک از رویدادهای زیر اتفاق نمی‌افتد؟


۱ مولکول‌های حل شونده ماهیت خود را در محلول حفظ می‌کنند.

۲ ماده‌ی حل شونده به یون‌هایی با بار ناهم‌نام تفکیک می‌شود.

۳ میانگین جاذبه‌ی میان ذرات حلال و حل شونده از حلال و از حل شونده بیشتر است.

۴ ساختار مولکول‌های حل شونده در محلول دچار تغییر نمی‌شود.

۳۷ در معادله‌ی انحلال ترکیب یونی به ازای یک ذره‌ی اولیه، ذره یون با بار ناهم‌نام بدست آید. می‌آید.





۳۸ بارييم سولفات ترکيبي در آب بوده و ميانگين پيوندهای هيدروژنی در آب و پيوند یونی آن از نيروي جاذبه یون - دوقطبی در محلول است.

۲ نامحلول - بيش تر يا مساوي

۱ نامحلول - بيش تر

۳ محلول - کم تر يا مساوي

۲ محلول - کم تر

۳۹ ۸۰ گرم اتانول را با ۴۰ گرم آب مخلوط می کنيم. در مخلوط حاصل، به عنوان حلال می باشد. زيرا


که دارد. ($H_2O = 18$, $C_2H_5OH = 46$: $g \cdot mol^{-1}$)

۲ اتانول - تعداد مول بيش تری

۱ آب - تعداد مول بيش تری

۳ اتانول - جرم بيش تری

۳ آب - جرم کم تری



۴۰ شكل مقابل نشان دهنده اى انحلال کدام ترکيب یونی در آب است؟

۲ کلسیم هيدروکسید

۱ منیزیم کربنات

۳ آلومینیم نیترات

۲ سدیم سولفات

۴۱ چه تعداد از مخلوط های زير ناهمگن است؟

«استون در آب - يد در کربن تتراکلرید - آب و بنزین - نمک طعام و هگزان - اتانول در هگزان»

۴ ۲

۳ ۲

۲ ۲

۱ ۱

۴۲ ۱,۵ گرم ترکيب سدیم هیدروکسید ناخالص که ۸۰٪ جرم آن را نمک خالص سدیم هیدروکسید و مابقی آن را ناخالصی تشکيل می دهد، در ۴۳,۵ گرم آب حل شده است. درصد جرمی سدیم هیدروکسید در محلول تقریباً کدام است؟ (ناخالصی ها در آب حل می شوند).



۲,۳۳ ۲

۱,۳۳ ۳


۳,۳۳ ۲

۲,۶۷ ۱

۴۳ در هریک از محلول های (۱) و (۲) به ترتیب جزء حلال کدام است؟
 $(O = 16, C = 12, H = 1 : \frac{g}{mol})$



درباره اى شكل زير کدام عبارت نادرست است؟



انحلال يك ترکيب مولکولی در آب را نشان می دهد که در آن مولکول های حل شونده، ماهیت خود را در محلول حفظ می کنند.

۲ نيروهای بین مولکولی در محلول قوی تر از نيروي بین مولکولی در حل خالص و حل شونده خالص است.

۳ انحلال استون در آب و نيز انحلال يد در هگزان از اين نوع هستند.

۴ گشتاور دوقطبی در حل خالص و حل شونده خالص تقریباً برابر صفر است.



۴۵ در بين مولکول های CO , N_2 , Br_2 و I_2 فقط CO در ميدان الکتریکی جهت گيري می کند، کدام مقایسه در مورد نیروی بين مولکولی آنها صحیح می باشد؟ (دما اتاق و فشار ۱ atm)

$$Br_2 > I_2 > CO > N_2 \quad ۲$$

$$CO > I_2 > Br_2 > N_2 \quad ۱$$

$$N_2 > CO > I_2 > Br_2 \quad ۳$$

$$I_2 > Br_2 > CO > N_2 \quad ۲$$

از انحلال کامل هر واحد از کدام ترکیب زیر در آب، یون های بیشتری تولید می شود؟

۲ لیتیم کربنات

۳ منیزیم نیترات

۱ آمونیوم سولفات

۴۷ با قرار دادن مولکول های آب در یک میدان الکتریکی، آب از سمت اتم های خود به سمت قطب میدان کشیده می شود که بیانگر خصلت مولکول آب است و گشتاور دو قطبی آن برابر با است.

۲ هیدروژن - منفی - دوقطبی - $1,85D$

۱ اکسیژن - مثبت - ناقطبی - صفر

۳ هیدروژن - مثبت - ناقطبی - صفر

۲ اکسیژن - منفی - دوقطبی - $1,85D$

۴۸ به مولکولی مانند یک مولکول گفته می شود چون در ساختار آن بخش هایی با بار مثبت و منفی وجود

O_2 - ناقطبی - ندارد CO_2 - ناقطبی - دارد HCl - قطبی - دارد CH_4 - قطبی - دارد

۴۹ ترکیب F_2 در مقایسه با ترکیب HCl (دو ترکیب با جرم مولی نزدیک به هم هستند)، نقطه ی جوش داشته و در میدان الکتریکی

۲ پایین تر - جهت گیری نمی کند

۱ بالاتر - جهت گیری نمی کند


۳ پایین تر - به سمت قطب مثبت کشیده می شود

۵۰ معادله ای انحلال پذیری ترکیب فرضی B در آب (S) بر حسب دما در مقیاس سلسیوس (θ) به صورت $S = 2\theta + 5$ است. با توجه به جدول زیر، نسبت غلظت مولی محلول سیر شده ای از نمک B در دما $22,5^\circ C$ به

غلظت مولی محلول اشباع دیگری از همان نمک در دما $10^\circ C$ چقدر است؟ ($B = 70 g \cdot mol^{-1}$)

دما ($^\circ C$)	چگالی محلول ($\frac{g}{cm^3}$)	۱,۷۵ (۲)	۲ (۱)
۱۰	۱,۴۰	۲,۲۵ (۳)	۱,۵ (۲)
۲۲,۵	۱,۴۷		

۵۱ مدل فضا پر کن نشان داده شده می تواند مربوط به یون های و باشد.



۲ سولفات - آمونیوم

۱ نیترات - کربنات

۳ کربنات - فسفات

۲ نیترات - آمونیوم



۵۲ ترکيب بر خلاف ترکيب حالت فيزيكي داشته و داراي نقطه‌ي جوش است.

$I_2 - Br_2$ مایع – بالاتری ۱

$-Br_2 - H_2S$ گاز – بالاتری ۲

$I_2 - Cl_2$ گاز – پاين تری ۱

$-Cl_2 - F_2$ گاز – پاين تری ۲



۵۳ نيروهای بين مولکولي در تعين يك ماده نقش مهمي داشته و در حالت

۱ شكل مولکولي و گشتاور دوقطبی – مایع کم تر از گازی است.

۲ حالت فيزيكي و نقطه‌ي جوش – جامد کم تر از مایع است.

۳ گشتاور دوقطبی و نقطه‌ي انجماد – جامد بيش ترين مقدار را دارد.

۴ حالت فيزيكي و خواص – گازی شكل کم ترين مقدار را دارد.

۵۴ تغييرات اتحال پذيری نمک‌های A و B مطابق جدول زير است. با توجه به جدول زير کدام گزينه درست است؟ (تغييرات اتحال پذيری اين نمک‌ها را کاملًا خطی فرض کنيد).

$\theta(^{\circ}C)$	۰	۱۰	۲۰	۳۰
$S_A\left(\frac{g}{100gH_2O}\right)$	۱۰	۱۵	۲۰	۲۵
$S_B\left(\frac{g}{100gH_2O}\right)$	۳۵	۳۷	۳۹	۴۱

۱ اثر دما بر اتحال پذيری نمک B بيش تر از نمک A است.



چنانچه محلول سير شده‌ی اين دو نمک را از دو مقدار يكسان حلّال در دمای $90^{\circ}C$ تهيه کنيم جرم محلول B بيش تر می‌شود.

۲ در دمای $12^{\circ}C$ ۲,۹ گرم محلول سير شده‌ی نمک A در دمای $12^{\circ}C$ ، $4^{\circ}C$ ۰ گرم نمک حل شده است.

۳ در دمای $C^{\circ}C$ اتحال پذيری دو نمک باهم يكسان است.



۵۵ ترکيب با وجود آن که جرم مولی از ترکيب دارد اما به دليل گشتاور دوقطبی نقطه‌ي جوش خواهد داشت.

۱ $H_2O - H_2S$ – کم تر – $H_2O - H_2S$ بيش تر – پاين تر

۲ $H_2O - H_2S$ – کم تر – $H_2O - H_2S$ بيش تر – پاين تر



۵۶ با توجه به سه محلول سير شده‌ی زير، هریک از نمک‌های A، B و C به ترتیب در کدام دسته‌بندی از مواد براساس اتحال پذيری قرار می‌گيرند؟ (دما $25^{\circ}C$ است).

الف) محلول $12g$ نمک A در $10g$ آب

الف) محلول $25g$ نمک A در $20g$ آب



ب) محلول $5g$ نمک C در $10g$ آب



۱ نامحلول – محلول – کم محلول

۱ محلول – نامحلول – کم محلول



۲ نامحلول – کم محلول – محلول

۲ کم محلول – نامحلول – محلول





۵۷ کدام یک از مقایسه‌های زیر نادرست است؟

$NO > CO_2$: انحلال پذیری در آب

$CH_3OH > CH_3Br$: نقطه‌ی جوش

$H_2O > H_2S$: قطبیت

$C_6H_6O > C_6H_{14}$: گشتاور دوقطبی

۵۸ کدام یک از مقایسه‌های زیر، ترتیب درست نقطه‌ی جوش ترکیبات داده شده است؟

$HF > H_2O > NH_3 > CH_4$

$HF > HCl > HBr > HI$

$F_2 > Cl_2 > Br_2 > I_2$

$NH_3 > ASH_3 > PH_3$

۵۹ آرایش مولکول‌های H_2O در ساختار بین به گونه‌ای است که اتم‌های در رأس حلقه‌های قرار داشته و با داشتن فضاهای خالی منظم در بعد گسترش می‌یابد.

۱ هیدروژن - شش ضلعی - دو

۳ هیدروژن - چهارضلعی - سه

اکسیژن - چهارضلعی - سه

اکسیژن - شش ضلعی - سه

۶۰ اگر محلولی که از مخلوط کردن ۱۵٪ گرم کلسیم نیترات در ۵۰ گرم آب حاصل می‌شود را با محلولی که از مخلوط کردن مقدار کافی پتابسیم سولفات در ۱۵۰ گرم آب به دست آمده است، باهم مخلوط کنیم، بین ذرات آن واکنشی رخ می‌دهد که مواد کلسیم سولفات و پتابسیم نیترات (پتابسیم نیترات کاملاً در آب حل می‌شود) را تولید می‌کند. محاسبه کنید تقریباً چند گرم از کلسیم سولفات تشکیل شده به صورت رسوب در کف ظرف می‌نشیند؟ (در تمامی مراحل از ایجاد حالت فراسیر شده برای محلول‌ها صرف نظر کنید و انحلال پذیری کلسیم سولفات را در دمای C° و در ۱۰۰ گرم آب برابر با ۲۳٪ گرم بدون تأثیرپذیری از نمک‌های حل شده‌ی دیگر در نظر بگیرید. دما در تمامی مراحل ثابت و برابر $C^{\circ} 25$ است).

$$(Ca = 40, K = 39, S = 32, O = 16, N = 14 : g \cdot mol^{-1})$$

۰,۲۸

۰,۴۶

۰,۵۱

۰,۰۵

۶۱ دمای جوش ترکیب هیدروژن‌دار عناصر گروه هفدهم جدول (I, Br, Cl, F) در گزینه‌ها آمده است، کدام عدد متعلق به دمای جوش هیدروژن برمی‌د است؟


-۶۶,۲

-۳۴,۹

-۸۴,۶

۱۹,۹

۶۲ نمودار مقابل تغییرات دمای جوش ترکیب‌های هیدروژن‌دار عناصر گروه شانزدهم (X) را نسبت به جرم مولی نشان می‌دهد، کدام ترکیب زیر می‌تواند باشد؟



$$H_2O = 18$$

$$H_2S = 34$$

$$H_2Se = 81$$

$$H_2Te = 129$$

آنکه بینیم
این




۶۳ کدام عامل در اتصال مولکول‌های یک ماده به هم در حالت جامد یا مایع آن دخالت ندارد؟

۱ پیوند اشتراکی

۲ پیوند هیدروژنی

۳ نیروی جاذبه‌ی واندروالسی

۴ نیروی جاذبه‌ی دوقطبی - دوقطبی



۶۴ با توجه به شکل مقابل کدام مطلب نادرست است؟

۱

بیشتر بودن نقطه‌ی جوش آب به وجود پیوند هیدروژنی قوی بین مولکولی در آن مربوط است.

۲


افزایش نقطه‌ی جوش از H_2S به H_2Te به افزایش جرم مولی آن‌ها مربوط است.

۳

تفاوت زیاد نقطه‌ی جوش آب و H_2S به تفاوت جرم مولی آنها وابسته است.

۴

پایین بودن دمای جوش H_2S و H_2Se و H_2Te نشانه‌ی عدم امکان تشکیل پیوند هیدروژنی در آن‌ها است.



۶۵ چه تعداد از عبارت‌های زیر نادرست است؟

الف) شکل روبرو، مربوط به مولکول‌های ناقطبی است.

۱

ب) در مولکول کربن دی‌اکسید، قدرت نیروی بین مولکولی در حالت مایع بیشتر از سایر حالت‌های فیزیکی است.

۲

پ) با افزایش میزان قطبیت مولکول‌ها، گشتاور دوقطبی نیز افزایش می‌یابد.

ت) در ساختار آب مایع، همانند یخ، مولکول‌های آب در جاها‌یی به نسبت ثابت قرار دارند.

۳

۴

۶۶ چند مورد از عبارت‌های زیر در مقایسه مولکول آب و هیدروژن سولفید درست است؟

الف) هر دو ماده مولکول‌های خمیده (V شکل) و قطبی دارند و در دمای $25^{\circ}C$ به حالت مایع هستند.

۱

ب) جرم مولی هیدروژن سولفید نزدیک به دو برابر جرم مولی آب است.

پ) تفاوت دمای جوش این دو ماده برابر با $16^{\circ}C$ است.

ت) گشتاور دوقطبی مولکول‌های H_2O و H_2S به ترتیب برابر با $1,85D$ و $1,97D$ است.

ث) نیروهای جاذبه میان مولکول‌های آب به اندازه‌ای قوی است که در شرایط اتاق می‌تواند این مولکول‌ها را کنار یکدیگر نگه دارد و آب به حالت مایع باشد.

www.my-dars.ir

۶۷ در دما و فشار اتاق با افزودن اندکی ید به هگزان، محلول تشکیل و از جمله کاربردهای هگزان، می

توان به اشاره کرد.

آنچه باید بدانیم

۱ می‌شود - حلal مواد ناقطبی و رقیق‌کننده‌ی رنگ (تینر)

۱

۲ نمی‌شود - حلal مواد ناقطبی و رقیق‌کننده‌ی رنگ (تینر)

۲

۳ نمی‌شود - حلal مواد ناقطبی و رقیق‌کننده‌ی رنگ (تینر)

۳



۶۸ در ۲۰۰ ميلی لیتر محلول ۲۸ درصد جرمی سدیم هیدروکسید در آب خالص با چگالی ۱/۲ گرم بر ميلی لیتر به ترتیب از راست به چپ، مول حل شونده و گرم حلال وجود دارد.
 $(NaOH = 40 \text{ g} \cdot mol^{-1})$

۱۴۵,۳ - ۱,۲۷ ۲

۱۴۵,۳ - ۵۴,۷ ۳

۱۷۲,۸ - ۱,۶۸ ۲

۱۷۲,۸ - ۶۷,۲ ۱

۶۹ کدام مقایسه در مورد آب و هگزان در دما و فشار اتاق صحیح نیست؟

چگالی: هگزان < آب ۱

تعداد انواع عناصر تشکیل دهنده: آب = هگزان ۳

گشتاور دوقطبی: هگزان > آب ۱

انحلال پذیری در اتانول: آب < هگزان ۳

۷۰ برای تشکیل هر پیوند هیدروژنی به یک جفت الکترون ناپیونندی که روی اتم‌های O یا F یا N وجود داشته باشد و به یک اتم H متصل به اتم‌های F ، O یا N نیاز است. با توجه به مطالعه که گفته شد، کدام مقایسه در مورد نقطه‌ی جوش (در دما و فشار اتاق) و میانگین تعداد پیوندهای هیدروژنی موجود در ترکیبات خالص به ازای یک مولکول از NH_3 و H_2O ، HF (هر سه در یک حالت فیزیکی) صحیح است؟

۱ نقطه‌ی جوش: $HF < H_2O < NH_3$ / میانگین تعداد پیوندهای هیدروژنی: $HF < H_2O < NH_3$ ۲ نقطه‌ی جوش: $NH_3 = H_2O < HF$ / میانگین تعداد پیوندهای هیدروژنی: $NH_3 = H_2O < HF$ ۳ نقطه‌ی جوش: $HF < H_2O < NH_3 < HF < H_2O$ / میانگین تعداد پیوندهای هیدروژنی: $HF < H_2O < NH_3 < HF < H_2O$ ۴ نقطه‌ی جوش: $NH_3 = HF < H_2O < HF < NH_3$ / میانگین تعداد پیوندهای هیدروژنی: $NH_3 = HF < H_2O < HF < NH_3$

۷۱ نمک فرضی A را طوری در نظر بگیرید که از انحلال آن در آب هیچ‌گونه تغییر حجمی در محلول حاصل نشود و معادله‌ی انحلال این نمک (S_A) بر حسب دما در مقیاس سلسیوس (θ) به صورت $S_A(\frac{gA}{100gH_2O}) = 0,5\theta + 25$ باشد. اگر یک نمونه ۷/۲ کیلوگرمی از محلول سیر شده‌ی این نمک را در دمای ۵۰ درجه‌ی سانتی‌گراد در اختیار داشته باشیم و آن را تا دمای $10^{\circ}C$ سرد کنیم (بدون تشکیل محلول فراسیر شده) مقداری از نمک A رسوب می‌کند. حال با افزودن مقدار کافی آب $10^{\circ}C$ و هم زدن این، محلول را دوباره به حالت سیر شده می‌رسانیم. چگالی محلول نهایی را بر حسب $\frac{kg}{L}$ با فرض این که با تغییر دما تغییرات حجم آب ناچیز است به دست آورید. ($1 = \frac{g}{mL}$ چگالی آب در تمامی دماها)

۱,۵۰ ۲

۱,۴۰ ۳

۱,۳۰ ۲

۱,۲۰ ۱



با توجه به جدول زیر، a , b , c و d از راست به چپ کدام‌اند؟ ۷۲

غلظت یونی		مقدار یون	نام یون	نام
ppm	درصد جرمی	(میلی گرم در یک کیلوگرم آب دریا)		
۳۸۰	b	۳۸۰	K^+	یون پتابسیم
d	4×10^{-2}	c	Ca^{2+}	یون a

$400 \text{ و } 400, 3, 8 \times 10^{-2}$ کلسیم (II) ۱

$400 \text{ و } 400, 3, 8 \times 10^{-2}$ کلسیم ۲

$400 \text{ و } 400, 3, 8 \times 10^{-2}$ کلسیم (II) ۱

$400 \text{ و } 400, 3, 8 \times 10^{-2}$ کلسیم ۲

با توجه به جدول زیر، معادله‌ی انحلال‌پذیری نمک AB کدام است؟ (تفییرات انحلال‌پذیری نمک AB را با دما کامل‌آخ طی فرض کنید). ۷۳

$\theta(^{\circ}C)$	۰	۲۰	۴۰	۶۰
$S\left(\frac{g_{AB}}{100g_{H_2O}}\right)$	x	$x+a$	$x+2a$	$x+3a$

$$S = 2x + \frac{a}{20}\theta \quad \text{۳}$$

$$S = 2x + \frac{a}{10}\theta \quad \text{۴}$$

$$S = x + \frac{a}{20}\theta \quad \text{۵}$$

$$S = x + \frac{a}{10}\theta \quad \text{۱}$$

جدول زیر انحلال‌پذیری دو گاز را بر حسب گرم در 100 g آب در فشار یکسان نشان می‌دهد. با توجه به آن

کدام یک از مطالب زیر صحیح می‌باشد؟ ($O = 16$, $N = 14$: $g \cdot mol^{-1}$) (رونده تغییرات میزان انحلال‌پذیری گازها را بر حسب دما، یکنواخت (مثلًا همواره در حال افزایش یا همواره در حال کاهش) در نظر بگیرید). آ) با توجه به

$40^{\circ}C$	$30^{\circ}C$	$20^{\circ}C$	دما
			گاز
۰,۰۹۷	۰,۱۲۶	۰,۱۶۹	A
۰,۰۰۳	۰,۰۰۴	۰,۰۰۶	NO

مقادیر داده شده گاز A می‌تواند کربن دی‌اکسید باشد.

ب) اگر 1 kg آب سیر شده از گاز NO را از دمای $20^{\circ}C$ به $40^{\circ}C$ برسانیم (بدون تشکیل حالت فراسیر شده)، در شرایط STP ، $22,4$ میلی‌لیتر گاز خارج می‌شود.

پ) در دمای $25^{\circ}C$ 250 ml محلول حاوی 338 g گرم گاز A در 200 ml آب، یک محلول فراسیر شده است. ۱

۳ هیچ کدام




۴ ب - پ

۵ آ - ب

۱ تمامی موارد

ظرف‌های (۱)، (۲) و (۳) به ترتیب حاوی محلول‌های A , B و C می‌باشند. این محلول‌ها به ترتیب کدام می‌تواند باشد؟ ۷۵

$(Cl = 35,5, Mg = 24, Na = 23, O = 16, H = 1 : g \cdot mol^{-1})$



آ) نیم لیتر از محلول آبی 20 g سدیم هیدروکسید در یک لیتر آب

ب) نیم لیتر از محلول آبی $9,5\text{ g}$ منیزیم کلرید در 250 ml لیتر آب


پ) نیم لیتر محلول 2 mol/L سدیم هیدروکسید

۳ ب - آ - پ

۴ پ - آ - ب

۵ آ - ب - پ

۱ پ - ب - آ



با توجه به نمودار داده شده، از نتایج بررسی های تجربی می توان گفت که: ۷۶

انحلال گاز NH_3 در آب گرماگیر است. ۱

انحلال NH_4Cl در آب گرماده است. ۲

۳

انحلال پذیری گاز NH_3 با دما رابطه‌ی عکس دارد و همواره در هر دمایی بیشتر از انحلال پذیری NH_4Cl است. ۴
انحلال پذیری NH_4Cl در آب، با افزایش دما بیشتر می‌شود. ۵

یک صافی تصفیه‌ی آب آشامیدنی، ظرفیت جذب حداقل ۳ مول یون نیترات را از آب دارد. با استفاده از این ۷۷

صافی حداقل می‌توان چند لیتر آب شهری دارای ۱۰۰ ppm یون نیترات را به طور کامل تصفیه کرد؟

$$(چگالی آب ۱\text{ g}\cdot ml^{-1}) \text{ و } (N = ۱۴, O = ۱۶ \frac{g}{mol})$$

۱۸۶۰ ۶

۸۶۰ ۷

۸۰۰ ۸

۴۰۰ ۹

..... مقدار یون حل شده در آب دریا، بیشتر از یون بوده و تعداد اتم‌های یون ۷۸

کمتر از تعداد اتم‌های یون می‌باشد.

۱ پتاسیم - برومید - سولفات - نیترات ۶

۱ منیزیم - کلرید - کربنات - فسفات ۱۰

۲ کلسیم - سدیم - فسفات - سولفات ۷

۳ سولفات - کربنات - نیترات - فسفات ۱۱

ترتیب صحیح مقدار منابع آبی موجود در کره‌ی زمین به کدام صورت زیر است؟ ۷۹

۱ کوه‌های یخ > آب‌های زیرزمینی > اقیانوس‌ها ۶

۱ کوه‌های یخ > آب‌های زیرزمینی > اقیانوس‌ها ۱۰

۲ آب شیرین دریاچه‌ها > آب‌های زیرزمینی > آب شور دریاچه‌ها > اقیانوس‌ها ۷

۳ آب شیرین دریاچه‌ها > آب‌های زیرزمینی > آب شور دریاچه‌ها > اقیانوس‌ها ۱۱

با توجه به نمودار در چهار ظرف دارای ۳۰۰ گرم آب در دمای ۴۰°C به ترتیب و از راست به چپ، ۴۰ g از ۸۰

ترکیب‌های لیتیم سولفات (A)، پتاسیم کلرید (B)، سدیم کلرید (C) و پتاسیم نیترات (D) اضافه و پس از هم زدن، محلول از مواد جامد باقی‌مانده جداسازی شده است. ترتیب چگالی محلول‌های به دست آمده کدام است؟ (از


تغییر حجم حلal، چشم‌پوشی شود.)

A > B > C > D ۱

B > D > C > A ۲

D > C > A > B ۳


D > B > C > A ۴



www.my-dars.ir



نقطه‌ی جوش (K)



با توجه به نمودار زیر چه تعداد از موارد زیر صحیح است؟ ۸۱

آ) در میدان الکتریکی مولکول‌های C منظم‌تر جهت‌گیری می‌کنند.

ب) نیروی بین مولکولی $C < B < A$ می‌باشد.

پ) در شرایط یکسان ترکیب B، به میزان بیش‌تری در هگزان حل می‌شود.

ت) بین مولکول‌های C پیوند هیدروژنی برقرار است.

۴ ۲

۳ ۳

۲ ۲

۱ ۱

۸۲ اگر ۲۸,۷۵ میلی‌لیتر اتانول خالص را با ۱ مول آب مقطر مخلوط کنیم، درصد جرمی اتانول در این محلول

کدام است؟ (چگالی اتانول برابر $1\text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}$ و $1\text{ g} \cdot \text{ml}^{-1}$ است.) ($H = 1$, $O = 16$)

%۴۸ ۲

%۴۶ ۳

%۴۵ ۲

%۴۴ ۱

۸۳ عناصرهای A و B می‌توانند با یکدیگر ترکیبی با فرمول عمومی AB_x تشکیل دهند که

است.

- قطبی AB_3 ۲- ناقطبی AB_2 ۳- ناقطبی AB_3 ۲- قطبی AB_1 ۱

۸۴ دو محلول شامل آب و متانول، اولی دارای ۴۰ درصد جرمی و دومی دارای ۷۰ درصد جرمی از متانول، موجود

است. اگر ۲۰۰ گرم از محلول اول با ۳۰۰ گرم از محلول دوم با یکدیگر مخلوط شوند. درصد جرمی متانول در محلول

به دست آمده به تقریب کدام است؟

۶۵ ۲

۶۱ ۳

۵۸ ۲

۴۹ ۱

۸۵ نوع محلول‌های A و B به ترتیب از راست به چپ کدامند؟


محول	جرم آب (g)	حل شونده	(g)	دما (°C)
A	۵۰	KCl	۳۰	۴۲
B	۲۰۰	KNO _۳	۷۰	۵۰

۱ فراسیر شده - سیر نشده

۲ سیر نشده - سیر شده

۳ سیر نشده - سیر نشده

۴ فراسیر شده - سیر شده



www.my-dars.ir



با توجه به داده‌های جدول زیر، کدام مطلب درست است؟ ۸۶

انحلال‌پذیری در $50^{\circ}C$	انحلال‌پذیری در $20^{\circ}C$	فرمول ماده
۸۵	۵۵	$Pb(NO_3)_2$
۸۲	۲۸	KNO_3
۱۶	۶	$KClO_3$
۴۳	۳۲	KCl

۱ در دمای $20^{\circ}C$ چگالی محلول KNO_3 از بقیه بیشتر است.

۲ شب نمودار انحلال‌پذیری پتاسیم نیترات در برابر دما، از سه ماده‌ی دیگر بیشتر است.

۳ محلول ۱۵۰ گرم سرب (II) نیترات در 250 g آب در دمای $20^{\circ}C$ سیرنشده است.۴ در ۵۰۰ گرم محلول سیرنشده پتاسیم کلرات در دمای $20^{\circ}C$ ۷۰ گرم از آن وجود دارد.۸۷ برای ضد عفونی کردن آب یک استخر از محلول کلر ۷٪ درصد جرمی استفاده می‌شود. اگر مقدار مجاز کلر موجود در آب استخر 1 ppm باشد، چند گرم از این محلول برای ضد عفونی کردن 700 m^3 آب نیاز است؟ (جرم یک لیتر آب استخر را یک کیلوگرم در نظر بگیرید).۷ $\times 10^4$ ۲۱۰^۴ ۳۷ $\times 10^3$ ۲۱۰^۵ ۱۸۸ قابلیت حل شدن نمک « MX » در دمای معین ۶۰ گرم است. چند گرم از این محلول سیرنشده در همان دما دارای ۱۲ گرم از این نمک است؟

۸ ۲

۱۶ ۳

۳۲ ۲

۱۶۰ ۱



۸۹ معادله‌ی انحلال‌پذیری پتاسیم کلرید به صورت $S = 0,8\theta + 72$ است. اگر دمای ۱۰۰ گرم محلول KCl را از $20^{\circ}C$ به $10^{\circ}C$ کاهش دهیم رسوب تشکیل شده را در چند گرم محلول آن حل کنیم تا محلول ۸۰ درصد جرمی به دست آید؟

۷,۳ ۲

۶,۵ ۳

۵,۳ ۲

۸ ۱

۹۰ اگر مقدار یون کلرید حل شده در ظرف A دو برابر مقدار یون کلرید حل شده در ظرف B باشد، غلظت یون کلرید محلول در ظرف A بر حسب ppm ، چند برابر غلظت یون کلرید محلول در ظرف B بر حسب ppm می‌باشد؟

۱ ۱

۲ ۲

۴ ۳

۰,۵ ۲

آیه‌آنلاین



۹۱ با ۲۹,۲۵ گرم سدیم کلرید $NaCl$ ۵۰٪ مول در لیتر می‌توان تهیه کرد؟
 $(NaCl = 58,5 \text{ g} \cdot mol^{-1})$

۰,۴۲۵ ۱

۰,۴ ۲

۰,۱۲۵ ۳

۶۲۵ ۴

۹۲ برای دو ترکیب فرضی A و B ، معادله‌ی اتحال پذیری به صورت زیر است:

$$A : S = 0,8\theta + 72 \quad , \quad B : S = 0,3\theta + 27$$

چه تعداد از عبارت‌های زیر درست است؟ $(A \text{ جرم مولی} = 84 \text{ g} \cdot mol^{-1})$

الف) در دمای ${}^{\circ}C$ ، اتحال پذیری ترکیب A بیش از ۳ برابر اتحال پذیری ترکیب B است.

ب) برای ماده‌ی A ، در دمای ${}^{\circ}C$ ۵۰ با حل کردن ۴ مول از این ترکیب در ۳۰۰ گرم آب، محلول سیر شده حاصل می‌شود.

پ) اگر دمای ۲۹۵ گرم محلول A را از ${}^{\circ}C$ به ${}^{\circ}C$ کاهش دهیم، ۲۰ گرم رسوب تشکیل می‌شود.

ت) با افزایش دما، اتحال پذیری ترکیب A ، بیش تر افزایش می‌یابد.

۴ ۱

۳ ۲

۲ ۳

۱ ۴

۹۳ اگر مقدار معینی ماده‌ی حل شونده را در یک کیلوگرم آب حل کنیم، درصد جرمی آن از غلظت ppm آن می‌باشد و میان این دو واحد غلظت می‌توان رابطه‌ی را در نظر گرفت.


$$ppm \times 10^4 = \text{درصد جرمی} \quad ۱$$

$$\text{بیش تر - درصد جرمی} \quad ۱$$

$$ppm \times 10^4 = \text{کم تر - درصد جرمی} \quad ۲$$



$$\text{کم تر - درصد جرمی} \quad ۲$$

۹۴ در کدام گزینه فرآیند تهیه‌ی فلز منیزیم از آب دریاها به درستی بیان شده است؟



www.my-dars.ir

۹۵ اگر هر ذره‌ی یکسان را در شکل زیر معادل ۱۰۰٪ مول در نظر بگیریم، کدام تساوی به درستی بیان شده است؟



جرم محلول ۱

جرم حل شونده ۲

حجم حلال ۱

حجم محلول ۲



برای تهیه‌ی ۲۰۰ میلی‌لیتر محلول ۵ مولار سود باید ۹۶
 $(NaOH = 40 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1})$

۱) ۴ گرم سود را در ۲۰۰ میلی‌لیتر آب حل کرد.

۲) ۵ مول سود را در آب حل کرده و حجم محلول آن را به ۲۰۰ میلی‌لیتر رساند.

۳) ۴ گرم سود را در آب حل کرد و حجم آن را به ۲۰۰ میلی‌لیتر رساند.

۴) ۵ مول سود را در ۲۰۰ میلی‌لیتر آب حل کرد.

یون نیترات (NO_3^-) باید کم ترین غلظت ممکن را در آب آشامیدنی داشته باشد، زیرا: ۹۷

۱) در آب ناپایدار است و به سرعت به یون‌های دیگر تبدیل می‌شود.

۲) به راحتی با هموگلوبین ترکیب شده و انتقال اکسیژن را مختل می‌کند.

۳) توسط دستگاه گوارش کاملاً از بین می‌رود.

۴) باعث افزایش حالت اسیدی معده می‌شود.

شکل روبرو، دستگاه اندازه‌گیری قند خون (گلوکومتر) را نشان می‌دهد. این دستگاه میلی‌گرم‌های گلوکز را در

دسى‌لیتر (dL) از خون نشان می‌دهد. غلظت مولی گلوکز در این نمونه از خون به تقریب چند مولار است؟

$$(H = 1, C = 12, O = 16 : \text{g} \cdot \text{mol}^{-1})$$

۱) $5,28 \times 10^{-3}$

۲) $2,58 \times 10^{-3}$

۳) $2,89 \times 10^{-3}$

۴) $5,93 \times 10^{-3}$

چند مورد از مطالب بیان شده، صحیح هستند؟ ۹۹

الف) آب می‌تواند اغلب ترکیبات یونی را در خود حل کند.

ب) فرمول شیمیایی ترکیبات کروم (III) سولفات و آلومینیم نیترات به ترتیب به صورت $Cr(SO_4)_3$ و $Al(NO_3)_3$ است.

پ) مجموع تعداد کاتیون و آنیون دو ترکیب مس (II) کربنات و آمونیم نیترات یکسان است.

ت) در اثر اتحال دو ترکیب آمونیم فسفات و سدیم هیدروکسید به طور جداگانه در آب، حاصل $\frac{\text{تعداد کاتیون}}{\text{تعداد آنیون}}$ به


ترتیب $\frac{1}{3}$ و ۱ است.

۱) ۱

۲) ۲

۳) ۳

۴) ۴



۱۰۰ چه تعداد از عبارت‌های زیر نادرست هستند؟

الف) شکل رو به رو نشان دهنده‌ی انحلال ترکیبات منیزیم سولفات در آب است.

ب) حداقل یکی از عناصر تشکیل دهنده‌ی یون‌های سولفات و نیترات در عناصر مورد نیاز گیاهان وجود دارد.

پ) به دلیل شور بودن آب‌های روی زمین، تهیه‌ی آب آشامیدنی یکی از چالش‌های اساسی در سطح جهان است.
ت) مجموع تعداد کاتیون و آنیون دو ترکیب روی سولفات و آهن (III) نیترات با یکدیگر برابر هستند.



۴ ۲۶

۳ ۲۷

۲ ۲۸

۱ ۱

۱۰۱ اگر فرمول نیترید فلز اصلی M به صورت MN باشد، فرمول سولفات و نیترات آن به ترتیب از راست به چه کدام است؟



۱۰۲ چه تعداد از مطالب زیر درست‌اند؟

الف) با اضافه کردن چند قطره محلول نقره نیترات به آب آشامیدنی، رسوب سفیدرنگی تشکیل می‌شود.

ب) آب آشامیدنی، مخلوطی زلال و همگن بوده و حاوی مقدار کمی از یون‌های گوناگون می‌باشد.

پ) کود شیمیایی که دو عنصر نیتروژن و گوگرد را در اختیار گیاه قرار می‌دهد، مدل فضایپرکن کاتیون و آنیون آن یکسان است.

ت) گونه‌ای که دارای بار الکتریکی بوده و شامل دو یا چند عنصر باشد که با پیوند کووالانسی به یکدیگر متصل شده‌اند را یون چنداتمی می‌نامند.

۴ ۲۹

۳ ۲۱

۲ ۲۲

۱ ۱


۱۰۳ در کدام گزینه، مجموع تعداد اتم و عنصر یون‌های داده شده بیشتر است؟

۲ سولفات – هیدروکسید




۲ آمونیوم – کربنات

۱ فسفات – نیترات

۱۰۴ فرمول شیمیایی کدام ترکیب نادرست است؟



۱۰۵ شکل‌های زیر تعداد و نوع یون‌های حاصل از انحلال سه ترکیب یونی را نشان می‌دهند. شکل‌های ۱ و ۲ و ۳ به ترتیب از راست به چپ مربوط به انحلال کدام ترکیبات است؟



۱ آهن (III) نیترات – آمونیوم کربنات – منیزیم سولفات

۲ آلومینیم هیدروکسید – لیتیم سولفات – آهن (II) سولفات

۳ منیزیم سولفات – کروم (III) سولفات – منیزیم نیترات

۴ آلومینیم نیترات – منیزیم سولفات – باریم هیدروکسید

۱ آهن
۲ آلومینیم
۳ منیزیم
۴ باریم



۱۰۶ تقطیر فرآيندي است که در آن و محصول آن است.

۱ با اضافه کردن چند محلول، تمام اجزای حل شده در آب رسوب داده می‌شوند – آب خالص و رسوب

۲ برخی از اجزای حل شده در آب جدا می‌شوند – آب تقریباً خالص

۳ برخی از اجزای حل شده در آب جدا می‌شوند – آب مقطر

۴ تقریباً همه اجزای حل شده در آب جدا می‌شوند – آب مقطر

۱۰۷ برای شناسایی کاتیون‌های Ag^+ و Ca^{2+} در داخل یک نمونه آب آشامیدنی، از تشکیل رسوب سفیدرنگ با

آنیون‌های و استفاده می‌شود.

۱ کلرید (Cl^-) - نیترات (NO_3^-)

۲ فسفات (PO_4^{3-}) - کلرید (Cl^-)

۳ نیترات (NO_3^-) - فسفات (PO_4^{3-})

۱۰۸ غلظت ۱۵۰ گرم محلول ۴۰ درصد جرمی کلسیم برمید، چند مولار است؟

$$(Cl^-) = \frac{g}{mL} \times ۲۵\% , C_{Ca} = ۴۰ , Br = ۱۰ g \cdot mol^{-1})$$

۰,۷۵ ۱

۰,۵ ۲

۰,۳ ۳

۰,۶ ۴

۱۰۹ با توجه به نمودار مقابل، با سرد کردن ۴۵۰ g محلول سیر شده پتسیم نیترات از دمای $48^\circ C$ تا دمای $10^\circ C$


چند گرم نمک پتسیم نیترات ته نشین خواهد شد؟ (با تغییر)

۱۲۰ ۱

۵۰ ۲

۳۳۰ ۳

۱۵۰ ۴



www.my-dars.ir

۱۱۰ کدام یک از عبارت‌های زیر نادرست است؟

۱ آب اقیانوس‌ها و دریاهای مخلوطی همگن و اغلب شورمزه است.

۲ بیشترین غلظت آنیون و کاتیون موجود در آب دریاهای متعلق به Cl^- و Na^+ است.

۳ برف و باران در هر شرایطی ناخالص هستند، زیرا مواد زیادی را در خود حل کرده‌اند.

۴ جرم کل مواد حل شده در آب‌های کره زمین تقریباً ثابت است.



۱۱۱ کدام یک از عبارت‌های زیر در مورد ترکیب آمونیوم کربنات درست است؟

- الف) نسبت شمار آنیون به کاتیون در آن همانند این نسبت در نقره سولفات است.
- ب) شمار عنصرهای سازنده آن، دو برابر عنصرهای سازنده آهن (II) کلرید است. (شمار انواع عنصرها) در هر مول از آن، ۹ مول اتم وجود دارد.
- پ) تعداد پیوندهای کووالانسی در کاتیون آن، یکی بیشتر از تعداد این پیوندها در آنیون آن است.

۲ پ و ت

۳ ب و پ

۴ الف و ت

۱ الف و ب

۱۱۲ غلظت چند مورد از یون‌های زیر بیش از یک گرم در هر کیلوگرم آب دریا می‌باشد؟

«کلرید - سولفات - کربنات - سدیم - منیزیم - کلسیم - بر مید»

۳ ۲

۶ ۳

۵ ۲

۴ ۱

۱۱۳ چند مورد از عبارت‌های زیر درست می‌باشد؟

- الف) کمتر از ۹۷,۸۵ درصد از آب کره به صورت مایع می‌باشد.

ب) هنگام تشکیل برف، تقریباً همه مواد حل شده در آب از آن جدا می‌شوند.

پ) $\frac{1}{2}$ جمعیت جهان از کم‌آبی رنج می‌برند که این رقم تا سال ۲۰۲۵ به حدود $\frac{2}{3}$ خواهد رسید.


ت) کمتر از ۲,۵ درصد از آب کره را منابع غیراقیانوسی تشکیل می‌دهد.

۲ ۲

۱ ۳

۴ ۲

۳ ۱



۱۱۴ چند مورد از مطالب داده شده در مورد شکل رو به رو، درست است؟ الف) شکل

مقابل، پویا بودن زمین را از دیدگاه شیمیایی نشان می‌دهد که بخش‌های گوناگون آن با یکدیگر برهمنکش‌های فیزیکی و شیمیایی دارند.

ب) در واکنش‌هایی که در هر دو بخش A و B اتفاق می‌افتد، درشت مولکول‌ها نقش اساسی ایفا می‌کنند.

پ) لاشه‌جانوران و گیاهان بر اثر واکنش‌های شیمیایی تجزیه شده و به صورت مولکول‌های کوچک‌تری وارد بخش‌های A، C یا D می‌شوند.

ت) جانداران آبزی سالانه میلیاردها تن کربن دی‌اکسید را وارد بخش D می‌کنند.

۱ ۲

۲ ۳

۳ ۲

۴ ۱



(۱۱۵) تمام عبارت‌های زیر صحیح هستند به جز: ($C = ۱۲$, $O = ۱۶$, $H = ۱ : g \cdot mol^{-۱}$)

۱) در چای غلیظ همانند گلاب دو آتشه، شمار ذرات حل‌شونده در واحد حجم زیاد است.

۲) در محلولی شامل ۸ گرم آب و ۱۴ گرم اتانول ($C_۲H_۵OH$), آب نقش حلال دارد.

۳)

محلول‌ها، مخلوط‌های همگن و مایع از چند ماده هستند که حالت فیزیکی و شیمیایی در سرتاسر آن‌ها یکسان و یکنواخت است.

۴)

اگر اتیلن گلیکول در آب حل شود، یک مخلوط همگن ایجاد می‌شود که حالت فیزیکی و ترکیب شیمیایی در سرتاسر آن یکسان و یکنواخت می‌باشد.

(۱۱۶) اگر معادله انحلال‌پذیری سدیم نیترات به صورت $S = ۰,۸\theta + ۷۲$ و معادله انحلال‌پذیری پتابسیم کلرید به

صورت $S = ۰,۳\theta + ۲۷$ باشد، کدام موارد از مطالب زیر صحیح می‌باشند؟ (S: انحلال‌پذیری, θ : دما بر حسب $^{\circ}C$)
 الف) تأثیر دما بر انحلال‌پذیری پتابسیم کلرید، بیش‌تر از انحلال‌پذیری سدیم نیترات است.

ب) انحلال‌پذیری سدیم نیترات و پتابسیم کلرید در دمای ۲۷۳ کلوین به ترتیب ۲۷ و ۷۲ گرم می‌باشد.

پ) انحلال‌پذیری سدیم نیترات در دمای اتاق بیش‌تر از انحلال‌پذیری پتابسیم کلرید است..

ت) درصد جرمی محلول سیر شده پتابسیم کلرید در دمای $^{\circ}C = ۱۵$ به تقریب برابر ۲۳ درصد می‌باشد.

۱) الف - ب

۲) پ - پ

۳) ب - ت

(۱۱۷) با توجه به جدول رو به رو که انحلال‌پذیری مواد در دمای $^{\circ}C = ۲۵$ را نشان می‌دهد، چند مورد از مطالب زیر صحیح است؟ الف) در ۵۰ گرم محلول سیر شده سدیم نیترات در

انحلال‌پذیری
 گرم حل‌شونده ($\frac{۱۰۰gH_۲O}{۱۰۰gH_۲O}$) فرمول شیمیایی
 این دما مقدار حل‌شونده بیش‌تری نسبت به ۱۳۶ گرم محلول سیر شده سدیم کلرید وجود دارد.

ب) در دمای $^{\circ}C = ۲۵$ کلسیم سولفات در آب کم محلول و کلسیم $NaNO_۳$ فسفات در آب نامحلول است.

پ) در ۲۵ گرم از محلول سدیم کلرید در این دما، تقریباً ۹ گرم $NaCl$ حل‌شونده وجود دارد.

ت) برای تهیه ۴۸ گرم از محلول سیر شده سدیم نیترات در دمای $^{\circ}C = ۲۵$ به ۲۳ گرم آب نیاز است.

۱) صفر

۲) ۲

۳) ۳



کدام موارد از مطالب زیر صحیح می‌باشد؟ (۱۱۸)

الف) در میان دو ترکیب مولکولی و فرضی A و B که جرم مولی مشابهی دارند، ترکیبی که در میدان الکتریکی دارای جهت‌گیری است نقطهٔ جوش بالاتری دارد.

ب) هرچه نیروی بین مولکولی ذرات سازندهٔ ترکیب گازی قوی‌تر باشد، آسان‌تر مایع می‌شود.

پ) نقطهٔ جوش Cl_2 بیش‌تر از نقطهٔ جوش F_2 می‌باشد.

ت) در مقایسهٔ نقطهٔ جوش دو ترکیب ناقطبی، نقطهٔ جوش ترکیبی که جرم مولی بیش‌تری دارد، کم‌تر است.

پ و ت

ب و ت

الف، ب و پ

الف و پ

جدول زیر غلظت برخی یون‌ها در یک نمونه از آب دریا را نشان می‌دهد. A , B و C به ترتیب در کدام

گزینه به درستی آمده است؟ (۱۱۹)


ppm	درصد جرمی	مقدار یون(میلی گرم) در یک کیلوگرم آب دریا	نماد یون	نام
—	۱,۰۵	A	Na^+	یون سدیم
B	—	۱۳۵۰	Mg^{2+}	یون منیزیم
۴۰۰	C	—	Ca^{2+}	یون کلسیم

۰,۴ - ۱۳,۵ - ۱۰۵۰۰

۰,۵۴ - ۱۳۵۰ - ۱۰۵۰۰

۰,۴ - ۱۳,۵ - ۱۰۵۰

۰,۵۴ - ۱۳۵۰ - ۱۰۵۰

(۱۲۰) با توجه به شکل رو به رو، چند مورد از مطالب زیر درست‌اند؟ ($_7N$, $_8O$, $_1Na$, $_17Cl$, $_47Ag$)الف) اختلاف شمار الکترون‌های B و C برابر ۲۲ است.ب) یک مول مادهٔ A ، شامل دو مول یون است.

پ) در اثر اضافه شدن نقره نیترات به محلول لولهٔ آزمایش «الف»، غلظت کاتیونی که از قبل در

این لوله وجود داشته به تدریج کاهش می‌یابد.

www.mv-dars.ir
۱ ۲ ۳

۱ صفر

۲ ۳



۱۲۱ اگر بدانيم انحلال‌پذيری دو نمک A و B در دمای 30°C سلسیوس با هم برابر است باتوجه به جدول زير که انحلال‌پذيری نمک A را در دو دمای 20°C و 60°C درجه سلسیوس نشان مي‌دهد، درصد جرمی نمک B در محلول سير شده آن در دمای 30°C درجه سلسیوس به کدام عدد نزديک‌تر است؟ (معادله انحلال‌پذيری ترکيب A به صورت خطی است).


دما	انحلال‌پذيری گرم حل‌شونده ($\frac{\text{آب}}{100\text{g}}$)
20°C	۳۰
60°C	۴۰

- ۲۱,۵ ۱
۲۴,۵ ۲
۲۵,۵ ۳
۲۷,۵ ۴

۱۲۲ محلول‌های زير با غلظت مولی يكسان تهيه شده‌اند. کدام يك رسانايي الکترونيکي بيشتری دارد؟




۱۲۳ m گرم آلومينيم را در 200 ميلی‌ليتر محلول هيdroکلريک اسيد، طبق واکنش زير وارد کردہ‌ایم. همه آلومينيم با اسيد واکنش داده و غلظت مولار اسيد به اندازه $5,0$ مول بر ليتر کاهش مي‌يابد. m کدام است؟ ($Al = 27\text{g} \cdot \text{mol}^{-1}$)



- ۲,۷ ۱ ۱,۸ ۲ ۱,۳۵ ۳ ۰,۹ ۴

۱۲۴ 40 گرم KNO_3 و 40 گرم KCl را در دو ظرف مجزا، هر يك حاوي 200 گرم آب با دمای 10°C سانتي‌گراد مي‌ريزيم. باتوجه به نمودار زير، کدام گزينه در مورد اين دو محلول درست است؟



۱ محلول تهيه شده از هر دو نمک فراسير شده است.

۲ نقطه A، محلول‌هایی از KNO_3 و KCl با درصد جرمی يكسان را نشان مي‌دهد.

۳ تغيير دما بر انحلال‌پذيری KNO_3 تأثير كمتری دارد.

۴ عرض از مبدأ منحنی انحلال KNO_3 بيشتر از منحنی KCl است.

www.my-dars.ir

۱۲۵ نسبت کاتيون به آنيون در ليتيم فسفات با نسبت آنيون به کاتيون در کدام ترکيب برابر است؟

- ۱ پتايسيم نيترييد ۲ آلومينيم کربنات ۳ منيزيم فلوئوريد ۴ آهن (III) نيترات



۱۲۶ باتوجه به شکل، در چه تعداد از حالت‌های ييان شده در جدول زير، يون موجود در محلول A می‌تواند به

وسيله محلول B شناسايي شود؟(با تغيير)



محلول B	يون موجود در محلول A	
$NaCl(aq)$	$Ag^+(aq)$	الف
$K_3PO_4(aq)$	$Ca^{2+}(aq)$	ب
$NaOH(aq)$	$Fe^{3+}(aq)$	پ
$CuCl_2(aq)$	$Ba^{2+}(aq)$	ت

۴ ۲

۳ ۳

۲ ۲

۱ ۱

۱۲۷ چنانچه ۵۰,۰ مول ليتيم سولفید را در مقداری آب خالص حل کرده و حجم محلول را به ۴ ليتير برسانيم،

مجموع غلظت يون‌های موجود در محلول بر حسب ppm کدام است؟ (چگالی محلول برابر با $1g \cdot mL^{-1}$ است و

$$(Li = 7, S = 33 g \cdot mol^{-1})$$

۱۱۵ ۲

۶۹۰ ۳

۴۶۰ ۲

۲۳۰ ۱

۱۲۸ غلظت گلوکز در خون فردی به صورت ناشتا، $12 mol \cdot L^{-1} \cdot 12 mol \cdot L^{-1} = 144 mol \cdot L^{-1}$ است. دستگاه اندازه‌گيري قند خون، چند

مili‌گرم گلوکز را در ۱۰۰ مili‌ليتر خون اين فرد نشان مي‌دهد؟ ($C_6H_{12}O_6 = 180 g \cdot mol^{-1}$)

۲۱۶ ۲

۱۴۴ ۳

۹۶ ۲

۷۲ ۱

۱۲۹ چه تعداد از عبارت‌های زير درست است؟

الف) فلز منيزيم ماده ارزشمندی است که در تهيه آلياژها و شربت معده کاربرد دارد.

ب) سالانه ميليون‌ها تن $NaCl$ با روش تبلور از آب دريا جداسازی و استخراج می‌شود.

پ) برای استخراج منيزيم از آب دريا، ابتدا آن را رسوب مي‌دهند.

ت) با استفاده از جريان برق می‌توان منيزيم كلريد مذاب را به عنصرهای سازنده‌اش تجزيه کرد.

۴ ۲

www.my-dars.ir

۲ ۲

۱ ۱

۱۳۰ پاسخ صحيح سؤال‌های زير به ترتيب از راست به چپ کدام گزينه آمده است؟

الف) مقدار کدام يون در آب دريا از ديگر يون‌ها بيشتر است؟

ب) مقدار کدام آنيون در آب دريا از ديگر آنيون‌ها بيشتر است؟

پ) از بين يون‌های چنداتمي، مقدار کدام يون در آب دريا بيشتر است؟





۱۳۱ در فرمول شیمیایی کدام دو ترکیب، شمار اتم‌های هیدروژن در ترکیب یونی سمت راست، چهار برابر شمار آنیون چند اتمی در ترکیب یونی سمت چپ است؟

۱ آمونیوم سولفات – آلومینیم هیدروکسید

۲ آمونیوم فسفات – آلومینیم هیدروکسید

۳ منیزیم هیدروکسید – آلومینیم هیدروکسید

۱۳۲ کدام یک از عبارت‌های زیر درست است؟

۱ بیشتر آب‌های آشامیدنی روی زمین شور است و نمی‌توان از آن‌ها در کشاورزی و مصارف خانگی و صنعتی استفاده کرد.

۲ برای شناسایی یون فسفات در یک محلول می‌توان از یون Na^+ استفاده کرد.

۳ به آب آشامیدنی مقدار زیادی یون فلورورید می‌افزایند، زیرا وجود این یون سبب حفظ سلامت دندان‌ها می‌شود.

۴ مقدار کاتیون پتاسیم در آب دریا از مقدار کاتیون منیزیم کمتر است.

۱۳۳ با توجه به شکل‌های زیر، چند مورد از مطالب زیر درست است؟

الف) C یکی از فراورده‌های واکنش با D و محلول در آب است.

ب) C و D با هم واکنش می‌دهند و مجموع ضرایب در معادله موازن شده، برابر ۵ است.

پ) A با B واکنش می‌دهد و C و D را تشکیل می‌دهد.

ت) از واکنش C و D می‌توان برای شناسایی یون باریم استفاده کرد.

۱ ۲

۲ ۳

۳ ۴

۴ ۱

۱۳۴ چند مورد از عبارت‌های زیر نادرست است؟

الف) وجود انواع یون‌ها و مولکول‌ها در آب دریا باعث شده که دریاهای مخلوطی ناهمگن شود.

ب) نوع و مقدار مواد حل شده در دریاهای با یکدیگر یکسان است.

پ) آب‌ها اغلب چشمه‌ها و قنات‌ها، زلال، شفاف و ناخالص است.

ت) هنگام تشکیل برف و باران تقریباً همه مواد حل شده در آب از آن جدا می‌شود.

۱ ۲

۲ ۳

۳ ۴

۴ ۱

www.my-dars.ir

۱۳۵ از واکنش محلول حاوی ۱۷ گرم نمک نقره نیترات با مقدار کافی محلول سدیم کلرید به ترتیب از راست به

چپ چند گرم نمک نامحلول به وجود می‌آید و چند مول یون محلول در آب تولید می‌شود؟

$$(Ag = 108, Cl = 35, O = 16, N = 14 : g \cdot mol^{-1})$$

۰,۲ - ۱۴,۳۵

۰,۱ - ۸,۵

۰,۱ - ۱۴,۳۵

۰,۲ - ۸,۵



کدام گزینه صحیح است؟ ۱۳۶

- ۱) نام ترکیب شیمیایی ضد یخ، اتیلن گلیکول است که به صورت خالص مصرف می‌شود.
- ۲) گلاب محلول آبی یک ترکیب آلبی است که به هر نسبتی در آب حل می‌شود.
- ۳) همواره به بخشی از محلول که جرم کمتری دارد حل‌شونده می‌گویند.
- ۴) انسان می‌تواند بر روی آبی که 27°C درصد جرم آن نمک است، به راحتی شناور بماند.

در صورتی که معادله انحلال‌پذیری دو ماده A و B بر حسب دما به ترتیب به صورت $S_A = 0,8\theta + 72$ و $S_B = 0,3\theta + 27$ باشد، چند مورد از عبارتهای زیر صحیح می‌باشد؟الف) اثر افزایش دما بر انحلال‌پذیری ماده A بیشتر از اثر افزایش دما بر انحلال‌پذیری ماده B است.ب) نمودار انحلال‌پذیری دو ماده A و B هر دو سیر صعودی دارند.پ) در دمای $C = 30^{\circ}\text{C}$ با حل کردن 48 گرم از ماده A در 50 گرم آب، یک محلول سیر شده به وجود می‌آید.ت) در دمای $C = 20^{\circ}\text{C}$ ، $17,5$ گرم از ماده B در 50 گرم آب به طور کامل حل می‌شود.

۴ ۳

۳ ۲

۲ ۱

۱ ۱

مای درس

گروه آموزشی عصر

www.my-dars.ir



باتوجه به جدول زیر که انحلالپذیری برخی مواد را در دمای $25^{\circ}C$ در آب نشان می‌دهد، کدام مطلب درست است؟

(۱۳۸) $Cl = ۳۵, ۵$, $Na = ۲۳$: $g \cdot mol^{-۱}$ و $1 g \cdot ml^{-۱}$ چگالی آب)

نام حل شونده	فرمول شیمیابی	انحلالپذیری $\left(\frac{گرم حل شونده}{۱۰۰ g H_2O} \right)$
شکر	$C_{12}H_{22}O_{11}$	۲۰۵
سدیم نیترات	NaN_3	۹۲
سدیم کلرید	$NaCl$	۳۶
کلسیم سولفات	$CaSO_4$	۰,۲۳
کلسیم فسفات	$Ca_3(PO_4)_2$	5×10^{-۴}
نقره کلرید	$AgCl$	$2,1 \times 10^{-۴}$
باریم سولفات	$BaSO_4$	$1,9 \times 10^{-۴}$

(۱) در این جدول ۳ ماده محلول، ۲ ماده کم محلول ۲ ماده نامحلول وجود دارد.

(۲) غلظت محلول سیر شده باریم سولفات در دمای $25^{\circ}C$ به تقریب برابر $4 ppm$ می‌باشد.

(۳) در دمای $25^{\circ}C$ در 200 میلی‌لیتر آب به تقریب 2 مول سدیم کلرید می‌توان حل کرد.

(۴) در دمای $25^{\circ}C$ در $50 g$ آب، انحلال هر مقدار کمتر از $205 g$ شکر در آب یک محلول سیر شده پدید می‌آورد.

(۱۳۹) در محلول کدام ترکیب یونی، یون‌های بیشتری وجود دارد؟ (حجم همه محلول‌ها با یکدیگر برابر است)

(۱) محلول 6% مولار آمونیوم سولفات

(۲) محلول 8% مولار نقره نیترات

(۳) محلول 5% مولار آلومینیم سولفات

(۱۴۰) با فرض این که جرم مولی گونه‌های A , B و C تقریباً با یکدیگر برابر است و این ترکیب‌ها قادر اند

هیدروژن هستند، کدام یک از مقایسه‌های زیر صحیح نمی‌باشد؟

گونه	A	B	C
گشتاور دوقطبی	۱,۳	صفرا	۲,۶

(۱) قدرت جاذبه بین مولکولی: $C > A > B$ (۲) انحلالپذیری در هگزان: $B > A > C$

(۳) انحلالپذیری در استون: $C > A > B$ (۴) نقطه جوش: $B > A > C$

(۱۴۱) در کدام گزینه نقطه جوش ترکیب‌های داده شده به درستی مقایسه شده است؟

(۱) $HF > HCl > HBr$ (۲) $H_2O > NH_3 > HF$ (۳) $AsH_3 > PH_3 > NH_3$

(۴) $H_2O > H_2Se > H_2S$ (۵) $AsH_3 > PH_3 > NH_3$



چه تعداد از عبارت‌های زیر درست است؟ ۱۴۲

- الف) از ترکیب محلول نقره نیترات و محلول کلسیم کلرید، رسوب سفیدرنگ نقره کلرید حاصل می‌شود.
- ب) برای شناسایی یون باریم در یک محلول می‌توان از محلول KCl استفاده کرد.
- پ) درون یک نمونه آب آشامیدنی، یون‌های منیزیم، کلسیم، کلرید، فسفات و... وجود دارند.
- ت) در برخی از آب‌های آشامیدنی، مقدار یون‌های حل شده به قدری زیاد است که مزه آب را تغییر می‌دهد.

۴ ۲۳ ۳۲ ۲۱ ۱

در صد جرمی لیتیم فسفات در یک نمونه از محلول آن، با درصد جرمی محلولی از منیزیم سولفات که در آن ۳

گرم نمک در 47 گرم آب حل شده، برابر است. در 200 گرم از این محلول لیتیم فسفات، چند گرم آب وجود دارد؟

۶ ۲۹۴ ۳۱۸۸ ۲۱۲ ۱

هرگاه در 2 کیلوگرم آب، $4,0$ گرم از نمک A حل شود، یک محلول سیرشده در دمای معین تشکیل

می‌شود. انحلال پذیری این نمک در این دما کدام است و نمک A در کدام دسته از مواد محلول، کم محلول یا نامحلول قرار می‌گیرد؟

۰,۰۲ ۲ - کم محلول

۲ - نامحلول

۰,۲ - کم محلول

۱ - کم محلول

کدام یک از گزینه‌ها، عبارت زیر را به درستی تکمیل می‌کند؟ ۱۴۵

«آب باران در هوای پاک است و فرایند تشکیل باران، الگویی برای تهیه آب خالص است؛ فرایندی که نام دارد و فراورده آن نام دارد.»

۱ - خالص - تقطیر - آب مقطر

۲ - تقریباً خالص - تبخیر - آب تصفیه شده

۱ - خالص - تقطیر - آب مقطر

۲ - تقریباً خالص - تبخیر - آب تصفیه شده

برای استخراج و جداسازی منیزیم در آب دریا، آن را به صورت ماده جامد و نامحلول رسوب

می‌دهند. سپس آن را به تبدیل می‌کنند. در پایان با استفاده از آن را به عنصرهای سازنده آن تجزیه می‌کنند.

 $Mg(OH)_2$ - منیزیم هیدروکسید $MgCl_2$ - منیزیم هیدروکسید - جریان برق $Mg(OH)_2$ - منیزیم کلرید $MgCl_2$ - منیزیم هیدروکسید - گرمای زیاد

کدام یک از موارد زیر نادرست است؟ ۱۴۷

سنگ کره از مواد جامد مانند ماسه، نمک‌ها و... تشکیل شده است. ۱


زیست‌کره شامل جانداران روی کره زمین است و در واکنش‌های آن‌ها ریز مولکول‌ها نقش اساسی ایفا می‌کنند. ۲

آب کره از مولکول‌های کوچک آب، یون‌ها و... تشکیل شده است. ۳

هواکره از مولکول‌های کوچک شامل نیتروژن، اکسیژن و... تشکیل شده است. ۴




۱۴۸ رابطه انحلال‌پذیری با دما برای ماده‌ای، به صورت $S = ۵\theta + ۲۷$ است. در کدام مورد محلول فراسیر شده‌ای از این ماده وجود دارد؟




۲



۳



۴



۱

۱۴۹ در مورد H_2S و H_2O چند مورد از مطالب زیر، درست‌اند؟ ($H = 1, S = ۳۲, O = ۱۶ : g \cdot mol^{-1}$)

- الف) در هر دو مولکول نسبت تعداد جفت الکترون‌های ناپیوندی به تعداد جفت الکترون‌های پیوندی برابر با یک است.
- ب) هر دو مولکول به دلیل قطبی بودن در میدان الکتریکی جهت‌گیری می‌کنند.
- پ) دمای جوش H_2S به دلیل سنگین‌تر بودن از H_2O بالاتر است.
- ت) در دمای اتاق هر دو ماده به حالت مایع می‌باشند.

۳

۲

۱

۴

۱۵۰ همه موارد زیر صحیح هستند به جز

- ۱ انحلال اتانول در آب، انحلال مولکولی است.
- ۲ در مخلوط‌های ناهمگن به حالت مایع، اجزای مخلوط به میزان ناچیزی در یکدیگر حل می‌شوند.
- ۳ اغلب محلول‌های موجود در بدن انسان، محلول‌های آبی هستند.
- ۴ گشتاور دوقطبی همه هیدروکربن‌ها ناچیز و در حدود صفر است.

۱۵۱ با توجه به جدول داده شده کدام عبارت درست است؟ ($Cl = ۳۵, Br = ۸۰, I = ۱۲۷ : g \cdot mol^{-1}$)

I_2	Br_2	Cl_2	ماده
جامد	مایع	گاز	حالات فیزیکی در دمای اتاق

www.my-dars.ir

- ۱ مولکول‌های سازنده این مواد قطبی هستند.
- ۲ نیروی بین مولکولی در کلر قوی‌تر از بقیه است.
- ۳ مولکول‌های سازنده ید، در میدان الکتریکی جهت‌گیری می‌کنند.
- ۴ در ترکیب‌های مولکولی ناقطبی، با افزایش جرم مولی، دمای جوش افزایش می‌یابد.



در ۱۵۲ است؟ کدام محلول حرش ذره حل شونده کمتر است؟ ($Na = ۲۳, O = ۱۶, H = ۱, S = ۳۲ : g \cdot mol^{-1}$)

۱) ۱۰۰ میلی لیتر محلول ۱٪ مولار سدیم هیدروکسید

۲) ۱۰۰ گرم محلول ۱٪ مولار سدیم هیدروکسید با چگالی ۱,۱۳ گرم بر میلی لیتر

۳) ۵ میلی لیتر محلول ۲٪ درصد جرمی سدیم کلرید با چگالی ۱,۱ گرم بر میلی لیتر

۴) ۴٪ مول سدیم سولفات در ۱۰۰ میلی لیتر محلول

۱۵۳ ۱۰۰ میلی لیتر محلول پتاسیم کلرید با غلظت مولی ۸٪ مولار را به ۱۰۰۰ میلی لیتر محلول کلسیم کلرید با غلظت مولی ۱٪ مولار اضافه می کنیم. غلظت یون کلرید در محلول حاصل تقریباً چند ppm است؟

($Ca = ۴۰, K = ۳۹, Cl = ۳۵, ۵ : g \cdot mol^{-1}$ در نظر بگیرید.)

۱) ۴۸۴,۰۸ ۲) ۶۴۵,۴۶ ۳) ۳۲۲,۷۳ ۴) ۲۹۰,۴۵

۱۵۴ کدام گزینه صحیح است? ($Cl = ۳۵, ۵, F = ۱۹, H = ۱ : g \cdot mol^{-1}$)


۱) در میان دو ترکیب فرضی A و B با جرم مولی مشابه ترکیبی که در میدان الکتریکی جهت گیری می کند، نقطه جوش پایین تری دارد.

۲) در جرم های برابری از آب و یخ، یخ حجم و چگالی بیشتری دارد.


۳) هرچه نیروی بین مولکولی یک گازی قوی تر باشد، آن گاز راحت تر به مایع تبدیل می شود.

۴) نقطه جوش HCl بیشتر از F_2 می باشد، زیرا جرم مولی HCl از F_2 بیش تر است.


۱۵۵ کدام گزینه نمودار انحلال پذیری گازهای CO_2 , NO , N_2 را طبق قانون هنری به درستی نشان می دهد؟



۱)



۱)



۳)



۱۵۶ انحلال پذيری يك نمک کلسیم دار X در آب در دمای $25^{\circ}C$ برابر $\frac{g}{100g H_2O}$ ۲۶ است. با توجه به اين

عبارت کدام گزینه درست است؟

۱) حداقل ۲۶ گرم از اين نمک را می توان در 100 گرم آب با دمای $25^{\circ}C$ حل کرد.

۲) در 252 گرم محلول سير شده اين نمک در اين دما، 52 گرم از اين نمک وجود دارد.

۳) در افراد مبتلا به سنگ کلیه، مقدار نمک های کلسیم دار (مانند نمک X) در ادرار از انحلال پذيری آنها کمتر است.

۴)

اگر دو محلول هم دما از اين نمک را که يكى سير شده و ديگرى سير نشده است با هم مخلوط کnim، محلول حاصل سير شده می باشد.

۱۵۷ در يك لیتر از کدام محلول زیر در نتیجه انحلال، تعداد یون بیشتری تولید می شود؟

۱) محلول 1% مولار آمونیوم سولفات

۲) محلول 2% مولار مسیزم کلرید

۱۵۸ در مورد ترکیبات یونی داده شده چه تعداد از موارد زیر درست است؟

A	B	C	D
آلومنیوم سولفات	آمونیوم کربنات	آهن (III) نیترات	کلسیم فسفات

الف) اختلاف تعداد اتم های يك مولکول از ترکیب های B و D برابر يك است.


ب) تعداد الکترون های جابه جا شده بین کاتیون و آنیون در ترکیبات A و D برابرند.

پ) اگر کاتیون های ترکیب های A و D را جابه جا کnim، تعداد اتم های اکسیژن در ترکیب های حاصل برابر خواهد شد.

ت) ترکیب D در آب نامحلول است.

۱) ۱ ۲) ۲ ۳) ۳ ۴) ۴

۱۵۹ با توجه به شکل زیر کدام يك از نتیجه گيری های زیر صحیح است؟ (هر ذره حل شونده در شکل همارز



www.my-dars.ir

۱) 1% مول می باشد و حجم هر دو محلول برابر 50 میلی لیتر است.)

۱) غلظت مولی در محلول B دو برابر غلظت مولی در محلول A است.

۲)

اگر محلول A را به دو بخش هم حجم تقسیم کnim، غلظت هر بخش دو برابر غلظت محلول B می باشد.


۳) با افزودن محلول A به محلول B ، غلظت مولی محلول نهایی سه برابر غلظت مولی محلول B اولیه خواهد بود.

۴)

با افزودن پنج ذره به محلول B و نیز اضافه کردن 50 میلی لیتر آب مقطر به ظرف B ، غلظت محلول های A و B برابر می شود.



۱۶۰ باتوجه به نمودار زیر چه تعداد از عبارت‌های زیر نادرست است؟ ($NO = ۳۰ g \cdot mol^{-1}$)



الف) پیش‌بینی می‌شود با کاهش دما در فشار ثابت همانند افزایش فشار در دمای ثابت، انحلال‌پذیری NO در آب، افزایش یابد.

ب) در فشار $9 atm$ ، 2×10^{-2} مول NO در 100 گرم آب حل می‌شود.

پ) نتیجه‌گیری این نمودار قانون هنری نام دارد و براساس آن در دمای ثابت بین انحلال‌پذیری گازها و فشار آن‌ها رابطه مستقیم وجود دارد.

ت) در بین گازهای ناقطبی نمودار افزایش فشار بیشترین تأثیر را بر گاز NO دارد.

۳ ۲

۲ ۳

۱ ۲

۱ صفر

۱۶۱ کدام موارد از مطالب زیر صحیح‌اند؟

الف) مواد محلول به موادی گفته می‌شود که انحلال‌پذیری آن‌ها در دمای معین در 100 گرم آب از یک گرم بیشتر است.

ب) نقطه جوش HCl از نقطه جوش F_2 کمتر است.

پ) گشتاور دو قطبی مولکول‌های O_2 ، CO و CH_4 برابر صفر است.

ت) فرمول شیمیایی C_3H_6O است و حلال چربی، رنگ‌ها و انواع لاک‌ها می‌باشد.

ث) کلسیم سولفات و نقره کلرید از جمله مواد کم محلول در آب می‌باشند.

۲ ۱ الف - ت

۳ ۱ ب - پ - ث

۲ ۱ ت - ث

۱ الف - پ - ت

۱۶۲ چند میلی‌لیتر از محلول 5% مولار کلسیم نیترات باید با آب خالص مخلوط شود تا 50 گرم محلول با غلظت $40 ppm$ نسبت به یون کلسیم به دست آید؟ ($Ca = 40 g \cdot mol^{-1}$)

۲,۵ ۲

۱۰ ۳

۲ ۱

۱ ۵

۱۶۳ درون بشر «الف» $58,5$ گرم سدیم کلرید در 500 میلی‌لیتر آب قطره و درون بشر «ب»، 175 گرم نقره نیترات در 50 میلی‌لیتر آب قطره حل می‌کنیم، و سپس این دو را با یکدیگر مخلوط می‌کنیم. چند مورد از مطالب زیر درست‌اند؟

(۱) ($Ag = 108$, $Cl = 35,5$, $Na = 23$, $O = 16$, $N = 14$: $g \cdot mol^{-1}$)

الف) در اثر واکنش میان این دو ترکیب رسوب قرمز رنگی تشکیل می‌شود.

ب) درصد جرمی نیتروژن در نقره نیترات به تقریب $2,5$ برابر درصد جرمی سدیم در سدیم کلرید است.

پ) جرم رسوب تشکیل شده برابر $71,75$ گرم می‌باشد.

ت) غلظت یون نیترات در مخلوط نهایی برابر 5% مولار است که در طول واکنش ثابت می‌ماند.

۱ ۲


۲ ۳

۳ ۲

۴ ۱



164) با توجه به شکل‌های زیر چند مورد از مطالب داده شده درست است؟ (هر ذره حل‌شونده همارز با 2×10^{-5} مول می‌باشد).



مولاریتۀ محلول‌های (1) و (2) باهم برابرند.

نسبت مولاریتۀ محلول در شکل (2) به شکل (3) برابر ۳ می‌باشد.

با افزودن محلول‌های (1) و (3) به یکدیگر مولاریتۀ محلول حاصل با مولاریتۀ محلول (2) برابر می‌شود.

غلظت محلول‌های (3) و (4) بر حسب ppm دقیقاً باهم یکسان است.

کمترین مولاریتۀ محلول در این شکل‌ها مربوط به شکل (5) می‌باشد.

۱

۲

۳

۴

165) در مورد ترکیب یونی آمونیوم نیترات، کدام موارد صحیح می‌باشند؟

الف) در این ترکیب چهار عنصر وجود دارد.

ب) مدل فضایپرکن یون نیترات مشابه یون کربنات می‌باشد.

پ) تعداد یون‌ها در هر واحد از این ترکیب برابر تعداد یون‌ها در هر واحد پتانسیم سولفات است.

ت) نسبت شمار کاتیون‌ها به شمار آنیون‌ها، در ترکیب حاصل از آنیون این ترکیب با آهن (III)، برابر $\frac{1}{3}$ می‌باشد.

۱

۲

۳

۴

166) با توجه به واکنش کلسیم کلرید و سدیم فسفات خالص، کدام گزینه درست می‌باشد؟

از این واکنش برای تشخیص کاتیونی که با گاز نجیب نئون هم الکترون است، استفاده می‌شود.

در این واکنش مجموع ضرایب فراورده‌ها، بیش از $4/1$ برابر مجموع ضرایب واکنش‌دهنده‌ها است.

در انتهای واکنش یک محلول شیری رنگ به وجود می‌آید.

در این واکنش نسبت شمار آنیون‌ها به کاتیون‌ها در فراورده نامحلول به تقریب عرّه است.

www.my-dars.ir

167) برای گندزدایی آب یک استخر از محلول کلر با غلظت $800 ppm$ استفاده می‌شود. اگر مقدار درصد جرمی

مجاز کلر موجود در آب استخر برابر با 15×10^{-4} باشد، چند گرم از این محلول برای ضد عفونی کردن ۱۶ متر مکعب

آب نیاز است؟ (چگالی آب استخر را برابر ۱ گرم بر سانتی‌متر مکعب در نظر بگیرید.)

$$2 \times 10^{+4}$$


$$3 \times 10^{-4}$$

$$2 \times 10^{-4}$$

$$3 \times 10^{+4}$$



با توجه به شکل مقابل چند مورد از موارد زیر صحیح می‌باشد؟ ۱۶۸



الف) A و B به ترتیب نشان‌دهنده محل خروج محلول غلیظ و آب شیرین می‌باشند.

ب) جهت حرکت مولکول‌های آب از غشای نیمه تراوا دو طرفه می‌باشد.

پ) در این روش تصفیه آب میکروب‌های آن جداسازی می‌شوند.

ت) بدون وجود پمپ ایجاد فشار، مولکول‌های آب از غشای نیمه تراوا عبور نمی‌کند.

۴ ۲

۳ ۲

۲ ۱

۱ ۱

کدام یک از گزینه‌های زیر صحیح است؟ ۱۶۹

۱ گلاب دو آتشه محلول رقیقی از ترکیب‌های آلی در آب است.

۲ بررسی خواص یک محلول فقط به خواص حللا و حلشونده بستگی دارد.

۳ ضدیخ محلول اتیلن گلیکول در یک حللا آلی است.

۴ دستگاه اندازه‌گیری قند خون، میلی‌گرم‌های گلوکز را در 1 mL از خون نشان می‌دهد.

پاسخ صحیح پرسش‌های «الف»، «ب» و «پ» در کدام گزینه آمده است؟ ۱۷۰

الف) ۱۰۰ میلی‌لیتر هگزان در مقایسه با ۱۰۰ میلی‌لیتر آب در شرایط یکسان دارای جرم بیشتر یا کمتری است؟

ب) رنگ محلول ید در هگزان، کدام است؟

پ) کدام مورد از کاربردهای هگزان است؟

۱ الف: جرم کمتر، ب: بنفس، پ: رقیق‌کننده رنگ


۲ الف: جرم بیشتر، ب: سبز، پ: حللا چربی

۱ الف: جرم کمتر، ب: بنفس، پ: رقیق‌کننده رنگ

۲ الف: جرم بیشتر، ب: سبز، پ: حللا چربی ۱

۳ الف: جرم کمتر، ب: سبز، پ: حللا چربی

کدام گزینه مقایسه مقدار یون‌های حل شده در آب دریا را به درستی نشان نمی‌دهد؟ ۱۷۱



کدام مقایسه در مورد a , b , c و d درست است؟ ۱۷۲

www.my-dars.ir

تعداد یون‌های تشکیل‌دهنده هر واحد نمک	نمک
a	سدیم فسفات
b	کلسیم نیترات
c	آلومینیم سولفات
d	نقره نیترات

$c > a > d > b$ ۲

$a > c > d > b$ ۲

$c > a > b > d$ ۲

$a > c > b > d$ ۱



۱۷۳ در دماي $25^{\circ}C$ در $100g$ آب، مقدار 5×10^{-3} گرم کلسیم فسفات حل می شود اين ماده

بوده و غلظت يون فسفات در اين محلول به تقریب برابر با ppm می باشد.

$$(Ca = 40, P = 31, O = 16 : g \cdot mol^{-1})$$



۲ نامحلول - $3,06$

۳ نامحلول - $5,04$

۴ کم محلول - $3,06$

۵ کم محلول: $5,04$

۱۷۴ شکل زير مربوط به مولکول هاي HCl و F_2 است که در ميدان الکتریکی قرار گرفته اند. کدام عبارت (ها) در مورد آنها درست است (هستند)?



(a)

(b)

الف) شکل a مربوط به گاز F_2 و شکل b مربوط به گاز HCl است. ب) مولکول هاي HCl در ميدان الکتریکی به گونه ای جهت گيري می کنند که اتم های Cl به سمت قطب منفی قرار می گيرند.

پ) نقطه جوش F_2 از HCl کمتر است و در شرایط يكسان، آسان تر به مایع تبدیل می شود.

ت) جمع گشتوارهای دوقطبی این دو مولکول، صفر است.

۲ ب و ت

۳ الف و ت

۴ پ

۵ الف

۱۷۵ کدام گزینه درست است؟

۱ هر مولکولي که در ساختار آن اتم هيدروژن وجود داشته باشد می تواند پیوند هيدروژني تشکيل دهد.

۲ در مولکول هاي آب، هر اتم اکسیژن با پیوند کووالانسي از سوي اتم هيدروژن مولکول مجاور جذب می شود.

۳ نيروهای بين مولکولي اتانول (CH_3OH) و متان (C_4H_{10}) شبيه به هم و از نوع پیوند هيدروژني هستند.

۴ تعداد پیوندهای هيدروژني که هر مولکول آب در دماي $120^{\circ}C$ و $20^{\circ}C$ تشکيل می دهد با هم متفاوت است.

۱۷۶ به 50 گرم محلول $5,0$ درصد جرمی $NaCl$, 950 گرم آب اضافه می کنيم. غلظت $NaCl$ در محلول جديد

گروه آموزشی عصر

۴۵۰

۲۲۰

۵۰۰

۲۵۰

چند ppm است؟

www.my-dars.ir

۱۷۷ برای تهیه 400 ميلي لیتر محلول $1,0$ مولار KCl , چند گرم از محلول 25 درصد جرمی اين نمک لازم است؟

$$(K = 39, Cl = 35,5 : g \cdot mol^{-1})$$

۱۱,۴۲

۱۲,۶۴

۱۱,۹۲

۱۲,۸۲

۱۷۸ غلظت مولي محلول 16 درصد جرمی آمونيوم نیترات با چگالی $1,2$ گرم بر ميلی لیتر برابر کدام است؟
($H = 1, N = 14, O = 16 : g \cdot mol^{-1}$)

۰,۶


۲,۴

۱,۲

۴,۸



۱۷۹ ۴۸۰ گرم محلول پتاسیم نیترات سیر شده را از دمای $۳۵^{\circ}C$ تا $۴۵^{\circ}C$ سرد می‌کنیم. به ترتیب چند گرم نمک در این دما رسوب خواهد کرد و چند گرم آب در این دما باید به محلول افزود تا دوباره به محلول سیر شده تبدیل شود؟



- ۱) ۱۰۰ - ۴۵
۲) ۲۰۰ - ۲۵
۳) ۱۰۰ - ۷۵
۴) ۲۰۰ - ۵۰

۱۸۰ کدام موارد از عبارات زیر درست می‌باشد؟

(آ) آرگون و هلیم هر دو در جوشکاری، برش فلزات و خنک کردن قطعات الکترونیکی مورد استفاده قرار می‌گیرند.
 (ب) CO تولید شده در سوختن ناقص می‌تواند در حضور اکسیژن و در شرایط مناسب دوباره بسوزد و به CO_2 تبدیل شود.

(پ) پس از موازنۀ واکنش: $O_2 + KNO_3(s) \rightarrow K_2O(s) + N_2(g) + O_2(g)$ بیشترین ضریب استوکیومتری را در میان مواد شرکت‌کننده در واکنش دارد.
 (ت) وجود یون‌های Fe^{3+} در آب و تبدیل آن به یون‌های Fe^{2+} باعث ایجاد رسوب قهوه‌ای بعد از چکه کردن طولانی مدت در شیرهای منازل می‌شود.

- ۱) آ و ب ۲) آ و ت ۳) ب و ت ۴) ب و پ

ماهی درس


۱۸۱ کدام گزینه صحیح است؟

۱) با اضافه کردن محلول باریم کلرید به محلول سدیم سولفات، یکی از محصولات حاصل در آب نامحلول بوده و ترکیبی دوتایی است.
 ۲) نام ترکیب‌های $FeSO_4$, $Zn(NO_3)_2$ و NH_4OH , به ترتیب از راست به چپ، به صورت آهن (II) سولفات، آمونیوم هیدروکسید و روی نیتریت است.

۳) تعداد مول الکترون‌های مبادله شده برای تشکیل یک مول ترکیب آلومینیم کربنات، چهار برابر نسبت تعداد کاتیون به آنیون در ترکیب کروم (II) فسفات است.
 ۴) در ساختار ترکیب‌های آمونیوم نیترات و باریم فسفید، هر دو نوع پیوند کووالانسی و یونی وجود دارد.



۱۸۲ مایع A حاوی ۵ مول آب خالص و محلول B شامل ۲٪ مول از انواع یون‌ها در ۱۰۰ میلی‌لیتر از یک نمونه آب است. با گذشت زمان، کدام پدیده روی نمی‌دهد؟ ($O = 16, H = 1 : g \cdot mol^{-1}$)



۱ غلظت محلول B بیشتر از ۲ مولار خواهد شد.

۲ جرم و حجم مایع A کاهش و جرم و حجم محلول B افزایش می‌یابد.

۳ با وارد کردن نیرو برابر محلول B، جرم مایع A از ۹۰ گرم بیشتر خواهد شد.

۴ اگر مایع A شامل ۱٪ مول از انواع یون‌ها در ۱۰۰ میلی‌لیتر آب می‌بود، جرم این محلول پس از گذشت زمان کاهش می‌یافتد.

۱۸۳ کدام یک از موارد زیر، نادرست است؟

۱ سالانه میلیاردها تن مواد گوناگون از سنگ کره وارد آب می‌شود، اما جرم کل مواد حل شده در آب‌های کره زمین تقریباً ثابت است.

۲ در حدود ۷۵ درصد سطح زمین را آب پوشانده است که بخش عمده این آب در اقیانوس‌ها و دریاهای توزیع شده است.

۳ نسبت جرم نمک‌ها در آب اقیانوس‌ها و دریاهای به جرم کل آب روی کره زمین تقریباً برابر با $\frac{1}{300}$ است.

۴ انحلال نمک‌های گوناگون در آب اقیانوس‌ها و دریاهای، محلوتوی همگن، اغلب شورمزه را به وجود آورده است.

۱۸۴ چه تعداد از موارد زیر درست است؟

۱ ماهی‌ها گاز اکسیژن موجود در آب را با آبسش خود جذب و برای سوخت و ساز از آن استفاده می‌کنند.

۲ در فشار یک اتمسفر و در هر دمایی انحلال پذیری گاز CO_2 از NO بیشتر است.

۳ در دمای ثابت با دو برابر شدن فشار گاز، انحلال پذیری گاز دو برابر می‌شود.

۴ در فشار ثابت، با دو برابر شدن دمای گاز، انحلال پذیری آن نصف می‌شود.

۴

۲

۱

۳

۱۸۵ محلول ۲۵ درصد جرمی سدیم کلرید در دمای $1^{\circ}C$ یک محلول سیر شده است. انحلال پذیری سدیم کلرید

در این دما تقریباً چند گرم است و محلولی که شامل ۵۶٪ مول سدیم کلرید حل شده در ۱۰ میلی‌لیتر آب $1^{\circ}C$

است، چگونه محلولی است؟ (چگالی آب $1g \cdot mL^{-1}$ است.) ($Na = 23, Cl = 35,5 : g \cdot mol^{-1}$)

۲۵ - سیر نشده


۲۵ - فراسیر شده

۲۵ - سیر نشده

۱ - سیر نشده

۱۸۶ اگر برای تعیین غلظت یون Pb^{2+} موجود در یک تن فاضلاب صنعتی یک کارخانه از ۲۰۰۰ میلی‌لیتر

محلول ۱۵٪ مولار KI استفاده شود، غلظت یون Pb^{2+} در این نمونه از فاضلاب صنعتی چند ppm است؟ ($Pb = 208 g \cdot mol^{-1}$)



۸۲,۴

۶۲,۴

۴۱,۲

۳۱,۲



۱۸۷ تقریباً چند میلی لیتر آب باید از 250 mL محلول نیتریک اسید ۵٪ مولار تبخیر شود تا غلظت محلول

نیتریک اسید ۱۳٪ افزایش یابد؟

175 mL ۲

58 mL ۳

75 mL ۲

192 mL ۱

۱۸۸ چند مورد از مقایسه های زیر نادرست است؟

الف) کلسیم فسفات < مس (II) سولفات: رسانایی الکتریکی

ب) محلول ۱٪ مولار HCl < محلول ۱٪ مولار HF : رسانای جریان برق

پ) محلول آبی متانول و آمونیاک < محلول آبی KOH و $NaCl$: رسانای الکتریکی

۳ ۲

۲ ۳

۱ ۲

۱ صفر

۱۸۹ ۱۶۰۰ گرم محلول سدیم هیدروکسید، شامل ۸۰ گرم از این نمک است. اگر چگالی محلول $2,3\text{ g} \cdot \text{mL}^{-1}$

باشد، مجموع غلظت کل یون ها چند مول بر لیتر است؟ ($Na = 23, O = 16, H = 1\text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}$)

۶,۵ ۲

۵,۷ ۳


۴,۵ ۲

۷,۵ ۱

۱۹۰ کدام گزینه در مورد سه ترکیب هیدروژن دار گروه پانزدهم درست است؟ (الف)

نمودار دمای جوش سه عضو نخست آن به صورت رو برو است.

ب) مولکول هایی قطبی هستند که دارای ساختار هرمی می باشند.



پ) در دمای اتاق، تنها یکی از مولکول های NH_3 , PH_3 , AsH_3 و AsH_3 پیوند هیدروژنی می دهند.

ت) مقایسه $PH_3 > AsH_3$ را می توان به نیروهای واندروالسی بین مولکول های آنها نسبت داد.

۲ ۲

۳ پ

۲ ب

۱ الف

۱۹۱ چه تعداد از عبارات زیر نادرست است؟

الف) دیواره یاخته ها در بافت کلم بر اثر یخ زدن تخریب می شود؛ زیرا پیوندهای هیدروژنی در یخ سست می شود.

ب) میله شیشه ای مالش داده شده با موی سر، باریکه آب را منحرف می کند.

پ) در ساختار یخ، پیرامون هر مولکول آب، ۴ پیوند هیدروژنی تشکیل می شود.

ت) در ساختار یخ هر اتم هیدروژن دو پیوند دارد که یکی کووالانسی و دیگری هیدروژنی است.

۲ ۲

۴ ۳

۳ ۲

۱ ۱

۱۹۲ کدام دو گزینه درست هستند؟

الف) علت کمتر بودن نقطه جوش HCl از F_2 مشابه علت کمتر بودن نقطه جوش N_2 از CO است.

ب) در شرایط یکسان مولکول های CO , دشوارتر از N_2 به مایع تبدیل می شوند.

پ) در ترکیبات مولکولی با جرم مولی متفاوت، ترکیب با مولکول های قطبی نقطه جوش بالاتری دارد.

ت) نیروهای بین مولکولی در تعیین حالت فیزیکی و خواص یک ترکیب نقش مهمی دارند.

۲ ب و پ


۳ الف و ت

۲ پ و ت

۱ الف و ب



۱۹۳ ۵ گرم KNO_3 و ۵ گرم KCl را در دو ظرف مجزا هر يك حاوي ۵۰ گرم آب با دماي $10^\circ C$ می ريزيم، چند جمله از موارد زير صحیح می باشد؟ الف) محلول تهیه شده از هر دو سیرنشده می باشد.



ب) با کاهش دماي محلول KCl ، اين محلول داراي رسوب می شود.

پ) نقطه A، محلول هایی از KNO_3 و KCl است که در صد جرمی یکسان دارد.

ت) در دماي $10^\circ C$ ، عرض از مبدأ محلول ماده یونی دوتایی بیشتر از محلول یونی سه تایی است.

۴ (۲)

۲ (۳)

۳ (۲)

۱ (۱)

۱۹۴ ۶۰۰ گرم محلول سدیم فسفات با چگالی $1,2 g \cdot mL^{-1}$ ، شامل ۲۰,۵ گرم از اين نمک است، اختلاف

غلظت یون فسفات با یون سدیم چند مول بر لیتر است؟ ($Na = ۲۳, P = ۳۱, O = ۱۶ g \cdot mol^{-1}$)

۰,۱۲۵ (۲)


۰,۵ (۳)

۰,۲۵ (۲)


۰,۷۵ (۱)

۱۹۵ x گرم منیزیم را در ۲۰۰ میلی لیتر محلول هیدروکلریک اسید، طبق واکنش زیر وارد کرده ایم، همه منیزیم با

اسید واکنش داده و غلظت مولار اسید به اندازه ۰,۵ مول بر لیتر کاهش می یابد، x کدام است؟



$$(Mg = ۲۴ g \cdot mol^{-1})$$



۱,۸ (۱)

۰,۶ (۲)

۱,۲ (۳)

۲,۴ (۴)



ماي درس

گروه آموزشی عصر

۱۹۶ از واکنش ۲۰۰ میلی لیتر محلول هیدروکلریک اسید ۰,۵ مولار با مقدار کافی فلز آلومینیوم طبق واکنش زیر

گاز هیدروژن در شرایطی ایجاد می شود که چگالی این گاز برابر $0,۰۸ g \cdot L^{-1}$ است. اگر این مقدار هیدروژن در

واکنش تولید آب شرکت کند، چند لیتر آب ایجاد می شود (در این دما و فشار آب به صورت گازی می باشد)



۲۵ (۲)

۱,۲۵ (۳)

۱,۵ (۲)

۰,۹ (۱)



۱۹۷ درصد جرمی محلول ۲ مولار کلسیم برمید ($CaBr_2$) با چگالی ۱,۲ گرم بر میلی لیتر چقدر است؟


$$(Ca = 40, Br = 80 \text{ g} \cdot mol^{-1})$$

۵۲,۳ ۲

۲۳,۳ ۳

۲۵,۲ ۲

۳۳,۳ ۱



۱۹۸ در مورد شکل زیر، چه تعداد از عبارات زیر درست است؟ الف) در حالت III، مولکول‌های آب به صورت آزادانه و منظم از جایی به جایی دیگر می‌روند.

(1)

(2)

(3)

ب) چگالی شکل I از II کمتر است.

پ) در حالت I و II پیوند هیدروژنی مشاهده می‌شود.

ت) در حالت I، در هر ضلع از حلقة شش ضلعی، ۲ پیوند اشتراکی و هیدروژنی وجود دارد.

۱ ۲

۳ ۳

۲ ۲


۴ ۱

۱۹۹ با توجه به شکل‌های الف و ب کدام گزینه‌ها درست هستند؟ الف) شکل ب، فرآیند اسمز معکوس را نشان می‌دهد که با آن می‌توان آب دریا را نمک‌زدایی کرد.


ب) شکل الف، چگونگی تولید آب شیرین از آب دریا را توضیح می‌دهد.

پ) در فرآیند شکل ب) فشار ثابتی از خارج اعمال می‌شود که نشان‌دهندهٔ غیرخودبخودی بودن فرآیند است.

ت) در فرآیند شکل (الف) مولکول‌های آب از غشای نیمه تراوا عبور می‌کنند.




الف




۲) الف و پ و ت

۳) ب و پ و ت

۱) الف و ب و پ



(الف)



(ب)

۲۰۰ با توجه به شکل زیر کدام گزینه درست است؟

۱) شکل الف و ب به ترتیب متعلق به H_2O و CO_2 می‌باشند.

۲)

مولکول‌های CO_2 در میدان الکتریکی به گونه‌ای جهت‌گیری می‌کنند که اتم‌های O به سمت قطب مثبت قرار گیرند.

۳) مولکول CO_2 دارای پیوندهای کووالانسی ناقطبی است.

۴) نقطه جوش CO_2 از H_2O کمتر است و در شرایط یکسان، آسان‌تر به مایع تبدیل می‌شود.



۲۰۱ در کدام گزینه جاهای خالی به درستی پر شده‌اند؟

الف) با توجه به هم‌گروه بودن P و As ، فرمول شیمیایی آلومینیوم فسفات و آهن (II) آرسنات به صورت و می‌باشند.

ب) بار آهن در سنگ معدن مگنتیت با فرمول Fe_3O_4 با بار آهن در آهن (III) منگنات مشابه است.



۲۰۲ کدام گزینه نادرست است؟

۱ فعالیت آتشفشنای سبب می‌شود گازهای گوناگون و مواد شیمیایی جامد به صورت گرد و غبار وارد هوایکره شوند.

۲ نزدیک به ۷۵ درصد جرم کره زمین را آب تشکیل می‌دهد.

۳ تهیه آب قابل استفاده در کشاورزی، صنعت و دیگر حوزه‌ها یکی از چالش‌های اساسی در سطح جهان است.

۴ دریاها و دریاچه‌ها منابع ارزشمندی برای تهیه و استخراج مواد شیمیایی گوناگون هستند.

۲۰۳ در چه تعداد از موارد زیر پاسخ سؤال نادرست نوشته شده است؟

الف) پویا بودن زمین از دیدگاه شیمیایی به چه معنا است؟ یعنی بخش‌های گوناگون زمین با یکدیگر بر هم‌کنش‌های فیزیکی و شیمیایی دارند.

ب) فرمول ترکیب یونی حاصل از آنیون و کاتیونی که بیشترین مقدار را در آب دریا دارند، کدام است؟ $MgCl_2$

پ) بیشترین بخش آب شیرین قابل استفاده و در دسترس کدام است؟ کوه‌های یخ

۱ یک ۲ دو ۳ سه ۴ صفر

۲۰۴ کدام گزینه درست است؟

۱ مقایسه غلظت برخی یون‌های موجود در آب دریا بر حسب میلی‌گرم در یک کیلوگرم آب به صورت $Ca^{2+} < CO_3^{2-} < Mg^{2+} < SO_4^{2-}$ صحیح است.


۲ بیشترین سهم کاتیون‌های محلول در آب مربوط به گروه‌های ۱ و ۲ جدول دوره‌ای عناصر است.

۳ مقدار یون کلرید محلول در آب، نشان‌دهنده مقدار گرم نمک سدیم کلریدی است که در آب حل شده است.

۴ جرم کل مواد حل شده در آب‌های کره زمین به طور پیوسته در حال تغییر است.

۲۰۵ با توجه به نمودار روبرو، در ۵ کیلوگرم آب در دمای $C^{\circ} 35$ ، حداکثر چند میلی‌مول O_2 وجود دارد؟ (محلول

سیر شده فرض شود.)




$$(O = 16 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1})$$

۱ ۴
۲ ۳/۴
۳ ۲/۷
۴ ۳/۴



۲۵۶ محلولی با درصد جرمی ۲۰ درصد و چگالی $KNO_3 \cdot 1,3 g \cdot mL^{-1}$ تهیه کردیم. ۱۰۰ میلی لیتر از این محلول در دمای $30^\circ C$ است و اگر آن را تا دمای $10^\circ C$ سرد کنیم



۱ سیرنشده - ۵,۲ گرم KNO_3 رسوب می کند.

۲ سیرنشده - ۶ گرم KNO_3 رسوب می کند.

۳ فرسیر شده - ۵,۲ گرم KNO_3 رسوب می کند.

۴ فراسیر شده - ۶ گرم KNO_3 رسوب می کند.

۲۵۷ کدام یک از عبارت های زیر درست است؟

الف) دمای جوش H_2S از H_2O بیشتر است؛ زیرا گشتاور دوقطبی H_2S و H_2O به ترتیب برابر ۱,۸۵ و ۰ دبای است.

ب) دمای جوش اتانول از استون بیشتر است، زیرا پیوند هیدروژنی قوی تری بین مولکول های آن وجود دارد.

پ) کمترین دمای جوش در ترکیب های هیدروژن دار گروه ۱۵ مربوط به PH_3 است.

ت) ید و هگزان همانند آب و استون در یکدیگر حل می شوند.

۱ ب و ت

۲ پ و ت

۳ ب و پ

الف و ب

۲۵۸ از حل کردن کدام یک از ترکیب های زیر به صورت جداگانه در یک کیلوگرم آب غلظت یون کلر، به تقریب

۳۰ ppm می شود؟

$(K = ۳۹, Ca = ۴۰, Na = ۲۳, O = ۱۶, Cl = ۳۵, Fe = ۵۶ : g \cdot mol^{-1})$

۱ ۰,۰۵g آهن (III) کلرید

۲ ۰,۰۵g سدیم کلرید

۳ ۰,۰۵g کلسیم کلرید

۲۵۹ در کدام گزینه میزان رسانایی الکتریکی در محلول ها، به درستی مقایسه نشده است؟ (تمامی ترکیب ها در آب

محلول هستند).

۱ محلول ۲ مولار $MgCl_2 < NaCl$

۲ محلول ۲ مولار $AlCl_3 < KCl$

۳ محلول ۱ مولار $NaNO_3 > NaCl$

۴ محلول ۱ مولار $Li_2SO_4 > KNO_3$

کدام مطلب نادرست است؟ ۲۱۰

۱ یکی از مهم‌ترین یون‌ها در الکتروولیت‌های بدن، یون پتاسیم است که برای تنظیم و عملکرد مناسب دستگاه عصبی بسیار ضروری است.

۲ سدیم کلرید در حالت جامد نارسانا است، اما در حالت مذاب رسانای جریان برق می‌باشد.

۳ استفاده از صافی کربن یکی از روش‌های مناسب تصفیه آب جهت از بین بردن میکروب‌ها است.

۴ در فرایند اسمز معکوس برخلاف اسمز، مولکول‌های آب از محیط غلیظ به رقیق جابه‌جا می‌شوند.

همه موارد زیر درست هستند، به جز ۲۱۱

۱ بیش از $\frac{3}{4}$ منابع آبی غیراقیانوسی را کوه‌های یخ تشکیل داده‌اند که این مقدار ۱۵,۲۱۵ درصد کل منابع آبی است.

۲ بیشتر آب‌های روی زمین شور است و بر خلاف مصارف کشاورزی، در مصارف خانگی و صنعتی قابل استفاده نیستند.

۳ اقیانوس‌ها، دریاها و دریاچه‌ها منابع ارزشمندی برای تهیه فراورده‌های پروتئینی هستند.

۴ آب باران به دلیل فرایند تشکیل آن، در هوای پاک تقریباً خالص است.

۲۱۲ محلول پتاسیم کلرید با غلظت $2\text{mol} \cdot \text{L}^{-1}$ را به 250mL محلول کلسیم کلرید با غلظت $1\text{mol} \cdot \text{L}^{-1}$ اضافه می‌کنیم. غلظت یون کلرید در محلول به دست آمده چند $\text{mol} \cdot \text{L}^{-1}$ است؟

۱ ۰,۲۷۵

۲ ۰,۲۵

۳ ۰,۲

۴ ۰,۱۵

پاسخ درست پرسش‌های زیر به ترتیب در کدام گزینه آمده است؟ ۲۱۳

(آ) کدام یک رسانای جریان برق است؟ ($\text{NaCl}(aq) - \text{NaCl}(s)$)

(ب) کدام محلول الکتروولیت ضعیف است؟ ($\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}(aq) - \text{HF}(aq)$)

(پ) وجود کدام یون برای تنظیم و عملکرد مناسب دستگاه عصبی بسیار ضروری است؟ ($\text{Ca}^{2+}, \text{K}^+$)

۱ $\text{K}^+ - \text{C}_2\text{H}_5\text{OH}(aq) - \text{NaCl}(s)$

۲ $\text{Ca}^{2+} - \text{HF}(aq) - \text{NaCl}(s)$

۳ $\text{Ca}^{2+} - \text{C}_2\text{H}_5\text{OH}(aq) - \text{NaCl}(aq)$

۴ $\text{K}^+ - \text{HF}(aq) - \text{NaCl}(aq)$

۲۱۴ در یک واحد صنعتی از ۵ مخزن مکعبی شکل به ضلع ۴ متر استفاده می‌شود. اگر غلظت یون کلرید مورد نیاز برای این مخازن 142ppm باشد، مقدار کل کلسیم کلرید لازم برای استفاده روزانه در مخازن حدوداً چند کیلوگرم است؟


$$(\text{Ca} = 40, \text{Cl} = 35, 5 : \text{g} \cdot \text{mol}^{-1}) (1\text{g} \cdot \text{mL}^{-1})$$

۱ ۱۴,۲

۲ ۱۴۲

۳ ۷,۱

۴ ۷۱



۲۱۵ با توجه به نمودار مقابل چند مورد صحیح وجود دارد؟

الف) انحلال پذیری $NaCl$ بیشترین وابستگی را به دما دارد.

ب) کمترین انحلال پذیری در دمای ۳۰ درجه سانتیگراد مربوط به Li_2SO_4 است.

پ) اختلاف انحلال پذیری $NaNO_3$ و KNO_3 در دمای صفر درجه بزرگ‌تر از اختلاف انحلال پذیری KCl و Li_2SO_4 در دمای ۹۰ درجه است.

ت) با کاهش دما انحلال پذیری لیتیوم سولفات کاهش می‌یابد و $NaCl$ افزایش می‌یابد.

۴ مورد

۳ مورد

۲ مورد

۱ مورد

۲۱۶ در میان موارد زیر چند عبارت درست هستند؟

الف) ترکیب شیمیایی و حالت فیزیکی محلول در سرتاسر آن یکنواخت و یکسان است.

ب) در محلول شامل ۵۰g آب و ۱۰۰g اتانول، اتانول حلal است. ($H = 1, O = 16, C = 12 g \cdot mol^{-1}$)

پ) غلظت بسیار بالای نمک در آب دریای مرده و دریای سرخ سبب شده که انسان به راحتی بر روی آن شناور بماند.

ت) افزودن آب به محلول مس (II) سولفات، سبب کاهش رنگ آبی محلول می‌شود.

۴ مورد

۳ مورد

۲ مورد

۱ مورد

۲۱۷ به ۵۰۰ میلی‌لیتر محلول ۸٪ مولار سدیم هیدروکسید، میلی‌لیتر آب اضافه کنیم تا غلظت

محلول به ۸٪ مولار برسد.

۵۰۰۰

۴۵۰۰

۴۰۰۰

۵۵۵۵

ما درس

کروه‌آموزی عصر

۲۱۸ در میان موارد زیر چند عبارت در مورد آمونیوم فسفات درست است؟

الف) تعداد پیوندهای کووالانسی در کاتیون آن، یکی کمتر از تعداد پیوندهای کووالانسی در آنیون آن است.

ب) از حل شدن هر واحد فرمولی از آن در آب، ۷ یون وارد آب می‌شود.

پ) در آنیون این ترکیب نسبت شمار جفت الکترون‌های ناپیوندی به پیوندی برابر ۳ است.

ت) نسبت شمار اتم‌ها به عنصرها در این ترکیب کمتر از نسبت شمار اتم‌ها به عنصرها در آهن (III) سولفات است.

۲ مورد

۴ مورد

۳ مورد

۱ مورد



۲۱۹ چه تعداد از عبارت‌های زیر نادرست است؟

- الف) عامل تفاوت آبهای آشامیدنی و دیگر آب‌ها، در نوع حل شوندۀ آنهاست.
- ب) بیش از $\frac{3}{4}$ منابع غیر اقیانوسی آب کره، مربوط به کوه‌های یخ می‌باشد.
- پ) لاشه جانوران و گیاهان پس از تجزیه وارد زیست کره می‌شوند.
- ت) انحلال برخی از نمک‌های موجود در سنگ کره درون آب کره می‌تواند دلیلی برای پویا بودن زمین باشد.

۱ مورد

۲ مورد

۳ مورد

۴ مورد

۲۲۰ در میان موارد زیر چند عبارت نادرست هستند؟

- الف) رد پای آب نشان می‌دهد که هر فرد چه مقدار آب قابل استفاده و در دسترس مصرف می‌کند.
- ب) میانگین رد پای آب برای هر فرد در یک سال، در حدود یک میلیون لیتر است.
- پ) رد پای آب ایجاد شده در صنعت کشاورزی، سنگین‌تر از سایر صنایع است.
- ت) هر چقدر رد پای آب ایجاد شده سنگین‌تر باشد، منابع آب (شور و شیرین) بیشتر مصرف می‌شوند.

۱ مورد

۲ مورد

۳ مورد

۴ مورد

۲۲۱ در میان موارد زیر کدام عبارات درست هستند؟

- الف) آمونیوم سولفات، یک کود شیمیایی است که عناصر N , S و H را در اختیار گیاه قرار می‌دهد.
- ب) در یون آمونیوم، بار مثبت به اتم خاصی تعلق ندارد، بلکه متعلق به کل یون است.
- پ) فرمول شیمیایی سدیم آزید و کلسیم آزید به ترتیب NaN_3 و Ca_3N_2 است.
- ت) کاتیون موجود در $MnSO_4$ ، دارای ۵ الکترون با $l = 2$ است.

۱ ب و ت

۲ الف و ت

۳ پ و ت

۴ الف و ب

۲۲۲ کدام دو گزینه صحیح هستند؟

- الف) فراوانی کاتیون‌های عناصر گروه دوم جدول دوره‌ای در آب دریا بیشتر از فراوانی کاتیون‌های گروه اول است.
- ب) وجود مقدار زیاد یون‌های محلول در برخی از آبهای آشامیدنی سبب تغییر مزه آب می‌شود.
- پ) افرودن مقدار کمی گاز فلورور به آب آشامیدنی، سبب حفظ سلامت دندان‌ها می‌شود.
- ت) جرم کل مواد حل شده در آب‌های کره زمین هر سال افزایش نمی‌یابد و تقریباً ثابت است.

۱ ب و پ

۲ الف و ت

۳ ب و ت

۴ ب و پ

۲۲۳ کدام گزینه درست است؟

- ۱) گشتاور دو قطبی، کمیتی است که با افزایش جرم مولی، بزرگ‌تر می‌شود.
- ۲) برخلاف NH_3 , قادر به تشکیل پیوند هیدروژنی نیست.
- ۳) به همه انواع نیروهای جاذبۀ بین مولکولی، نیروهای واندروالسی می‌گویند.
- ۴) در مولکول آب، اتم اکسیژن جذب صفحه منفی و اتم هیدروژن جذب صفحه مثبت میدان الکتریکی می‌شوند.

۱




۲

۳

۴



در کدام گزینه، نام یون و واکنش نوشته شده برای تشخیص آن یون صحیح است؟ ۲۲۴



چنانچه ۴۲ میلی‌گرم نمک کلسیم‌نیترات را به ۲۵۰ میلی‌لیتر محلول پتاسیم‌نیترات به غلظت 500 ppm اضافه کنیم، غلظت یون نیترات در محلول نهایی چند ppm است؟ (چگالی محلول را برابر $1\text{ g}\cdot\text{ML}^{-1}$ در نظر بگیرید)

$$(Ca = 40, N = 14, O = 16, K = 39, g \cdot mol^{-1})$$

۸۰۳ ۵

۶۵۰ ۷

۳۰۸ ۲

۵۶۰ ۱

چند مورد از عبارات زیر نادرست است؟ ۲۲۶

الف) تجزیه لاشه جانداران بر اثر واکنش‌های شیمیایی، ارتباط سنگ‌کره و هواکره را نشان می‌دهد.

ب) فراوان‌ترین کاتیون و فراوان‌ترین آنیون در آب دریا، به آرایش گازنجیب یکسانی رسیده‌اند.

پ) فرآیند تبخیر آب و سپس تشکیل برف و باران الگویی برای تهیه آب مقطر و تقطیر است.

ت) اقیانوس‌ها، دریاها و دریاچه‌ها منابع ارزشمندی برای تهیه فرآورده‌های پروتئینی، مواد و وسائل تزیینی هستند.

۴ مورد ۶

۳ مورد ۷

۲ مورد ۲

۱ مورد ۱

با توجه به جدول زیر، در میان موارد ذکر شده، چند عبارت درست هستند؟ ۲۲۷

I	II
a	آهن (III) نیترات
باریم سولفات	b
کروم (III) کربنات	c
d	روی سولفات

الف) در ساختار لوویس آنیون ترکیب d و b ، ۴ جفت الکترون پیوندی وجود دارد.

ب) نسبت اتم‌های اکسیژن در ترکیب a به همین اتم در ترکیب C برابر یک است.

پ) مدل فضا پرکن آنیون‌های a و c مشابه یکدیگر است.

۱ مورد ۶

۲ مورد ۷

۳ مورد ۲

۱ صفر ۱



۲۲۸ در کدام گزینه جاهای خالی به درستی پر شده‌اند؟

- الف) غلظت یک نمونه محلول منیزیم‌نیترات با درصد جرمی ۸۰ درصد و چگالی $1,5 g \cdot mL^{-1}$ مولار است. $Mg = 24$, $N = 14$, $O = 16$ $g \cdot mol^{-1}$ (از رقم اعشار صرف نظر کنید)
- ب) در نیم لیتر از محلول فوق مول یون نیترات وجود دارد.

۸ - ۴ ۱۶

۴ - ۸ ۲۳

۴ - ۴ ۲۲

۸ - ۸ ۱۵

۲۲۹ در کدام گزینه به نیمی از پرسش‌های زیر پاسخ درست داده شده؟

- الف) بیشترین کاتیون و آنیون در آب دریا به ترتیب کدامند؟
- ب) کدام گونه در زیست‌کره نقش اساسی را ایفا می‌کند؟
- پ) پس از اقیانوس‌ها، بیشترین مقدار آب جهان در چه قسمتی ذخیره شده است؟
- ت) چند درصد از مردم جهان از بی‌آبی رنج می‌برند؟

 Cl^- و Na^+ - درشت مولکول‌ها - دریاچه‌ها - ۵۰ ۱ SO_4^{2-} و Na^+ - مولکول‌های کوچک - دریاچه‌ها - ۶۶ ۲ SO_4^{2-} و K^+ - مولکول‌های کوچک - کوه‌های یخی - ۵۰ ۳ Cl^- و Na^+ - درشت مولکول‌ها - آب‌های زیرزمینی - ۶۶ ۴


۲۳۰ در کدام گزینه به پرسش I پاسخ درست و به پرسش II پاسخ نادرست داده شده است؟ وضعیت محلول را بررسی نمایید.

I) محلولی از سدیم نیترات با غلظت $7 ppm$ چه وضعیتی دارد؟ (محلول - نامحلول - کم محلول)

II) برای حل کردن ۳۷ مول از ترکیب A با جرم مولی ۱۴۸، حداقل ۱۴۸۰ کیلوگرم آب نیاز است.

۱) نامحلول - کم محلول ۲) کم محلول - نامحلول ۳) محلول - نامحلول

۲۳۱ با توجه به نمودار مقابل در کدام گزینه پاسخ پرسش‌های زیر به درستی داده شده است؟ الف) با سرد کردن



۴۵۰ گرم محلول سیرشده سدیم نیترات از دمای $30^\circ C$ به $10^\circ C$ چند گرم سدیم نیترات ته نشین می‌شود؟

ب) غلظت مولار محلول سیرشده پتاسیم نیترات در دمای $40^\circ C$ کدام است؟

$$KNO_3 = 101 g \cdot mol^{-1}$$

$$KNO_3 = 1,3 g \cdot mL^{-1}$$

۲ - ۳۶,۴ ۱۶

۴ - ۳۶,۴ ۲۳

۸ - ۳۴,۶ ۲۲

۴ - ۳۴,۶ ۱۵



اگر معادله انحلال پذيری برای ماده‌ای به صورت $S = 17\theta + 37 - 50$ باشد، کدام گزینه نادرست است؟ ۲۳۲

۱) اين معادله می‌تواند به Li_2SO_4 مربوط باشد که با افرايش دما، انحلال پذيری آن کاهش می‌يابد.

۲) در ۲۴۰ گرم محلول سيرشده از آن در دمای $C = 100^\circ$ ، مقدار ۴۰ گرم نمک وجود دارد.

۳) انحلال پذيری نمک فوق با سدیم نیترات در هيج دمایی برابر نخواهد بود.

۲۰۰ g آب
۳۷ g نمک
 $\theta = 0^\circ C$ شكل ۲۳۲

در کدام گزینه جاهای خالي به درستی تكميل شده‌اند؟ ۲۳۳

الف) غلظت گلوکز در يك نمونه خون برابر $1 \cdot L^{-1} \cdot mol^{0.24}$ است، صفحه نمایشگر دستگاه قند خون عدد $C_6H_{12}O_6 = 180 g \cdot mol^{-1}$ را نشان می‌دهد.

ب) به ۵۰۰ گرم محلول $280 ppm$ سدیم هیدروکسید چند گرم آب اضافه کنیم تا غلظت $NaOH$ برابر $70 ppm$ شود.

۲۰۰۰ - ۲۱۶ ۲

۱۰۰۰ - ۲۱۶ ۳

۱۵۰۰ - ۴۳۲ ۲

۵۰۰ - ۴۳۲ ۱

کدام دو گزینه درست است؟ ۲۳۴

الف) آنيون‌های كلريد و فسفات به ترتيب برای شناسايي کاتيون‌های Ba^{2+} و Ca^{2+} استفاده می‌شود.

ب) بر اثر واکنش محلول‌های باریم کلرید و سدیم سولفات، رسوب سفیدرنگ باریم سولفات تشکیل می‌شود.

پ) در شناسايي یون نقره، رسوبی تشکیل می‌شود که در آن نسبت شمار آنيون به کاتيون برابر يك است.

ت) از محلول نقره‌نيترات برای شناسايي یون سدیم محلول در آب، می‌توان بهره برد.

۲) الف و ت

۳) ب و پ

۲) پ و ت

۱) الف و ب

در ميان موارد زير کدام دو عبارت درست هستند؟ ۲۳۵

الف) نسبت اتم‌های هيدروژن در آمونيوم کربنات به اتم‌های اکسیژن در آهن (II) فسفات برابر $\frac{1}{2}$ است.

ب) نسبت تعداد اتم‌ها به عنصرها در ليتيم سولفات و منگنز (III) کربنات برابر است.

پ) نسبت تعداد آنيون به کاتيون در کلسیم کلرید ييشتر از نسبت تعداد کاتيون به آنيون در آلومینیوم نیترید است.

ت) در يك واحد فرمولی از آمونیوم سولفات، ۱۲ پیوند کووالانسی وجود دارد.

۲) پ و ت


۳) ب و پ

۲) الف و پ

۱) الف و ب



۲۳۶ از انحلال ۱۲۰ گرم پتاسیم کلرید در ۳۰۰ گرم آب، محلولی سیرشده به دست می‌آید. اگر این محلول را ۲۵ درجه گرم کنیم و با افزودن پتاسیم کلرید کافی به آن، محلول سیرشده آن را در این دما به دست بیاوریم، درصد جرمی محلول حاصل تقریباً کدام است؟



۲۸,۸ ۱

۵۲,۶ ۳

۴۲,۰ ۲

۳۲,۶ ۴

۲۳۷ کدام یک از عبارت‌های زیر صحیح است؟

۱ اگر نقطه جوش HF در $19^{\circ}C$ باشد، جوش NH_3 می‌تواند $23^{\circ}C$ باشد.۲ اگر گشتاور دوقطبی H_2O باشد، گشتاور دوقطبی H_2S می‌تواند $97D$ باشد.

۳ پیوند هیدروژنی همانند پیوند کووالانسی قوی است.

۴ بالا بودن نقطه جوش آب به دلیل قوی بودن پیوند کووالانسی $H - O$ است.۲۳۸ غلظت مولی تمام یون‌های موجود در یک نمونه ۱۶,۲۸ کیلوگرمی از نمک Na_3P برابر با $۱۶,۰$ مول بر لیتر می‌باشد. غلظت یون فسفید به تقریب چند ppm است؟ (چگالی نمونه را $\frac{g}{mL} = ۱,۱۴$ در نظر بگیرید و

$$(Na = ۲۳, P = ۳۱ : g \cdot mol^{-1})$$

۲۷۲ ۲

۵۴,۴ ۳

۵۴۴ ۱

۱۰۸,۸ ۴

۲۳۹ با توجه به معادله انحلال پذیری $S = ۰,۸\theta + ۷۲$ که مربوط به سدیم نیترات است، تعیین کنید که در دمای۶۰°C با ۱۵۰ گرم از این نمک، چند میلی‌لیتر محلول سیرشده با چگالی $1g \cdot mL^{-1}$ می‌توان تهیه کرد؟ (θ بر حسب درجه سلسیوس است). ($Na = ۲۳, N = ۱۴, O = ۱۶ : g \cdot mol^{-1}$)

۳۳۰ ۲

۲۷۰ ۳

۳۲۰ ۱

۲۵۰ ۴

۲۴۰ کدام یک از عبارت‌های زیر نادرست است؟

الف) اگر کره زمین را مسطح در نظر بگیریم، آب، همه سطح آن را تا ارتفاع ۲ متر می‌پوشاند.

ب) آب اقیانوس‌ها و دریاهای مخلوطی همگن است که همواره مزه‌ای شور دارد، زیرا مقدار قابل توجهی از نمک‌های گوناگون در آن حل شده است.

پ) زمین از دیدگاه شیمیایی پویا است.

ت) تفاوت آب آشامیدنی و دیگر آب‌ها فقط در مقدار حل شونده‌های آن‌ها است.

۲ فقط ب

۳ ب - ت

۱ ب - پ - ت

۴ الف - پ



۲۴۱ در مورد مواد موجود در آب دریا، پاسخ صحیح پرسش‌های الف و ب (به ترتیب از راست به چپ) در کدام گزینه آمده است؟

- الف) در میان آنیون‌های چند اتمی موجود در آب دریا، کدام آنیون بیشترین مقدار را دارد؟
ب) مقدار کدام کاتیون در آب دریا از دیگر کاتیون‌ها بیشتر است؟

۱ یون کلرید - یون سدیم ۲ یون سولفات - یون کربنات - یون منیزیم ۳ یون برمند - یوم منیزیم

۲۴۲ کدام یک از گزینه‌های زیر صحیح نیست؟

۱ تمام یون‌های سازنده آمونیوم کربنات، یون‌های چند اتمی هستند.

۲ رسوب سفید رنگ نقره کلرید از واکنش محلول نقره نیترات با محلول سدیم کلرید تشکیل می‌شود.

۳ آمونیاک سولفات یکی از کود‌های شیمیایی است که دو عنصر نیتروژن و گوگرد را در اختیار گیاه قرار می‌دهد.

۴ در اثر واکنش محلول سدیم فسفات با محلول کلسیم کلرید، محلول‌های کلسیم فسفات و سدیم کلرید حاصل می‌شود.

۲۴۳ هر گاه به محلول مقداری محلول اضافه کنیم، با تشکیل رسوب سفید رنگ می‌توان به وجود کاتیون باریم پی برد. مجموع ضرایب مواد شرکت‌کننده در این واکنش در معادله موازن شده آن برابر با است.

۱ باریم سولفات - سدیم کلرید - ۴
۲ سدیم سولفات - باریم کلرید - ۵

۳ باریم سولفات - سدیم کلرید - ۵
۴ سدیم سولفات - باریم کلرید - ۴

۲۴۴ چه تعداد از عبارت‌های زیر جمله داده شده را به درستی تکمیل می‌کند؟ «فراورده واکنش با می‌تواند، باشد.»

الف) نقره نیترات - سدیم کلرید - قرمز رنگ

ب) اکسیژن - نیتروژن منوکسید - قهوه‌ای رنگ

پ) سدیم فسفات - کلسیم کلرید - سفید رنگ

ت) بنزین - اکسیژن - بی‌رنگ

۱ مورد ۲ مورد ۳ مورد ۴ مورد

www.my-dars.ir

۲۴۵ اگر تعداد یون‌های تشکیل دهنده هر واحد فرمولی اکسیدی از کروم برابر a و منیزیم کلرید b باشد، کدام یک از عبارت‌های زیر نادرست است؟ (تنها ظرفیت‌های اشاره شده در کتاب درسی را در نظر بگیرید).

۱ تفاوت a و b می‌تواند ۳ باشد.

۲ اگر b بزرگ‌تر از a باشد، نسبت شمار کاتیون به آنیون در اکسید کروم بزرگ‌تر از منیزیم کلرید است.

۳ اگر نسبت کاتیون به آنیون در ترکیب اکسید کروم کم ترین مقدار ممکن باشد، تعداد الکترون‌های $a = 2 = b$ کاتیون ترکیب برابر ۳ می‌باشد.

۴ اگر مجموع a و b بزرگ‌ترین عدد باشد، مجموع نسبت شمار آنیون‌ها به کاتیون‌های دو ترکیب ۳,۵ خواهد بود.



۲۴۶ در کدام یک از گزینه‌های زیر، مجموع تعداد اتم‌های شرکت‌کننده در ساختار هر واحد از ترکیب، بیشتر از ترکیبات دیگر است؟

۱۶ آلمینیم نیترات

۱۷ آمونیوم کربنات

۱۸ کلسیم فسفات

۱۹ آهن (III) سولفات

۲۴۷ به 500 mL محلول NaOH با غلظت $2,0$ مول بر لیتر، باید چند گرم NaOH جامد اضافه کنیم تا غلظت محلول به $6,0$ مول بر لیتر برسد؟ (از تغییر حجم محلول چشم‌پوشی کنید)
 $(\text{Na} = 23, \text{O} = 16, \text{H} = 1 : \text{g} \cdot \text{mol}^{-1})$

۲۰

۲۱

۲۲

۲۳

۲۴۸ چه تعداد از مطالب زیر در مورد آمونیوم سولفات درست است؟

الف) یک نوع کود شیمیایی است که دو عنصر نیتروژن و گوگرد را در اختیار گیاه می‌گذارد.

ب) تعداد اتم‌های سازنده یک واحد از آن سه برابر تعداد اتم‌های سازنده یک واحد از منیزیم هیدروکسید است.

پ) نسبت شمار کاتیون به آنیون در آن با نسبت شمار آنیون به کاتیون در منیزیم نیترات برابر است.

ت) از انحلال هر واحد از آن در آب سه یون حاصل می‌شود.

۲۴ مورد

۲۵ مورد

۲۶ مورد

۲۷ مورد

۲۴۹ چند مورد از مطالب زیر نادرست است؟

الف) بین مولکول‌های آب در حالت بخار پیوند هیدروژنی وجود ندارد.

ب) پیوندهای هیدروژنی بین مولکول‌های آب از پیوند کووالانسی بین اتم‌های آن قوی‌تر است.

پ) در ساختار یخ، آرایش مولکول‌های آب به گونه‌ای است که در آن، اتم‌های هیدروژن در رأس حلقه‌های شش ضلعی قرار دارند.

ت) چگالی جرم معینی از یخ کم‌تر از چگالی همان جرم آب است.

۲۸ مورد

۲۹ مورد

۳۰ مورد

۳۱ مورد

۲۵۰ درصد جرمی یک نمونه پتاسیم کلرید در آب برابر 10 است. به 200 گرم از این نمونه چند گرم جامد دیگر اضافه کنیم تا درصد جرمی KCl در نمونه به 25 درصد افزایش یابد؟ (از تغییر حجم محلول در اثر افزودن KCl صرف نظر کنید).

۳۲

۳۳

۳۴

۳۵



۲۵۱

$$(C_6H_{12}O_6 = 180 \text{ g} \cdot mol^{-1})$$

الف) در فرایند تولید منیزیم از آب دریا و با استفاده از جریان برق محلول منیزیم کلرید به عنصرهای سازنده آن تجزیه می‌شود.

ب) اگر غلظت گلوکز در خون برابر $100 \text{ میلی گرم در دسی لیتر}$ باشد، غلظت مولار آن تقریباً برابر $10 \times 5,5^{-3}$ مولار است.

پ) با افزودن آب به محلول مس (II) سولفات، این محلول رقیق شده و از شدت رنگ آبی محلول کاسته می‌شود.

۱ صفر

۳ مورد

۲ مورد

۱ مورد

۲۵۲ در 80 میلی لیتر محلول 60% جرمی پتابسیم سولفات، غلظت یون سولفات در این محلول به تقریب چند مول بر لیتر است؟

$$(O = 16, K = 39, S = 32 : g \cdot mol^{-1} - 1 \text{ چگالی محلول} = 1 \text{ g} \cdot mL^{-1})$$

۴

۳,۵

۵,۲

۱

۲۵۳ انحلال پذیری لیتیم سولفات از معادله $S = -15\theta + 36$ پیروی می‌کند، اگر 532 گرم محلول سیر شده آن را از دمای C° درجه تا 20° گرم کنیم، کدام یک از عبارت‌های زیر صحیح است؟

۱ مقداری از حل شونده رسوب می‌کند، به طوری که جرم محلول باقیمانده برابر 502 گرم می‌شود.

۲ $22,5 \text{ گرم}$ ماده حل شونده رسوب می‌کند.

۳ محلول سیر نشده‌ای به دست می‌آید که با افزودن 30 گرم لیتیم سولفات سیر می‌شود.

۴ محلول سیر نشده‌ای به دست می‌آید که با افزودن $22,5 \text{ گرم}$ لیتیم سولفات سیر می‌شود.

۲۵۴ با توجه به نمودار رو به رو، چند عبارت صحیح است؟ (الف)

انحلال پذیری سدیم نیترات در دمای $30^{\circ}C$ بیشتر از انحلال پذیری پتابسیم نیترات در همین دماست.



ب) از انحلال 50 گرم پتابسیم نیترات در 50 گرم آب در دمای $35^{\circ}C$ حدود 75 گرم محلول سیر شده به دست می‌آید.

پ) با افزایش دما انحلال پذیری سدیم کلرید افزایش می‌یابد.

ت) تأثیر دما بر انحلال پذیری پتابسیم نیترات بیشتر از پتابسیم کلرید است.

۱ مورد

۳ مورد

۲ مورد

۱ مورد

۲۵۵ با 80 گرم محلول 25 درصد جرمی سدیم هیدروکسید، چند میلی لیتر محلول 2 مولار آن را می‌توان تهیه کرد؟ ($\text{NaOH} = 40 \text{ g} \cdot mol^{-1}$)

۵۰۰

۵۰

۲۵۰

۲۵



۲۵۶ کدام گزینه جمله زیر را به درستی تکمیل می کند؟

«پیوند هیدروژنی، نیروی بین مولکولی در موادی است که در مولکول آن‌ها، اتم هیدروژن به یکی از اتم‌های با پیوند اشتراکی متصل است.»

۱) قوی‌ترین - F, Cl, Br ۲) ضعیف‌ترین - F, N, O ۳) قوی‌ترین - F, N, O

۲۵۷ کدام یک از گزینه‌های زیر تعریف درستی از «انحلال پذیری» را بیان می کند؟

- ۱) کمترین مقدار حل شونده که در دمای معین در ۱۰۰ گرم محلول حل می شود.
- ۲) بیشترین مقدار حل شونده که در دمای معین در ۱۰۰ گرم حل حل می شود.
- ۳) مقداری از حل شونده که در دمای معین ۱۰۰ گرم حل حل شده است.
- ۴) بیشترین مقدار حل شونده که در مقداری حل حل می شود.

۲۵۸ آب کرده را می توان شامل اقیانوس‌ها و منابع غیراقیانوسی دانست. در میان منابع غیراقیانوسی کدام یک از موارد زیر، بیشترین سهم را دارد؟

- ۱) کوه‌های یخ
- ۲) نهرها و جوی‌ها
- ۳) بخار آب موجود در هوا
- ۴) آب شیرین و شور دریاچه‌ها

۲۵۹ همه گزینه‌های زیر درست است، به جز

- ۱) بیشتر آب‌های روی زمین شور است و نمی توان از آنها در کشاورزی، مصارف خانگی و صنعتی استفاده کرد.
- ۲) در برخی آب‌های آشامیدنی مقدار یون‌های حل شده به قدری زیاد است که مزء آب را تغییر می دهد.
- ۳) تفاوت آب آشامیدنی و دیگر آب‌ها در نوع و مقدار حل شونده‌های آن‌ها است.
- ۴) یون SO_4^{2-} برخلاف یون NH_4^+ یون چند اتمی است.

۲۶۰ چه تعداد از عبارت‌های زیر در مورد هیدروژن سولفید صحیح است؟

$$(S = 32, O = 16, H = 1 : g \cdot mol^{-1})$$

الف) فرمول شیمیایی آن H_2S است و حالت فیزیکی آن در دمای اتاق مایع می باشد.

ب) جرم مولی آن از آب بیشتر و نقطه جوش آن از آب کمتر است.

پ) برخلاف آب مولکولی ناقطبی است، به همین جهت نیروهای بین مولکولی ضعیف‌تری دارد.

ت) مولکول آن ساختار خطی دارد و گشتاور دوقطبی آن از آب کمتر است.

- ۱) ۱ مورد
- ۲) ۲ مورد
- ۳) ۳ مورد
- ۴) ۴ مورد

۲۶۱ نسبت تعداد آنیون به تعداد کاتیون در کدام گزینه با نسبت تعداد کاتیون به تعداد آنیون در منیزیم هیدروکسید برابر است؟

- ۱) سدیم نیترات
- ۲) آمونیوم کربنات
- ۳) آمونیوم هیدروکسید
- ۴) آهن (II) سولفات



۲۶۲ چه تعداد از عبارت‌های زیر درست است؟

- الف) افزودن مقدار بسیار کمی یون فلوئورید (F^-) به آب آشامیدنی سبب حفظ سلامت دندان‌ها می‌شود.
 ب) می‌توان با افزودن محلول سدیم سولفات به محلول باریم کلرید، شاهد تشکیل رسوبی سفیدرنگ بود.
 پ) هنگام تشکیل برف و باران، تقریباً همه مواد حل شده در آب از آن جدا می‌شوند.
 ت) در آنیون چند اتمی نیترات (NO_3^-) بار منفی متعلق به یکی از اتم‌های اکسیژن است.

۴ مورد

۳ مورد

۲ مورد

۱ مورد

۲۶۳ چه تعداد از مولکول‌های زیر، در میدان الکتریکی جهت گیری می‌کنند؟



۷


۶

۵

۴

- ۲۶۴ ۵ میلی‌لیتر محلول ۱۰ مولار سدیم هیدروکسید را با اضافه کردن آب به حجم ۱۰۰ میلی‌لیتر می‌رسانیم. چند میلی‌لیتر از محلول جدید با $2mL$ درصد جرمی سولفوریک اسید (H_2SO_4) با چگالی $1.4g \cdot mL^{-1}$ به طور کامل واکنش می‌دهد؟

$$(H = 1, O = 16, S = 32 : g \cdot mol^{-1})$$



۴۰


۲۴

۵۶


۶۰

- ۲۶۵ کدام یک از عبارت‌های زیر جمله مقابله را به درستی تکمیل نمی‌کند؟ «فرآیند انحلال سدیم کلرید در آب

برخلاف فرآیند انحلال اتانول در آب»



شکل (۱)



شکل (۲)

۱ یونی است و از انحلال هر مول از این ترکیب، ۲ مول یون آب پوشیده تولید می‌شود.


۲ باعث حفظ ویژگی ساختاری ماده حل شونده در فرآیند انحلال نمی‌شود.

۳ موجب تشکیل نیروی جاذبه یون - دوقطبی بین حللا و حل شونده می‌شود.

۴ باعث تشکیل یون‌های مثبت آپوشیده (شکل ۱) و یون‌های منفی آپوشیده (شکل ۲) می‌شود.

- ۲۶۶ در صورت اضافه کردن چه تعداد از ترکیب‌های زیر به آب در دمای $25^\circ C$ ، نیروی جاذبه یون - دوقطبی

بزرگ‌تر یا مساوی میانگین قدرت پیوند یونی در ترکیب و پیوندهای هیدروژنی در آب می‌شود؟



۲

۳

۴

۵



۲۶۷ کدام موارد جمله مقابله درستی کامل می‌کنند؟ «اتانول و استون ..».

(الف) به دلیل ناقطبی بودن، گشتاور دوقطبی آن‌ها در حدود صفر می‌باشد.

(ب) در حلال قطبی مانند آب حل نمی‌شوند.

(پ) به هر نسبتی در آب حل می‌شوند و نمی‌توان محلول سیر شده‌ای از آن‌ها تهیه کرد.

(ت) با وجود آن که ترکیب آلی می‌باشند، در حلال‌های آلی مانند هگزان حل نمی‌شوند.

(الف)، (ب) و (پ) ۲

(پ) ۳

(پ) و (ت) ۲

(الف) و (ب) ۱

۲۶۸ اگر در دمای $C^{\circ} 25$ در ۱۴۴ گرم محلول سیر شده سدیم‌نیترات ۶۹ گرم از این ماده وجود داشته باشد،

همراه با حل کردن ۱۱۵ گرم سدیم‌نیترات در ۵۰ گرم آب در همین دما، گرم ماده حل نشده در ته ظرف

رسوب می‌کند و درصد جرمی سدیم‌نیترات محلول حاصل به تقریب برابر درصد است.

۴۷,۹۲ - ۶۹ ۲

۴۷,۹۲ - ۵۱ ۳

۴۶ - ۵۱ ۲

۴۶ - ۶۹ ۱

۲۶۹ چند مورد از مطالعه زیر درست است؟

(الف) در دمای ثابت و شرایط یکسان، انحلال پذیری گاز نیتروژن مونوکسید با افزایش فشار، بیشتر از دو گاز نیتروژن و اکسیژن، افزایش می‌یابد.

(ب) قانون هنری می‌گوید، در فشار ثابت، با کاهش دما، انحلال پذیری گازها، بیشتر می‌شود.

(پ) انحلال پذیری گاز کربن دی‌اکسید بیشتر از گاز نیتروژن مونوکسید است، زیرا مولکول‌های CO_2 ناقطبی هستند.

(ت) با کاهش دما و افزایش فشار، انحلال پذیری گازها در آب افزایش می‌یابد.


۴ مورد ۲

۳ مورد ۳

۲ مورد ۲

۱ مورد ۱

۲۷۰ با توجه به نمودار انحلال پذیری داده شده در دمای ثابت $C^{\circ} 25$ ، گاز A کدام یک از گازهای زیر می‌تواند



$$(N = 14, O = 16, C = 12, Cl = 35,5 : g \cdot mol^{-1})$$

N_2 (b) NO (a)

Cl_2 (d) CO_2 (c)

b, a, **۱** فقط

d, c, a **۳**

www.my-dars.ir

c, b, a **۲**

اطلاعات موجود در چند ردیف از جدول زیر نادرست می‌باشد؟ ۲۷۱

ردیف	حل شونده	حال	توضیحات
۱	آب	اتانول	نیروی جاذبه میان مولکول‌ها در محلول اتانول در آب < میانگین نیروی جاذبه میان مولکول‌های آب خالص و اتانول خالص
۲	$MgSO_4$	آب	نیروی جاذبه یون - دوقطبی در محلول = میانگین قدرت پیوند یونی در $MgSO_4$ و پیوندهای هیدروژنی در آب
۳	هگزان	ید	نیروی جاذبه میان مولکول‌ها در محلول ید در هگزان < میانگین نیروهای جاذبه میان مولکول‌های هگزان خالص و ید خالص
۴	$BaSO_4$	آب	میانگین قدرت پیوند یونی در $BaSO_4$ و پیوندهای هیدروژنی در آب > نیروی جاذبه یون - دوقطبی در محلول

۴ ۲

۳ ۳

۲ ۲

۱ ۱

۲۷۲ دمای ۱۵۰ گرم محلول سیرشده ۱۶,۶۶ درصد جرمی یک نمک را به میزان ۱۰ درجه سلسیوس کاهش می‌دهیم. با تکان دادن محلول، ۵ گرم حل شونده اضافی به شکل بلور ته نشین می‌شود. شب معادله خط تغییرات انحلال پذیری (S) بر حسب دما (C°) برای این نمک به تقریب کدام است؟

۱,۵ ۲

۰,۴ ۳

۰,۸ ۲

۲ ۱

۲۷۳ کدام گزینه درست است؟

۱ $NaCl$ و HF الکترولیت قوی هستند و در آب به طور کامل به یون تفکیک می‌شوند.

۲ محلول هر ترکیبی که الکترولیت قوی باشد، رسانای خوبی برای جریان برق است.

۳ در مخلوط‌های ناهمگن به حالت مایع، اجزای مخلوط به میزان ناچیزی در یکدیگر حل می‌شوند.

۴ در قانون هنری، وابستگی انحلال پذیری گازها به تغییرات دما مورد بررسی قرار می‌گیرد.

www.my-dars.ir

۲۷۴ گشتاور دوقطبی هر دو مولکول در کدام گزینه برابر با صفر است؟

 HF و O_2 ۲ CO_2 و SO_3 ۳ H_2S و CH_4 ۲ H_2O و O_2 ۱

۲۷۵ در کدام گزینه نقطه جوش ترکیب‌های داده شده به درستی مقایسه نشده‌اند؟

 $H_2O > HF > NH_3$ ۲ $HF > HBr > HCl$ ۱ $NH_3 > AsH_3 > HCl$ ۳ $C_2H_5OH > H_2O > H_2S$ ۳



۲۷۶ همه گزینه‌های زیر نادرست‌اند، به جز

۱ درصد جرمی را با نماد $W/W\%$ نشان می‌دهند که همارز با شمار قسمت‌های حل‌شونده در ۱۰۰ قسمت حلال است.


۲

برای بیان ساده‌تر غلظت محلول‌های بسیار رقیق از کمیتی به نام ppm استفاده می‌شود که نشان می‌دهد در یک کیلوگرم از محلول، چند گرم حل‌شونده وجود دارد.

۳ گلوکومتر، میلی‌گرم‌های گلوکز را در دسی لیتر (dL) از خون نشان می‌دهد.

۴ غلظت مولی محلول ییانگر تعداد مول‌های حل‌شونده در یک لیتر حلال است.

۲۷۷ با توجه به نمودار زیر که نقطه جوش ترکیب‌های هیدروژن‌دار ۳ عنصر اول یکی از گروه‌های دسته P جدول دوره‌ای را نشان می‌دهد، کدام مطلب درست است؟



۱

نمودار مقابل می‌تواند مربوط به ترکیب‌های هیدروژن‌دار عنصرهای گروه ۱۵ جدول دوره‌ای باشد.

۲ بین مولکول‌های هیچ کدام از نمادهای A , B یا C نمی‌تواند پیوند هیدروژنی تشکیل شود.

۳ گشتاور دوقطبی ماده A از ماده B بیشتر است.

۴ در ساختار لوویس ماده B ، یک جفت الکترون ناپیوندی وجود دارد.

۲۷۸ با توجه به جدول زیر، در ۳۸ گرم محلول سیرشده سدیم‌نیترات در دمای $22.5^\circ C$ ، چند گرم سدیم نیترات حل شده است و درصد جرمی محلول سیرشده آن در ۱۰۰ گرم آب در چه دمایی برابر ۵۰ می‌باشد؟ (گزینه‌ها را به ترتیب از راست به چپ بخوانید).

$\theta^\circ(C)$	۰	۱۰	۲۰	۳۰
$S[\frac{gNaNO_3}{100gH_2O}]$	۷۲	۸۰	۸۸	۹۶

۳۲,۵,۳۴,۲ ۲


www.my-dars.ir

۳۵,۳۴,۲ ۲

۳۲,۵,۱۸ ۱



۲۷۹ ۴۵۰ گرم محلول سیرشده پتاسیم کلرید در دمای $75^{\circ}C$ تهیه کرده‌ایم. دمای محلول را به تقریب به چند کلوین برسانیم تا رسوب حاصل با ۱۴۴۰ گرم محلول نیم مولار نقره‌نیترات به طور کامل واکنش دهد؟ (چگالی محلول نقره‌نیترات را $Cl = 35,5, K = 39 : g \cdot mol^{-1}$ در نظر بگیرید)



- ۳۰ ۱
۳۰۳ ۲
۳۳۳ ۳
۶۰ ۴

۲۸۰ مفهوم رد پای آب در کدام گزینه به درستی بیان شده است؟

- ۱ میزان تأثیر آب بر اکوسیستم‌های مختلف
۲ شکل توزیع منابع آب در محیط‌های مختلف
۳ میزان برداشت هر فرد از منابع آب و کاهش آن‌ها
۴ عوارض ناشی از سیل و بارش‌های شدید

۲۸۱ چه تعداد از مخلوط‌های زیر منجر به تشکیل محلول می‌شود؟

«استون و آب، هگزان و آب، ید و هگزان»

- ۱ صفر ۲ ۳ ۴ ۵

۲۸۲ کدام گزینه درست است؟

- ۱ محیط شیمیایی مناسب برای ایجاد و برقراری جریان الکتریکی در بدن، یک محلول آبی محتوی مولکول‌های زیستی گوناگون است.
۲ نیاز روزانه بدن هر فرد بالغ به یون سدیم دو برابر یون پتاسیم است.
۳ از آنجا که بیشتر مواد غذایی حاوی یون پتاسیم است، کمبود آن به ندرت احساس می‌شود.
۴ اختلال در حرکت یون‌های کلسیم مانع از انتقال پیام‌های عصبی و گاهی در موارد شدید منجر به مرگ می‌شود.

۲۸۳ چه تعداد از موارد زیر درست است؟

- الف) از کلسیم سولفات برای گچ گرفتن شکستگی‌ها استفاده می‌شود.
ب) آب تصفیه شده به روش نقطیر، پیش از مصرف نیازی به کلرزنی ندارد.
پ) هنگامی که خیار را درون آب شور قرار دهیم، متورم می‌شود.
ت) رد پای آب برای تولید یک کیلوگرم چرم بیشتر از رد پای آب برای تولید یک کیلوگرم گوجه‌فرنگی است.

- ۱ مورد ۲ مورد ۳ مورد ۴ مورد



غلظت يون کلرید (Cl^-) در يك نمونه آب دريا برابر با 80 ppm است. در 1 لیتر از اين نمونه آب دريا

با چگالی $\frac{g}{mL} = 1,25$ چند گرم يون کلرید وجود دارد؟

۱۰۰۰

۱۰۰

۸۰۰

۸۰

موارد (الف)، (ب)، (پ) و (ت) در جدول زير به ترتيب در کدام گزينه به درستي آمده اند؟

فرمول شيمياي	نام تركيب	تعداد يون توليد شده از انحلال هر واحد در آب
الف	آمونيوم هيدروکسید
C_2H_5OH	ب
.....	پ	پ
.....	ت	ت

۱ - دو - ليتيم كربنات - كلسيم نيترات

۲ - صفر - آهن (II) هيدروکسید - پتاسيم اكسيد

۳ - صفر - سدیم فسفات - باریم هیدروکسید

۴ - مس (II) نيترات - سدیم برمید

در $2 \text{ لیتر آب } C_{25^{\circ}} = 0,338 \text{ مول}$ از نمکی با جرم مولی 136 گرم بر مول حل شده است. اين نمک ماده

ای است زيرا انحلال پذيری آن به تقریب گرم در 100 گرم آب می باشد.

$$(d_{H_2O} = 1 \text{ g} \cdot mL^{-1})$$

۱ کم محلول - $0,23^{\circ}$ ۲ محلول - $0,46^{\circ}$ ۳ محلول - $4,6^{\circ}$ ۴ محلول - $4,6^{\circ}$

کدام موارد از مطالب زير نادرست است؟ ($C = 12, O = 16 \text{ g} \cdot mol^{-1}$)

(الف) برای بيان غلظت محلول های بسيار رقيق از ppm استفاده می کنند.

(ب) در يك کيلوگرم از يك نمونه ناخالص آب که غلظت يون فلوئوريد در آن 25 ppm است، $2,5 \text{ ميلي گرم}$ يون فلوئوريد وجود دارد.

(پ) درصد جرمی محلول 40 ppm از گاز NO در هوا برابر با 40% می باشد.

(ت) غلظت گاز CO در هواي شهری که در هر کيلوگرم از آن 100 ppm مول از اين گاز در آن وجود دارد، برابر

280 ppm می باشد.

۱ پ، ت

۲ الف، ب، ت

۳ ب، ت

۴ الف، ب

۲۸۸ عبارت کدام گزینه صحیح نمی‌باشد؟

۱ محلول دو مولار اتانول رسانایی الکتریکی کم تری نسبت به محلول یک مولار HF دارد.

۲ محلول یک مولار پتابسیم بر مید، رسانایی الکتریکی کم تری نسبت به محلول یک مولار آمونیوم کربنات است.


۳ سدیم کلرید مذاب رسانای یونی جریان برق است.

۴ هر چه تعداد ذرات حل شونده در یک محلول بیشتر باشد، رسانایی الکتریکی آن محلول بیشتر است.

۲۸۹ با توجه به شکل زیر در یک طرف غشاء مقدار ۲۰۰ میلی لیتر محلول حاوی ۸,۵ g سدیم نیترات و در سمت

دیگر غشاء ۵,۸۵ گرم سدیم کلرید در داخل ۱۰۰ میلی لیتر محلول موجود است. پس از گذشت مدت زمان معینی

کدام نتیجه‌گیری نادرست است؟ (یون‌ها از غشاء از عبور نمی‌کنند).



$$(Na = 23, Cl = 35,5, N = 14, O = 16 \text{ g} \cdot mol^{-1})$$

۱ مولکول‌های آب از ظرف (۱) به سوی ظرف (۲) حرکت می‌کنند.

۲ غلظت یون Na^+ در ظرف (۱) به مرور افزایش می‌یابد.

۳ مقدار مول آنیون (NO_3^-) در ظرف (۱) تقریباً ثابت می‌ماند.

۴ در انتهای فرایند، آب یک طرف به طور کامل به طرف دیگر منتقل می‌شود.

۲۹۰ در کدام محلول جرم حل شونده‌ای که به طور کامل در حلال حل شده است، بیشتر از سایر محلول‌ها است؟ (

$$(Na = 23, O = 16, H = 1 \text{ g} \cdot mol^{-1})$$

۱ ۱۰۰ گرم محلول ۲۵ درصد جرمی سدیم کلرید

۲ ۴۰ گرم محلول شکر با انجلال پذیری ۲۵ گرم در ۱۰۰ گرم حلal

۳ ۲ گرم محلول 25 ppm یون فلوئورید

۴ ۱۰ گرم محلول 1 M مولار $NaOH$ با چگالی $1,25 \text{ g} \cdot mL^{-1}$

ماهی درس

گروه آموزشی عصر

www.my-dars.ir




پاسخنامه شرطی

۱ ۲ ۳ ۴

$$M = \frac{10ad}{\text{جرم مولی} M} \Rightarrow \frac{10 \times 49 \times 1,25}{98} = 6,25 \text{ mol} \cdot L^{-1}$$

(مولاریته)

۱ ۲ ۳ ۴



$$= 6,72 \text{ mol} \cdot L^{-1} \times \frac{1 \text{ mol} Cl_2}{22,4 \text{ mol} Cl_2} \times \frac{4 \text{ mol} HCl}{1 \text{ mol} Cl_2} \times \frac{36,5 \text{ g} HCl}{1 \text{ mol} HCl} \times \frac{100 \text{ g} HCl}{14,6 \text{ g} HCl} \times \frac{1 \text{ mol} HCl}{1 \text{ g} HCl} = 300 \text{ mol} HCl$$

۱ ۲ ۳ ۴

$$M = \frac{n}{V} \Rightarrow 0,3 = \frac{n}{0,400 \text{ L}} \Rightarrow n = 0,12 \text{ mol} \Rightarrow 0,12 \text{ mol} \times \frac{58,5 \text{ g}}{1 \text{ mol}} = 7,02 \text{ g}$$

وقتی با افزایش دما، به جای افزایش انحلال پذیری، میزان انحلال پذیری کاهش یابد به عبارتی افزایش دما موجب فراسیرشدن محلول شود نتیجه می‌گیریم انحلال گرماده است. از بین ترکیب‌های داده شده فقط انحلال $NaOH$ در آب گرماده است. نکته: اگر با افزایش دما محلولی از حالت سیرشده (اشباع) به حالت فراسیرشده (فوق اشباع) بررسد آن انحلال گرماده است.

۱ ۲ ۳ ۴ ۵

$$n = \frac{m}{M} \quad \text{مول} \quad \text{گرم} \\ \text{جرم مولی}$$

ما درس

۱ ۲ ۳ ۴ ۶

توجه:

$$\frac{\frac{m}{M}}{\frac{V}{V'}} = \frac{\frac{m}{M}}{\frac{V'}{V}} \Rightarrow 0,5 = \frac{56}{V'} \Rightarrow \frac{m}{V'} = 0,5 \times 56$$

$$\frac{\frac{m'}{M'}}{\frac{V'}{V'}} = \frac{\frac{m'}{M'}}{\frac{V'}{V}} = \frac{m'}{V'} = \frac{m}{V} = 0,5 \times 56 \Rightarrow 0,7 \text{ mol} \cdot L^{-1}$$

مولاریته: برای سدیم هیدروکسید

۱ ۲ ۳ ۴ ۷

$$\frac{\text{جرم حل شونده}}{\text{جرم محلول}} \times 100 = \text{درصد جرمی}$$

$$20 = \frac{xg NaCl}{29,25g} \times 100 \Rightarrow x = 5,85g NaCl$$

$$\Rightarrow ?mol_{NaCl} = 5,85g NaCl \times \frac{1 \text{ mol}}{58,5 \text{ g} NaCl} = 0,1 \text{ mol}$$


$$M = \frac{n}{v}$$

$$0,2 \text{ mol} \cdot L^{-1} = \frac{n}{\frac{500}{1000} L} \Rightarrow n = 0,1 \text{ mol Al(NO}_3)_3$$

چون هر مول از $\text{Al(NO}_3)_3$, دارای سه مول یون NO_3^- است پس ۰,۳ مول یون NO_3^- داریم.

مطابق شکل از افزودن دو محلول نقره نیترات و سدیم کلرید به یکدیگر علاوه بر تشکیل محلول سدیم نیترات، رسوب سفید رنگ نقره کلرید $\text{AgCl}(s)$ نیز تشکیل می‌شود.

روش اول: ۱ ۲ ۳ ۴ ۱۰ ضریب تبدیل واحد



$$\text{?gFe(OH)}_2 = 200 \text{ mL} \times \frac{1 \text{ L}}{1000 \text{ mL}} \times \frac{0,1 \text{ mol NaOH}}{1 \text{ L}} \times \frac{1 \text{ mol Fe(OH)}_2}{2 \text{ mol NaOH}} \times \frac{90 \text{ g Fe(OH)}_2}{1 \text{ mol Fe(OH)}_2} = 0,9 \text{ g Fe(OH)}_2$$

روش دوم:

$$\text{?mol NaOH} \Rightarrow M = \frac{n(\text{مول})}{v(\text{لیتر})} \Rightarrow 0,1 = \frac{x_{\text{mol}}}{0,2 \text{ L}} \Rightarrow x = 0,02 \text{ mol NaOH}$$

$$\text{?gFe(OH)}_2 = 0,02 \text{ mol NaOH} \times \frac{1 \text{ mol Fe(OH)}_2}{2 \text{ mol NaOH}} \times \frac{90 \text{ g Fe(OH)}_2}{1 \text{ mol Fe(OH)}_2} = 0,9 \text{ g Fe(OH)}_2$$

روش اول: ۱ ۲ ۳ ۴ ۱۱

$$\left. \begin{array}{l} \text{درصد جرمی بدون در نظر گرفتن عدد ۱۰۰} \\ \text{چگالی بر حسب } \frac{g}{mL} \\ \text{غلظت مولار } C_M \\ \text{جرم مولی } = M \end{array} \right\} \text{با استفاده از فرمول تستی } C_M = \frac{10ad}{M}$$


$$C_M = \frac{10 \times 34 \times 0,98}{17} = 19,6 \frac{\text{mol}}{\text{L}} \Rightarrow 19,6 \frac{\text{mol}}{\text{L}} \times \frac{1 \text{ L}}{1000 \text{ mL}} \times 25 \text{ mL} = 0,49 \text{ mol NH}_3$$

روش دوم:

$$25 \text{ mL NH}_3 \times \frac{0,98 \text{ g NH}_3}{1 \text{ mL NH}_3} \times \frac{34 \text{ g NH}_3}{100 \text{ g NH}_3} \times \frac{1 \text{ mol NH}_3}{17 \text{ g NH}_3} = 0,49 \text{ mol NH}_3$$

$$\text{مول حل شونده} = \frac{0,49 \text{ mol}}{0,025 \text{ L}} = 19,6 M \quad \text{مولاریته}$$

واکنش موازن شده‌ی این محلول‌ها به صورت زیر است: ۱ ۲ ۳ ۴ ۱۲



NaCl محلول بی رنگ فرآورده است.

۱. ب) $C\text{a}_3(\text{PO}_4)_2$ نسبت تعداد کاتیون‌ها به آئیون‌ها $\frac{3}{2}$ است.

۲) ۷ اختلاف مجموع ضرایب استوکیومتری فرآورده‌ها با واکنش دهنده‌ها برابر ۲ می‌باشد.



ت) کاتیون Ca^{2+} موجود در رسوب نیز در آهک CaO یافت می‌شود.

۱۳) اگر حجم‌های برابری از آب دریا و آب مقطر را در کنار یک غشای نیمه تراوا قرار دهیم، با اعمال یک فشار خارجی آب از محلول غلیظتر (آب دریا) وارد محلول رقیق‌تر می‌شود (اسمز معکوس) که در آن به تدریج حجم آب مقطر بیش‌تر و حجم آب دریا کاسته می‌شود از غشای نیمه تراوا یون‌های سدیم و کلرید عبور نکرده و به تدریج آب دریا غلیظ‌تر می‌شود.

۱۴) در فرآیند شیرینی کردن آب شور با استفاده از اسمز معکوس، آب دریا که حاوی یون‌های متفاوتی است را از بالای دستگاه وارد کرده، با ایجاد فشار توسط پمپ، آب از غشای نیمه تراوا عبور کرده و با باقی ماندن یون‌ها در آب دریا، به تدریج این محلول غلیظ‌تر می‌شود. بازگرداندن آب دریای باقی‌مانده به محیط زیست چندان مناسب نمی‌باشد زیرا بیش از حد یون داشته و مقدار این یون‌ها طبیعت را به هم می‌ربزد.

توجه: این فرآیند (اسمز معکوس) بازده بالایی دارد.

۱۵) همه‌ی عبارت‌های داده شده درست‌اند.

* با توجه به اینکه تراکم مولکول‌های آب در سمت راست غشاء کم‌تر است، مولکول‌های آب بیش‌تر به سمت چپ جابه‌جا شده (رقیق به غلیظ) و در نتیجه به مرور زمان حجم آب در سمت راست غشا کاهش می‌یابد.

* غشای نیمه تراوا (C) از عبور مولکول‌های درشتی مانند B جلوگیری می‌کند با توجه به اینکه مولکول‌های آب می‌توانند به سمت چپ جابه‌جا شوند تراکم مولکول‌های آب در سمت چپ بیش‌تر شده و در نتیجه غلظت مولکول‌های درشت با گذشت زمان کاهش می‌یابد.

* دیواره‌ی سلولی در گیاهان می‌تواند به عنوان یک غشای نیمه تراوا عمل کند.

* با توجه به شکل داده شده ذره‌ی A از سمت سر منفی مولکول‌های آب (اتم‌های O) احاطه شده است، بنابراین ذره‌ی A باید یک کاتیون باشد که با راکتیریکی آن با راکتیریکی آمونیم (NH_4^+) مشابه است.

۱۶) عبارت‌های (آ) و (ت) درست‌اند. بررسی عبارت‌های نادرست:

ب) آب بدست آمده از تصفیه با روش اسمز معکوس و صافی کریں آلاندیه یکسانی دارند. (میکروپ‌ها)

پ) آب بدست آمده از هر سه روش تصفیه‌ی آب حاوی میکروپ‌ها بوده و نیاز به کلرزنی دارند.

۱۷) فقط گزینه‌ی (۴) نادرست است. زیرا:

آب آشامیدنی را می‌توان از تصفیه آب رودها، دریاچه‌ها و چاه‌ها تهیه کرد.

۱۸) عبارت‌های (پ) و (ت) صحیح‌اند. بررسی موارد:

(آ) با عبور جریان برق از درون آب و انجام واکنش شیمیایی نمی‌توان میزان یون‌های موجود در آب را به درستی نشان داد.

(ب) این شکل مربوط به فرآیند تقطیر خورشیدی است که با انجام دو واکنش فیزیکی (تبخیر و میغان) آبی حاصل می‌شود که دارای ترکیب‌های آلی فرار و میکروب است و با کلرزنی آن، میکروب‌ها از بین می‌رونند ولی ترکیبات آلی فرار باقی می‌مانند. بنابراین آب حاصل بدون آلدگی نمی‌باشد.

(پ) با عبور آب از صافی کرین، تمام آلدگی‌ها به جز میکروب‌ها از آب جدا می‌شوند، که با کلرزنی میکروب‌های باقی‌مانده نیز از بین می‌رونند. در نتیجه آب کاملاً تصفیه شده حاصل می‌شود.

ت) در روش اسمز معکوس با اعمال فشار، مولکول‌های آب از محیط غلیظ به رقیق منتقل می‌شوند. بنابراین با گذشت زمان تعداد مولکول‌های آب در محیط رقیق بیش‌تر می‌شوند.

۱۹) فقط نام و فرمول شیمیایی آمونیوم یید "NH₄I" درست نوشته شده است.

جدول درست و کامل سؤال به صورت زیر است:

فرمول شیمیایی	نام ترکیب	فرمول شیمیایی	نام ترکیب
$FeSO_4$	آهن (II) سولفات	$CuNO_3$	مس (I) نیترات
$AlPO_4$	آلومینیم فسفات	$Mg(OH)_2$	منیزیم هیدروکسید
$ZnCO_3$	روی کربنات	NH_4I	آمونیوم یید



۱ ۲ ۳ ۴ ۲۰

گلاب محلوطی همگن از چند ماده‌ی آبی در آب است.

۱ ۲ ۳ ۴ ۲۱

$$KNO_3 = 39 + 14 + (3 \times 16) = 101 \text{ g} \cdot mol^{-1}$$

$$\frac{1}{d_{\text{چگالی}}} = \frac{\frac{g}{m}}{V} \Rightarrow \frac{250 \text{ ml}}{\text{ محلول}} = \frac{250 \text{ g}}{\text{ محلول}}$$

$$ppm = \frac{\text{گرم جرم حل شونده}}{\text{گرم محلول}} \times 10^6 \Rightarrow 220 = \frac{x_{g_{KNO_3}}}{250 \text{ g}} \times 10^6 \Rightarrow x = 5,05 \times 10^{-2} \text{ g}$$

$$?mol_{KNO_3} = 5,05 \times 10^{-2} \text{ g}_{KNO_3} \times \frac{1 \text{ mol}_{KNO_3}}{101 \text{ g}_{KNO_3}} = 5 \times 10^{-4} \text{ mol}_{KNO_3}$$

۱ ۲ ۳ ۴ ۲۲

$$CaBr_2 = 40 + (2 \times 80) = 200 \text{ g} \cdot mol^{-1}$$

توجه داشته باشید که محلول ۱ مولار کلسیم بر میبد دارای ۱ مول نمک در یک لیتر محلول است. (یک لیتر = ۱۰۰۰ میلی لیتر)
ابتدا جرم ۱ مول نمک را به دست می‌آوریم:

$$?g_{CaBr_2} = 1,5 \text{ mol}_{CaBr_2} \times \frac{200 \text{ g}_{CaBr_2}}{1 \text{ mol}_{CaBr_2}} = 300 \text{ g}_{CaBr_2}$$

$$\text{ محلول} = \frac{g}{ml} \times \frac{1000 \text{ ml}}{L} \times L = 1500 \text{ g}$$

$$\frac{\text{ جرم حل شونده}}{\text{ جرم محلول}} \times 100 = \frac{300 \text{ g}}{1500 \text{ g}} \times 100 = \%20$$

۱ ۲ ۳ ۴ ۲۳

$$\begin{aligned} & \text{ محلول اولیه (غایظ)} \\ & \left\{ \begin{array}{l} 75 \text{ mL} \\ 0,4 \frac{\text{ mol}}{\text{ L}} \end{array} \right. \quad \text{ حجم آب} = ? \text{ mL} \\ & \text{ محلول (رقیق)} \\ & \left\{ \begin{array}{l} ? \text{ mol} \\ 0,03 \frac{\text{ mol}}{\text{ L}} \end{array} \right. \\ & \text{ مول حل شونده} = \frac{x_{\text{ mol}}}{L} \Rightarrow 0,4 = \frac{x_{\text{ mol}}}{75 \times 10^{-3} \text{ L}} \Rightarrow x = 3 \times 10^{-2} \text{ mol}_{Na_3PO_4} \end{aligned}$$

با افزودن آب به محلول غایظ و تشکیل محلول رقیق مقدار حل شونده ثابت است و تغییر نمی‌کند پس مول‌ها برابرند. و فقط حجم آب را زیاد می‌کنیم.

$$\frac{\text{ مول حل شونده}}{\text{ لیتر محلول}} = \frac{3 \times 10^{-2} \text{ mol}}{x_L} \Rightarrow 0,03 = \frac{3 \times 10^{-2} \text{ mol}}{x_L} \Rightarrow x = 1 \text{ L}$$

$$1 \text{ L} = 1000 \text{ ml} \Rightarrow \text{ حجم آب اضافه شده} + \text{ حجم اولیه} = \text{ حجم کل محلول} \Rightarrow 1000 \text{ ml} = 75 \text{ ml} + x$$

$$\Rightarrow x = 925 \text{ ml}$$

هر گاه یک محلول حاوی یون در مدار الکتریکی قرار بگیرد، جریان برق در مدار برقرار می‌شود، زیرا

۱ ۲ ۳ ۴ ۲۴



يون ها به سوي قطب های ناهمنام حرکت می کنند. در نمک خوراکی $NaCl(aq)$ به سوي قطب منفی (اتم های O) و يون های Cl^- به سوي قطب مثبت (اتم های H) حرکت می کنند.

۲۵ در فلزها و گرافیت رسانایی به وسیله الکترون ها انجام می شود و به آن ها رسانای الکترونی می گویند پس مس و گرافیت رسانای الکترونی هستند.

** سدیم کلرید ترکیب يوني رسانای يوني دارد.



۲۶ اگرچه در تمامی محلول های يوني در آب، ترکیب يوني به يون های سازنده تفکیک می شوند اما چون میزان انحلال پذیری متفاوتی دارند پس تعداد يون های برابر حاصل نمی شود و رسانایی یکسانی ندارند.

۲۷ $HCl*$ (اسید قوی) و Li_2SO_4 (نمک) هر دو در آب يوني حل می شوند و الکتروولیت قوی و رسانای خوب جريان برق هستند.

** CH_3OH (الکل) در آب کاملاً مولکولی حل می شود، غیر الکتروولیت و نارسانا است.

توجه:

** $AgCl$: ترکیب يوني و الکتروولیت قوی است ولی نقره کلرید نامحلول در آب است (رسوب سفیدرنگ) بنابراین با آن که الکتروولیت قوی است ولی رسانای خوب جريان برق نمی باشد.

۲۸ موارد (ب)، (ت) و (ث) صحیح اند.

بررسی عبارت های نادرست:

(آ) با افزایش دما، انحلال پذیری اکسیژن به صورت غیرخطی کاهش می یابد.

(پ) انحلال پذیری گاز اکسیژن در آب دریا کمتر از آب آشامیدنی است و علت آن وجود نمک ها در آب دریا است.

۲۹ با انحلال قرص جوشان در آب، گاز CO_2 تولید می شود و در آب گرم انحلال پذیری گاز در آب کم می شود و به دلیل کاهش انحلال پذیری، مقدار بیشتری از آن از آب خارج شده و آزاد می شود.

۳۰ عبارت های (ب)، (پ) و (ت) درست اند.

(آ) در دمای $5^\circ C$ انحلال پذیری گاز اکسیژن در آب حدود 9% میلی گرم است.

(ب) با افزودن مقداری نمک به آب دریا، انحلال پذیری گاز اکسیژن کاهش می یابد زیرا نیروی جاذبه یون-دوقطی بین یون های نمک و آب قوی تر از نیروی جاذبه بین مولکول های اکسیژن و آب دریا است.

(پ) با توجه به نمودار در تمام دمای انحلال پذیری گاز اکسیژن در آب آشامیدنی بیش تر از آب دریا است.

(ت) چون شبیب دو نمودار تقریباً یکسان است. بنابراین تأثیر دما بر انحلال پذیری گاز اکسیژن در آب آشامیدنی و آب دریا تقریباً یکسان است.

۳۱ چون انحلال پذیری گاز اکسیژن را در این شرایط خواسته است پس باید گرم اکسیژن (حل شونده) را در 100 گرم آب محاسبه کنیم و خواهیم داشت:

$$?g_{O_2} = \frac{0,056L}{2000g} \times \frac{1mol}{22,4L} \times \frac{32g}{1mol} = 4 \times 10^{-3} g_{(O_2)}$$

۳۲ ابتدا انحلال پذیری گاز اکسیژن (حل شونده) در 100 گرم آب را تعیین می کنیم:

$$?g_{O_2} = \frac{0,035g_{O_2}}{500g} = 7 \times 10^{-3} g_{O_2}$$

پس انحلال پذیری گاز O_2 در دمای $15^\circ C$ و فشار 2 اتمسفر برابر 7×10^{-3} گرم است و در دمای ثابت فشار گاز از 1 اتمسفر به 5



اتمسفر رسیده است یعنی فشار ۲,۵ برابر شده و طبق قانون هنری فشار گاز با انحلال پذیری آن رابطه‌ی مستقیم دارد پس انحلال پذیری گاز اکسیژن نیز ۲,۵ برابر می‌شود.

$$7 \times 10^{-3} g_{O_2} \times 2,5 = 1,75 \times 10^{-3} g_{O_2}$$

چون انحلال پذیری Cl_2 در آب در دمای $20^\circ C$ و $53^\circ C$ به ترتیب تقریباً برابر $73,0$ و $375,0$ گرم در 100 گرم آب است، پس اگر 100 گرم آب سیر شده از گاز کلر در دمای $20^\circ C$ را تا $53^\circ C$ گرم کنیم افزایش دما انحلال گاز را در آب کاهش می‌دهد و به مقدار $355g - 375g = 20,0$ گاز کلر خارج می‌شود و حالا برای 2 کیلوگرم آب سیر شده، مقدار گاز خارج شده (آزاد شده) بر حسب لیتر در شرایط STP برابر است با:

$$?L_{Cl_2} = 2 kg_{\text{آب}} \times \frac{1000 g_{\text{آب}}}{1 kg_{\text{آب}}} \times \frac{0,355 g_{Cl_2}}{100 g_{\text{آب}}} \times \frac{1 mol_{Cl_2}}{71 g_{Cl_2}} \times \frac{22,4 L_{Cl_2}}{1 mol_{Cl_2}} = 2,24 L_{Cl_2}$$

و برای مقدار گرم گاز کلر باقی‌مانده در محلول می‌نویسیم:

$$(حل شده) \Rightarrow 5g_{Cl_2} \times \frac{0,375 g_{Cl_2}}{100 g_{\text{آب}}} \times \frac{1000 g_{\text{آب}}}{1 kg_{\text{آب}}} = 2 kg_{\text{آب}} \times \frac{0,375 g_{Cl_2}}{100 g_{53^\circ C}}$$

۱۴۱ اتانول و استون به هر نسبتی در آب حل می‌شوند به همین دلیل نمی‌توان محلول سیر شده‌ای از آن‌ها تهیه کرد.

۱۴۲ فقط (ب) درست است. بررسی سایر موارد:





۱۴۳ آبنزین یک ماده خالص یا یک ماده‌ی ساده نیست بلکه مخلوطی از هیدروکربن‌های مختلف با 5 تا 12 اتم کربن است. که به طور میانگین بنزین را با 8 اتم کربن و با فرمول C_8H_{18} در نظر می‌گیرند.

۱۴۴ پ) در این گونه مخلوط‌ها اجزای مخلوط به میزان ناچیزی در یکدیگر حل می‌شوند اما قابل چشم پوشی است.

۱۴۵ ت) بیشتر از نیمی از آب بدن درون یاخته‌ها قرار دارد.

۱۴۶ ۱ در انحلال یونی ماده حل شونده به یون‌هایی با بار ناهم‌نام تبدیل می‌شود. مانند: سدیم کلرید (Na^+, Cl^-)

۱۴۷ * ترکیب CO_2 (نافلز با نافلز) یک ترکیب مولکولی است و دارای پیوند کووالانسی است پس انحلال یونی ندارد.



www.my-dars.ir

۱۴۸

میانگین پیوندهای هیدروژنی در آب و پیوند یونی باریم سولفات \leq نیروی جاذبه یون – دوقطبی (محلول)

در آب نامحلول است ($BaSO_4$ سفیدرنگ)





۱۴۹ ۱ حل جزیی از یک محلول است که حل شونده را در خود حل کرده و مقدار مول بیشتری دارد.

$$?mol_{C_2H_5OH} = 100 g \times \frac{1 mol}{46 g} = 1,73 mol_{C_2H_5OH}$$

$$?mol_{H_2O} = 40 g \times \frac{1 mol}{18 g} = 2,2 mol_{H_2O} \Rightarrow 2,2 mol_{H_2O} \text{ دارد}$$



باتوجه به شکل کاتیون دارای بار (+) و آنیون دارای بار (-) می باشد.



و گزینه ۳ صحیح است.

۴۱) **مخلوط های همگن:**

- استون در آب: قطبی در قطبی حل می شود.

- ید در کربن تراکلرید (CCl_4 در I_2): هر دو مولکول ناقطبی اند و ناقطبی در ناقطبی حل می شود.

مخلوط های ناهمگن:

- آب قطبی و بنزین ناقطبی پس بنزین ناقطبی در آب حل نمی شود.

- نمک طعام ($NaCl$) ترکیب یونی در حلال قطبی مانند آب حل می شود پس در هگزان ناقطبی حل نمی شود.

- اتانول (C_2H_5OH) قطبی در هگزان (C_6H_6) ناقطبی حل نمی شود.

چون جرم حل شونده خالص را نیاز داریم ابتدا مقدار ماده خالص را تعیین می کنیم:

$$\frac{80g_{\text{خالص}}}{100g_{\text{خالص}}} = 1,5g_{\text{خالص}} \times \frac{1,2g_{\text{NaOH}}}{100g_{\text{خالص}}} = 1,2g_{\text{NaOH}} \quad (\text{حل شونده خالص})$$

در پایان تست عنوان شده که ناخالصی ها در آب حل می شوند پس جرم حل شونده را باید ۱ گرم در نظر بگیریم:

$$\frac{\text{جرم حل شونده}}{\text{جرم محلول}} \times 100 = \frac{1,2g_{\text{حل شونده}}}{45g_{\text{ محلول}}} \times 100 = \% 2,67$$

↓
جرم حل شونده + جرم حل
۴۳,۵ + ۱,۵ = ۴۵g

۴۲) در یک محلول، حلال جزئی است که دارای مول بیش تری باشد، پس در هر محلول، مول هر ماده را محاسبه می کنیم:

$$\text{محلول (۱)} \left\{ \begin{array}{l} ?molH_2O = 18gH_2O \times \frac{1molH_2O}{18gH_2O} = 1molH_2O \\ ?molCH_3OH = 16gCH_3OH \times \frac{1molCH_3OH}{32gCH_3OH} = 0,5molCH_3OH \end{array} \right.$$

$\Rightarrow molH_2O > molCH_3OH \Rightarrow$ آب حلal است

$$\text{محلول (۲)} \left\{ \begin{array}{l} ?molH_2O = 18gH_2O \times \frac{1molH_2O}{18gH_2O} = 0,5molH_2O \\ ?molCH_3OH = 16gCH_3OH \times \frac{1molCH_3OH}{32gCH_3OH} = 0,5molCH_3OH \end{array} \right.$$

$\Rightarrow molCH_3OH > molH_2O \Rightarrow$ CH_3OH حلal است

۴۳) این شکل در کتاب درسی نشان دهنده اتحلال اتانول در آب است. (قطبی در قطبی حل می شود) و اتانول ترکیب



خ

دیجه


جباری

مولکولی در آب دارای انحلال مولکولی است و مولکولهای اتانول (حل شونده) ماهیت خود را در محلول حفظ می‌کنند و با جاذبه هیدروژنی در آب حل می‌شوند.





اتانول - اتانول > آب - آب < قدرت جاذبه هیدروژنی در محلول اتانول و آب
 └──┘
 └──┘
 حل شونده (خالص) خالص (حلال)

انحلال استون در آب (قطبی در قطبی) و یُد در هگزان (ناقطبی در ناقطبی) نیز از نوع مولکولی است پس گزینه‌ی (۳) نیز صحیح است.

۱ ۲ ۳ ۴ ۵ در دمای اتاق و فشار ۱ atm، نیتروژن (N_2) و کربن مونوکسید (CO) گاز هستند و دو ماده‌ی ید (I_2) و برم (Br_2) به ترتیب جامد و مایع هستند و نیروی بین مولکولی در حالت جامد بیشتر از مایع و گاز است پس با آن‌که N_2 , I_2 و Br_2 مولکول ناقطبی‌اند و CO مولکول قطبی است. حالت فیزیکی و جرم مولی زیاد در I_2 و Br_2 باعث افزایش نیروی بین مولکولی در این دو ماده می‌شود و ترتیب نیروی بین مولکولی به صورت زیر است:



۱ ۲ ۳ ۴ ۵ فرآیند تفکیک یونی این نمک‌ها در آب به صورت زیر است:



پس آلومینیم نیترات، تعداد یون بیشتری در آب تولید می‌کند.

۱ ۲ ۳ ۴ ۵ با قرار دادن مولکول‌های آب در یک میدان الکتریکی، آب از سمت اتم‌های هیدروژن ($\delta+$) خود به سمت قطب ناهمنام (منفی) میدان کشیده می‌شود که بیانگر خصلت (قطبی بودن) دوقطبی مولکول آب است و گشتاور دوقطبی آن ۱,۸۵ دبای اندازه‌گیری شده است.

۱ ۲ ۳ ۴ ۵ هر سه مولکول CO_2 , CH_4 و O_2 مولکول‌های ناقطبی هستند و بخش‌های بار مثبت و منفی (δ^+ , δ^-) در آنها وجود ندارد ولی مولکول HCl دارای سرهای جزئی بار مثبت و منفی (H^+ , Cl^-) است و یک مولکول قطبی است.

۱ ۲ ۳ ۴ ۵ مولکول F_2 با اتم‌های یکسان دارای سرهای δ^+ و δ^- نمی‌باشد و یک مولکول ناقطبی است، پس نقطه جوش آن از مولکول قطبی HCl پایین‌تر است و در میدان الکتریکی جهت‌گیری ندارد.

۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ابتدا با قرار دادن دمای $10^\circ C$ و $22.5^\circ C$ ، انحلال پذیری این نمک را در 100 گرم آب به دست می‌آوریم.

$$S = 2\theta + 5 \left\{ \begin{array}{l} \theta = 10^\circ C \\ \theta = 22.5^\circ C \end{array} \right. \begin{array}{l} \xrightarrow{\theta = 10^\circ C} S = (2 \times 10) + 5 = 25 \text{ g} \quad \text{حل شونده } 10^\circ C \\ \xrightarrow{\theta = 22.5^\circ C} S = (2 \times 22.5) + 5 = 50 \text{ g} \quad \text{حل شونده } 22.5^\circ C \end{array}$$

محلول محلول

حال برای هر محلول جهت تعیین غلظت مولی باید مول حل شونده و لیتر محلول را تعیین کنیم:



$$\begin{aligned}
 & \text{محلول اول} \quad \left\{ \begin{array}{l} \theta = 10^\circ C \Rightarrow ?mol_B = 25g_B \times \frac{1mol_B}{70g_B} = \frac{5}{14} mol_B \\ ?L = 125g \times \frac{1cm^3}{1400g} \times \frac{1L}{1000cm^3} = \frac{125}{1400} L \end{array} \right. \\
 & \Rightarrow \frac{\frac{5}{14} mol}{\frac{125}{1400} L} = \frac{4 mol \cdot L^{-1}}{1,75} \\
 & \text{محلول دوم} \quad \left\{ \begin{array}{l} \theta = 22,5^\circ C \Rightarrow ?mol_B = 50g_B \times \frac{1mol_B}{70g_B} = \frac{5}{7} mol_B \\ ?L = 150g \times \frac{1cm^3}{1470g} \times \frac{1L}{1000cm^3} = \frac{150}{1470} L \end{array} \right. \\
 & \Rightarrow \frac{\frac{5}{7} mol}{\frac{150}{1470} L} = \frac{7 mol \cdot L^{-1}}{1,75} = 4 mol \cdot L^{-1}
 \end{aligned}$$

اين مدل فضا پرکن می تواند مربوط به یون های فسفات (PO_4^{3-})، سولفات (SO_4^{2-}) و آمونیم (NH_4^+) باشد ۵۱
پس گزینه‌ی (۲) صحیح است.

هرچه جاذبه‌ی میان مولکول‌های یک ماده قوی‌تر باشد، حالت فیزیکی آن ماده مایع یا جامد خواهد شد و در حالت جامد بیشترین جاذبه‌ی میان مولکول‌ها نسبت به حالت‌های گاز و مایع همان ماده خواهد بود. ۵۲

نکته: $F_r(g)$, $Cl_r(g)$, $Br_r(l)$, $I_r(s)$, $H_rS(g)$

نکته: بین مولکول‌های داده شده هرچه جرم مولی بیشتر، نیروی بین مولکولی قوی‌تر و نقطه‌ی جوش بالاتر است. $Br_r > H_rS$: نقطه جوش مولی زیاد

ی جوش و $I_r > Br_r > Cl_r > F_r$: نقطه‌ی جوش ۵۳

نیروهای بین مولکولی در تعیین حالت فیزیکی و خواص یک ترکیب نقش مهمی دارد. مقدار این نیروها در مواد گازی شکل کم ترین مقدار، در مایع‌ها بیشتر از حالت گازی و در حالت جامد، بالاترین مقدار است. گشتاور دوقطبی در مولکول‌های دوقطبی وجود داشته و باعث افزایش نیروهای بین مولکولی در مقایسه با مولکول‌های ناقطبی مشابه می‌شود. ۵۴

ابتدا معادله‌ی انحلال‌پذیری در نمک را به دست می‌آوریم: ۵۴

www.my-dars.ir

$$A \left\{ \begin{array}{l} S_A = a\theta + b \\ 10 = a(0) + b \Rightarrow b = 10 \\ 15 = a(10) + 10 \Rightarrow a = 0,5 \end{array} \right. \Rightarrow S_A = 0,5\theta + 10$$

$$B \left\{ \begin{array}{l} S_B = a\theta + b \\ 35 = a(0) + b \Rightarrow b = 35 \\ 37 = a(10) + 35 \Rightarrow a = 0,2 \end{array} \right. \Rightarrow S_B = 0,2\theta + 35$$

بررسی گزینه‌های:

گزینه‌ی (۱): اثر دما بر انحلال‌پذیری نمکی بیشتر است که ضریب θ (شیب) بزرگ‌تری دارد پس انحلال‌پذیری نمک A بیشتر است.
گزینه‌ی (۲): دمای $C^{\circ} 90$ را در معادله‌ی هر دو نمک قرار می‌دهیم و S هر نمک بیشتر به دست می‌آید جرم محلول سیر شده‌ی آن نیز بیشتر است.



$$S_A = 0,5(90) + 10 = 55g \quad \text{جرم محلول } A \text{ بيشتر است} \Rightarrow$$

$$S_B = 0,2(90) + 35 = 53g$$

گزينه‌ی (۳): در دماي $C^{\circ} 12$ ، انحلال‌پذيری هر نمک را تعين می‌کنیم:

$$S_A = 0,5(12) + 10 = 16g \Rightarrow ?g = \frac{16g}{\text{حلشونده}} = \frac{16g}{116g} = 0,4g \quad \text{نمک (حلشونده)} \\ \downarrow \quad \text{حلشونده} \quad \text{حلشونده} \\ \text{آب} + 100g = 116g \quad \text{آب} + \text{حلشونده}$$

گزينه‌ی (۴): برای برابر بودن انحلال‌پذيری دو نمک معادله‌ی انحلال هر دو ماده را برابر قرار می‌دهیم تا دما مشخص بشود:

گزينه‌ی (۴) نادرست است.

$$0,5\theta + 10 = 0,2\theta + 35 \Rightarrow \theta = 83,3^{\circ}C$$

55) H_2O و H_2S هر دو مولکول قطبی‌اند ولی میزان قطبیت در آب بيشتر است زیرا H_2S دارای نیروی جاذبه‌ی

بین مولکولی از نوع واندروالسی و آب دارای جاذبه‌ی هیدروژنی است و چون پیوند هیدروژنی از واندروالسی قوی‌تر است.

گشتاور دوقطبی در آب بيشتر و نقطه‌ی جوش بالاتری نسبت به H_2S دارد. ($H_2O > H_2S$: نقطه‌ی جوش)

56) انحلال‌پذيری هر نمک را در 100 گرم آب مشخص می‌کنیم:

$$?g_A = \frac{0,002g}{\text{آب}} = \frac{0,002g}{25g} = 0,008g \Rightarrow 0,008g < 0,01g \Rightarrow \text{نامحلول} \rightarrow 1g$$

$$?g_B = \frac{0,012g}{\text{آب}} = \frac{0,012g}{10g} = 0,012g \Rightarrow 0,012g > 0,01g \Rightarrow \text{ محلول}$$

$$?g_c = \frac{0,005g}{\text{آب}} = \frac{0,005g}{10g} = 0,005g \Rightarrow 0,005g < 0,01g \Rightarrow \text{كم محلول} \rightarrow 1g$$

57) بررسی گزینه‌ها:

۱) هر دو مولکول قطبی‌اند ولی متانول (CH_3OH) با داشتن عامل ($-OH$) دارای نیروی بین مولکولی از نوع هیدروژنی است و نقطه‌ی

جوش بالاتری از CH_3Br با جاذبه‌ی واندروالسی دارد.

۲) با آنکه مولکول NO قطبی و CO_2 ناقطبی است اما CO_2 به دليل داشتن جرم مولی بيشتر، نیروی بین مولکولی قوی‌تری داشته و انحلال‌پذيری آن در آب بيشتر است. ($CO_2 = 44$, $NO = 30$: $g \cdot mol^{-1}$: جرم مولی)


۳) استون مولکول قطبی و هگزان (C_6H_6O) مولکول ناقطبی هستند و گشتاور دوقطبی در هگزان ناقطبی تقریباً برابر صفر است و در استون ($\mu > 0$) پس گشتاور دوقطبی در استون بيشتر است.

۴) آب به علت داشتن نیروی بین مولکولی هیدروژنی و گشتاور دوقطبی بيشتر H_2S ، دارای قطبیت بيشتری است.

58) بررسی گزینه‌ها:

۱) در ترکیب‌های هیدروژن‌دار گروه ۱۷ (هالوژن‌ها) فقط HF دارای نیروی بین مولکولی هیدروژنی است و بقیه جاذبه‌ی واندروالسی دارند. پس نقطه‌ی جوش HF از همه بيشتر است و بین سایرین با افزایش جرم مولی، جاذبه‌ی واندروالسی بيشتر، و نقطه‌ی جوش بالاتر است.

جاذبه‌ی هیدروژنی $\rightarrow HF$




۲) پیوند هیدروژنی در H_2O بيشتر از HF و NH_3 است و نقطه‌ی جوش آن بالاتر است و مولکول ناقطبی CH_4 دارای




نیروی جاذبه‌ی واندروالسی است و نقطه‌ی جوش پایین‌تری دارد: $H_2O > HF > NH_3 > CH_4$

(۳) این گزینه صحیح است. زیرا در گروه ۱۵ برای ترکیب هیدروژن‌دار آنها فقط NH_3 جاذبه‌ی هیدروژنی در بین مولکول‌هایش دارد و در PH_3 و ASH_3 مولکول‌های قطبی با جاذبه‌ی واندروالسی هستند و با افزایش جرم مولی نقطه جوش بالا می‌رود.




(۴) در گروه هالوژن‌ها برای مولکول‌های ناقطبی با جاذبه‌ی واندروالسی هستند هرچه جرم مولی بیشتر نیروی جاذبه واندروالسی قوی‌تر و نقطه جوش بالاتر است.



۱ ۲ ۳ ۴ ۵۹

۱ ۲ ۳ ۴ ۶۰



ابتدا جرم کلسیم سولفات تولید شده را محاسبه می‌کنیم:

$$\text{?} g_{CaSO_4} = 0,615 g_A \times \frac{1 \text{ mol}_A}{164 g_A} \times \frac{1 \text{ mol}_{CaSO_4}}{1 \text{ mol}_A} \times \frac{136 g_{CaSO_4}}{1 \text{ mol}_{CaSO_4}} = 0,51 g_{CaSO_4}$$

تولید شده

در صورت سؤال ۵۰ ۵۰ گرم و ۱۵۰ ۱۵۰ گرم آب داده شده پس مجموعاً ۲۰۰ ۲۰۰ گرم آب موجود است پس گرم کلسیم سولفات را برای ۲۰۰ گرم آب محاسبه می‌کنیم:

$$\text{?} g_{CaSO_4} = 200 g_{\text{آب}} \times \frac{0,51 g_{CaSO_4}}{100 g_{\text{آب}}} = 0,46 g_{CaSO_4}$$


و در آخر چون جرم کلسیم سولفات تولید شده ($0,51 g$) بیشتر از کلسیم سولفات حل شده است ($0,46 g$) پس بقیه‌ی آن به صورت رسوب در می‌آید.

رسوب کلسیم سولفات $g = 0,51 - 0,46 = 0,05$


www.my-dars.ir

(۶۱) ترتیب نقطه‌ی جوش ترکیب هیدروژن‌دار عناصر گروه هفدهم به صورت: $HF > HI > HBr > HCl$ است.


زیرا HF دارای جاذبه‌ی هیدروژنی، نقطه‌ی جوش بالاتری از سه ترکیب دیگر دارد و بین سه مولکول دیگر HI با جرم مولی بیشتر دارای نقطه‌ی جوش بالاتری است. پس خواهیم داشت:




$19,9 - 34,9 - 66,2 - 84,6$: نقطه‌ی جوش



۱ ۲ ۳ ۴ ۶۳ پیوند اشتراکی (کوالانسی) پیوند بین اتم‌ها در یک مولکول است نه پیوند بین یک مولکول با مولکول دیگر.



۱ ۲ ۳ ۴ ۶۴ مولکول آب به دلیل امکان تشکیل پیوند هیدروژنی، نقطه‌ی جوش بالاتری نسبت به بقیه دارد.



۱ ۲ ۳ ۴ ۶۵ عبارت‌های (ب) و (ت) نادرست هستند.

بررسی عبارت‌ها:

- الف) با توجه به شکل چون مولکول‌ها در میدان الکتریکی جهت گیری نکرده‌اند پس ناقطبی‌اند.
- ب) در یک ماده قدرت نیروی بین مولکولی در حالت جامد از سایر حالت‌های فیزیکی بیشتر است.
- پ) هرچه قطبیت مولکول بیشتر باشد، گشتاور دوقطبی بیشتر است.
- ت) در ساختار آب مایع، مولکول‌ها به روی هم می‌لغزند و جایه‌جا می‌شوند اما در ساختار یخ (جامد) مولکول‌ها در جاهای به نسبت ثابت قرار دارند.

۱ ۲ ۳ ۴ ۶۶ فقط عبارت (الف) نادرست است.

- الف) با آنکه هر دو مولکول خمیده (V شکل) و قطبی هستند اما در دمای اتاق ($25^{\circ}C$) آب به حالت مایع ($H_2O(l)$) و هیدروژن سولفید به حالت گاز ($H_2S(g)$) می‌باشد.

** بررسی سایر گزینه‌های درست

- ب) جرم مولی آب و هیدروژن سولفید به ترتیب ۱۸ و ۳۴ گرم بر مول است و می‌توان گفت جرم مولی آب نزدیک به نصف جرم مولی هیدروژن سولفید و یا بر عکس جرم مولی هیدروژن سولفید نزدیک به دو برابر جرم مولی آب است.

پ) دمای جوش آب ($100^{\circ}C$) و هیدروژن سولفید ($60^{\circ}C$) است که تفاوت این دو برابر با $160^{\circ}C$ است.

- ت) آب و هیدروژن سولفید هر دو مولکول قطبی‌اند ولی آب دارای جاذبه‌ی هیدروژنی و هیدروژن سولفید دارای جاذبه‌ی واندروالسی است که چون جاذبه‌ی هیدروژنی قوی‌تر از واندروالسی است، میزان قطبیت مولکول آب و قدرت نیروی بین مولکولی آن نزدیک به دو برابر مولکول هیدروژن سولفید است و گشتاور دوقطبی آب نیز نزدیک به دو برابر هیدروژن سولفید می‌باشد.

ث) به همین دلیل آب در دمای اتاق به صورت مایع است.

۱ ۲ ۳ ۴ ۶۷ ید و هگزان هر دو مولکول ناقطبی با نیروی جاذبه‌ی واندروالسی هستند پس ید در هگزان حل می‌شود و محلول



بنفس رنگ تشکيل می شود هگزان با فرمول مولکولي C_6H_{14} و گشتار دوقطبی تقریباً برابر صفر، حلال مواد ناقطبی و رقیق کننده رنگ (تینر) است.

۱ ۲ ۳ ۴ ۶۸

$$\text{mol}_{NaOH} = 200 \text{ mL} \times \frac{1,2 \text{ g}}{\text{mL}} \times \frac{28 \text{ g}_{NaOH}}{100 \text{ g}} \times \frac{1 \text{ mol}_{NaOH}}{40 \text{ g}_{NaOH}} = 1,68 \text{ mol}_{NaOH} \quad (\text{حل شونده})$$

برای محاسبه جرم آب (حلال) ابتدا جرم حل شونده ($NaOH$) را محاسبه می کنیم:

$$\text{g}_{NaOH} = 1,68 \text{ mol}_{NaOH} \times \frac{40 \text{ g}_{NaOH}}{1 \text{ mol}_{NaOH}} = 67,2 \text{ g}_{NaOH}$$

و حال به کمک حجم و چگالی محلول، جرم محلول را تعیین می کنیم:

$$\text{g}_{\text{محلول}} = 200 \text{ mL} \times \frac{1,2 \text{ g}}{\text{mL}} = 240 \text{ g}_{\text{محلول}}$$

$$\text{جرم حل} + \text{جرم حل شونده} = \text{جرم محلول} \Rightarrow x + 67,2 = 240 \Rightarrow x = 172,8 \text{ g}_{\text{حل}}$$

۶۹ گزینه‌ی (۲) نادرست است، زیرا: طبق خود را بیازمایید صفحه‌ی ۱۱۸ کتاب درسی، در یک لوله‌ی آزمایش هگزان بر سطح آب قرار می‌گیرد پس چگالی آن از آب کم‌تر است.

۷۰ در یک حالت فیزیکی برای مقایسه‌ی نقطه‌ی جوش، چون در آب تعداد پیوند هیدروژنی بیشتر است پس نقطه‌ی جوش بالاتری از NH_3 و HF دارد و پیوند هیدروژنی HF نیز قوی‌تر از NH_3 است زیرا گشتاور دوقطبی HF بیش‌تر از NH_3 است و گزینه‌ی (۴) صحیح است.

۱ ۲ ۳ ۴ ۷۱

نمونه‌ی محلول سیر شده در دمای $15^\circ C$ و حاوی 100 گرم آب را تعیین می‌کنیم:

$$S_A = (0,5 \times 10) + 25 = 30 \text{ g}_A$$

$$\text{g}_{\text{محلول}} = 30 \text{ g}_A \times \frac{1 \text{ kg}_A}{1000 \text{ g}_A} + 100 \text{ g}_{H_2O} \times \frac{1 \text{ kg}_{H_2O}}{1000 \text{ g}_{H_2O}} = 0,13 \text{ kg}_{\text{محلول}}$$

حجم محلول را با استفاده از چگالی آب بدست می‌آوریم:

$$\text{mL}_{H_2O} = \frac{100 \text{ g}_{H_2O}}{1 \text{ g}_{H_2O}} \times \frac{1 \text{ L}_{H_2O}}{1000 \text{ mL}_{H_2O}} = 0,1 \text{ L}_{H_2O} = 0,1 \text{ L}_{\text{محلول}}$$

در ادامه چگالی را بر حسب $\frac{kg}{L}$ بدست می‌آوریم:

$$\text{چگالی محلول} = \frac{0,13 \text{ kg}_{\text{محلول}}}{0,1 \text{ L}_{\text{محلول}}} = 1,3 \frac{kg}{L}$$

۷۲ برای یون پتاسیم ابتدا به کمک غلظت ppm ، جرم حل شونده را به دست می‌آوریم تا بعد در فرمول درصد جرمی استفاده کنیم:

$$\text{جرم حل شونده} = \frac{380 \times 10^{-3} \text{ g}}{1000 \text{ g}} \times 100 = 0,38 \times 10^{-2}$$

و برای یون کلسیم:



$$\frac{\text{حجم حل شونده}}{\text{حجم محلول}} \times 100 = \frac{c}{1000g} \times 100 = 0.4g = 400mg$$

$$ppm = 0.04 \times 10^4 = 400$$

۱- ابتدا انحلال پذیری نمک در صفر درجه سلسیوس را مشخص می کنیم.

۲- تعیین ضریب θ یعنی شیب خط

$$1) x = a(0) + b \Rightarrow b = x$$

$$2) \frac{\text{تغییر انحلال پذیری}}{\text{تغییر دما}} = \frac{(x + a - x)}{(20 - 0)} = \frac{a}{20} \Rightarrow S = \frac{a}{20} \theta + x$$

۱ همه موارد صحیح هستند.

(آ) مولکول CO_2 ناقطبی و NO قطبی است ولی CO_2 به علت داشتن جرم مولی زیاد، و نیروی بین مولکولی بیش تر انحلال پذیری بیش تری نسبت به NO دارد.

(ب) مقدار گاز خارج شده برای ۱۰۰ گرم آب مطابق جدول:

$$0.006 - 0.003 = 0.003gNO$$

مقدار گاز خارج شده برای یک کیلوگرم (۱۰۰۰g) آب:

$$0.003 \times 10 = 0.03gNO$$

$$?mlNO = 0.03gNO \times \frac{1molNO}{30gNO} \times \frac{22.4LNO}{1molNO} \times \frac{1000mlNO}{1LNO} = 22.4mlNO$$


(پ) مقدار گاز A حل شده در ۲۰۰ گرم آب:

$$200g_A \times \frac{0.169g_A}{100g_A} = 0.338g_A$$


چون با افزایش دما، انحلال پذیری گازها در آب کاهش می یابد، پس با توجه به این مقدار در دمای $25^\circ C$ یک محلول فراسیر شده تشکیل خواهد شد.

۱ غلظت یون ها در محلول $A < B < C$ است زیرا ظرف (۱) پرنور، ظرف (۲) کم نور و ظرف (۳) کم ترین نور را دارد.

و باید غلظت یون های موجود در هر محلول را به دست آوریم:




$$? mol_{\text{یون}} = 0.5L \times \frac{20g_{NaOH}}{1L} \times \frac{1mol_{NaOH}}{40g_{NaOH}} \times \frac{2mol_{\text{یون}}}{1mol_{NaOH}} = 0.5mol_{\text{یون}}$$





$$[يون ها] = \frac{g}{L} \times \frac{1 mol NaOH}{40 g} \times \frac{2 mol}{1 mol NaOH} = 1 M$$

$$[يون ها] = \frac{9,5 g}{L} \times \frac{100 mL}{1 L} \times \frac{1 mol MgCl_2}{95 g} \times \frac{3 mol}{1 mol NaOH} = 1,2 M$$



پاسخ: طبق نمودار انحلال پذيری نمک NH_4Cl با افزایش دما زیاد می شود پس انحلال گرماگیر است ولی انحلال گاز آمونیاک در آب با افزایش دما کاهش می یابد پس انحلال گرماده است.
توجه: انحلال پذيری گازها در آب با فشار رابطه‌ی مستقیم و با دما رابطه‌ی عکس دارد.

۱ ۲ ۳ ۴ ۷۷


$$NO_3^- = 14 + 3(16) = 62 g \cdot mol^{-1}$$

$$?g_{NO_3^-} = 3 mol_{NO_3^-} \times \frac{62 g_{NO_3^-}}{1 mol_{NO_3^-}} = 186 g_{NO_3^-} \Rightarrow ppm = \frac{\text{جرم حل شونده}}{\text{جرم محلول}} \times 10^6$$

$$\Rightarrow 100 = \frac{186 g}{x g} \times 10^6 \Rightarrow x = 186 \times 10^{-6} g_{\text{ محلول}}$$

$$\text{آب} \times \frac{1 ml}{1 g_{\text{آب}}} \times \frac{1 L}{1000 ml} = 186 \text{ M}$$

مطابق جدول مقایسه‌ی مقدار برخی یون‌های حل شده در آب دریا به صورت زیر است:



مطابق شکل ترتیب صحیح مقدار منابع آبی در گزینه‌ی (۳) درست است.

در دمای داده شده، هر کدام از محلول‌ها که مطابق نمودار مقدار بیشتری ماده‌ی حل شده را در خود دارد، دارای چگالی بیشتری است.

انحلال پذيری: $D > B > C > A$

چگالی: $D > B > C > A$

www.my-dars.ir

فقط عبارت (آ) درست است، زیرا گشتاور دوقطبی C از بقیه بیشتر است پس جهت گیری آن در میدان الکتریکی منظم‌تر است.

بررسی عبارت‌های نادرست:

- ب) هرچه نقطه‌ی جوش بالاتر باشد، نیروی بین مولکولی بیشتر است.
- پ) ترکیب A که دوقطبی بسیار کمی دارد در هگزان که نقطه‌ی است بهتر حل می شود.
- ت) به کمک گشتاور دوقطبی بیشتر C فقط می‌توان گفت نیروی بین مولکولی در C قوی‌تر است و تشخیص نوع آن (هیدروژنی یا واندروالسی) امکان‌پذیر نیست.

ابتدا گرم حل شونده (اتانول) و حلال (آب) را به دست می‌آوریم:



$$?g_{C_2H_5OH} = 28,75 \text{ mol} \times \frac{18 \text{ g}}{1 \text{ mol}} = 23 \text{ g}_{C_2H_5OH}$$


$$?g_{H_2O} = 1,5 \text{ mol} \times \frac{18 \text{ g}}{1 \text{ mol}} = 27 \text{ g}_{H_2O}$$

$$\frac{\text{جرم حل شونده}}{\text{ محلول}} \times 100 = \frac{23}{50} \times 100 = \%46$$

↓

$$27 \text{ g} + 23 \text{ g} = 50 \text{ g}$$

۱۵ متعلق به گروه A ۱۵ جدول تناوبی و دارای ۵ الکترون در لایه‌ی ظرفیت و B ۹ متعلق به گروه A ۷ و دارای ۷ الکترون در لایه‌ی ظرفیت است و با تشکیل پیوند کوالانسی مولکول قطبی AB_3 را تشکیل می‌دهند.



۱۶ ابتدا به کمک فرمول درصد جرمی، جرم حل شونده (متانول) را در هریک از دو محلول تعیین می‌کنیم:

$$\frac{\text{جرم حل شونده}}{\text{ جرم محلول}} \times 100 \Rightarrow \frac{40}{100} = \frac{x}{200} \Rightarrow x = 80 \text{ g}$$

$$\Rightarrow \frac{70}{100} = \frac{x}{300} \Rightarrow x = 210 \text{ g}$$

$$\frac{(80 + 210) \text{ g}}{(200 + 300) \text{ g}} \times 100 = \frac{290}{500} \times 100 = \%58$$

۱۷ در دمای $C^{\circ} 42$ ، انحلال پذیری KCl ۴۰ g در ۱۰۰ g آب است پس در ۵۰ g آب باید:

$$\frac{40 \text{ g}}{100 \text{ g}} \times \text{آب} = 20 \text{ g}$$

$$\text{حل شونده}_g = 50 \text{ g}$$

۲۰ ۵۰ گرم حل شونده در ۵۰ گرم آب حل شود و محلول سیر شده به دست بیاید ولی ۳۰ g حل شونده بیش از این مقدار است و محلول فراسیر شده است. و در دمای $C^{\circ} 50$ ، انحلال پذیری KNO_3 ۶۵ g در ۱۰۰ g آب است و برای ۲۰۰ g آب باید:

$$\frac{65 \text{ g}}{100 \text{ g}} \times \text{آب} = 200 \text{ g}$$

$$\text{حل شونده}_g = 130 \text{ g}$$

۲۱ ۱۳۰ گرم حل شونده حل بشود و ۷۰ گرم از این مقدار کمتر است و محلول سیر نشده است.

۲۲ میزان تغییر انحلال پذیری KNO_3 با تغییر دما از $C^{\circ} 20$ به $C^{\circ} 50$ در مقایسه با میزان تغییر انحلال پذیری سه نمک دیگر بیشتر است. پس شب نمودار انحلال پذیری پتانسیم نیترات در برابر دما، از سه ماده دیگر بیشتر است.

بررسی سایر گزینه‌ها:

گزینه‌ی (۱): چون انحلال پذیری $Pb(NO_3)_2$ در این دما بیشتر است، پس چگالی محلول آن بیشتر است.

گزینه‌ی (۳): مطابق جدول در $C^{\circ} 20$ ، ۵۵ g نمک در ۱۰۰ g آب حل می‌شود. پس:

$$\frac{55 \text{ g}}{100 \text{ g}} \times \text{آب} = 250 \text{ g}$$

$$\text{حل شونده}_g = 137,5 \text{ g}$$

۲۳ ۱۵۰ گرم داده شده بیشتر از ۱۳۷,۵ گرم نمک حل شده است و محلول فراسیر شده است.

گزینه‌ی (۴): در دمای $C^{\circ} 20$ ، ۶۵ g از این نمک در ۱۰۰ g آب حل شده است که معادل ۱۰۶ g محلول سیر شده است پس خواهیم داشت:



$$\text{حل شونده} \times \frac{6g}{\text{محلول}} = 500g \Rightarrow \text{حل شونده} = \frac{500g}{6g} = 83.33g$$

$$?g_{\text{آب}} = 1000 \text{ m}^3 \times \frac{1000L}{1 \text{ m}^3} \times \frac{1kg}{1L} \times \frac{1000g}{1kg} = 1000000 \text{ g}_{\text{آب}}$$

$$ppm = \frac{\text{جرم حل شونده}}{\text{جرم محلول}} \times 10^6 \Rightarrow 1 = \frac{xg}{1000000g} \times 10^6 \Rightarrow x = 1000000 \text{ g}$$

$$\text{درصد جرمی} = \frac{\text{جرم حل شونده}}{\text{جرم محلول}} \times 100 \Rightarrow 10\% = \frac{1000000}{xg} \times 100 \Rightarrow x = 1000000 \text{ g}$$

چون قابلیت حل شدن $60g$ نمک در $100g$ آب است جرم محلول $160g$ می باشد و خواهیم داشت:

$$?g_{\text{آب}} = \frac{160g}{\text{حل شونده}} = \frac{160g}{32g} = 5 \text{ g}_{\text{آب}}$$

با قرار دادن دماهای داده شده در معادله ای انحلال پذیری KCl مقدار نمک حل شده در هر دما در $100g$ آب به

دست می آید:

$$S = 0,8\theta + 72 \quad \begin{cases} \theta = 20^\circ C \\ \theta = 10^\circ C \end{cases} \quad \begin{aligned} S &= 0,8 \times 20 + 72 = 88g \\ S &= 0,8 \times 10 + 72 = 80g \end{aligned} \Rightarrow 88 - 80 = 8g_{KCl}$$

در دمای $20^\circ C$ جرم محلول سیر شده معادل ($\text{محلول} + \text{آب}$) $= 188g$ است که با کاهش دما به $10^\circ C$ مقدار $8g$ رسوب تولید شده است پس برای $100g$ محلول $20^\circ C$ مقدار رسوب را تعیین می کنیم:

$$?g_{\text{رسوب}} = \frac{8g}{188g} \times 1000g = 4,25g_{\text{رسوب}}$$

و در آخر فرمول درصد جرمی را استفاده می کنیم:

$$\text{درصد جرمی} = \frac{\text{جرم حل شونده}}{\text{جرم محلول}} \times 100 \Rightarrow 10\% = \frac{4,25}{x} \times 100 \Rightarrow x = 5,3g_{\text{محلول}}$$

ماي دars

گروه آموزشی عصر

$$A: ppm = \frac{2x}{400} \times 10^6 \Rightarrow \frac{x}{2} \times 10^4 \Rightarrow \frac{x}{10^4} = \frac{1}{2} = 0,5$$

$$B: ppm = \frac{x}{100} \times 10^6 \Rightarrow 10^4 x$$

$$?mol_{NaCl} = \frac{50}{100} \times 29,25g_{NaCl} \times \frac{1mol_{NaCl}}{58,5g_{NaCl}} = 0,25mol_{NaCl}$$

$$M = \frac{n}{V} \Rightarrow 0,4 = \frac{0,25mol}{xL} \Rightarrow x = \frac{0,25}{0,4} L \times \frac{1000ml}{1L} = 625ml$$



۹۲ عبارت‌های (ب)، (پ) و (ت) درست‌اند.

(الف) با قرار دادن دمای صفر درجه ($\theta = 0^\circ\text{C}$) انحلال‌پذیری $A = 27g$ و $B = 72g$ می‌شود که انحلال‌پذیری A در این دما، ۶,۲ برابر (کم) تر از سه برابر (انحلال‌پذیری B) است.

(ب) در دمای $C = 50^\circ\text{C}$ ، انحلال‌پذیری این ماده در 100°C ۱۱۲ گرم آب برابر A است.

$$S_A = 0,8(50) + 72 = 112g$$

پس برای 300°C ۳۰ گرم آب خواهیم داشت:

$$?g_A = 300 \times \frac{112g_A}{100g_{\text{آب}}} = 336g_A$$

$$?mol_A = 336g_A \times \frac{1mol_A}{18g_A} = 19mol_A$$

پس با حل کردن ۴ مول A در 300°C ۳۰ گرم آب، محلول سیر شده حاصل می‌شود.

(پ) انحلال‌پذیری A را در دمای $C = 80^\circ\text{C}$ و 60°C تعیین می‌کنیم:

$$S_A = 0,8(80) + 72 \Rightarrow S_A = 136g_A \Rightarrow 100g_{\text{آب}} + 136g_A = 236g_{80^\circ\text{C}}$$

$$S_A = 0,8(60) + 72 \Rightarrow S_A = 120g_A \Rightarrow 100g_{\text{آب}} + 120g_A = 220g_{60^\circ\text{C}}$$

$$\Rightarrow 236 - 220 = 16g_{\text{رسوب}}$$

۱۶ گرم آب برای $236g$ محلول 80°C حاصل می‌شود و خواهیم داشت:

$$?g_A = 295g_{80^\circ\text{C}} \times \frac{16g_{\text{رسوب}}}{236g_{80^\circ\text{C}}} = 20g_{\text{رسوب}}$$

پس عبارت (پ) نیز صحیح است.

(ت) با توجه به معادله‌های انحلال، هرچه ضریب θ یعنی شیب معادله بیشتر باشد تغییرات دما بر آن مؤثرتر است پس در ترکیب A با شیب بیشتر با افزایش دما، انحلال‌پذیری بیشتر افزایش می‌یابد.

۹۳ به طور مثال اگر 280 میلی‌گرم یون سدیم را در یک کیلوگرم آب حل کنیم درصد جرمی و غلظت آن


عبارتست از:

$$\frac{280 \times 10^{-3} g}{1000g} \times 100 = 28 \times 10^{-3}, \quad ppm = \frac{280 \times 10^{-3}}{1000} \times 10^6 = 280ppm$$

پس: 10^6 درصد جرمی $= ppm$

۹۴ منیزیم در آب دریا به صورت محلول در آب وجود دارد ($Mg^{2+}(aq)$). ابتدا آن را به صورت جامد و نامحلول

رسوب می‌دهند ($Mg(OH)_2(s)$) سپس تبدیل به منیزیم کلرید ($MgCl_2$) کرده و با استفاده از جریان برق منیزیم مذاب تولید می‌شود.



۹۵ در مقایسه‌ی دو ظرف می‌توان گفت که تنها حجم محلول برابر است. جرم و حجم حلال در دو ظرف متفاوت است و

باتوجه به تفاوت تعداد ذره‌ی حل شده در دو ظرف، جرم محلول نیز در مقایسه‌ی دو ظرف متفاوت است.

$$M = \frac{n}{V} \Rightarrow 0,5 = \frac{x_{mol}}{0,2L} \Rightarrow x = 0,1 mol_{NaOH} \Rightarrow$$

رد گزینه‌ی ۲ و ۴

۹۶



$$0,1 \text{ mol}_{NaOH} \times \frac{40 \text{ g}_{NaOH}}{1 \text{ mol}_{NaOH}} = 4 \text{ g}_{NaOH} \Rightarrow \text{گزینه ۳ صحیح است.}$$

غلظت مولار برابر است با مول حل شونده در یک لیتر محلول ولی در گزینه‌ی (۱) در ۲۰۰ میلی‌لیتر آب یعنی حلال گفته شده است پس گزینه‌ی (۱) نادرست است.

۹۷ ۱ ۲ ۳ ۴ **يون نیترات (NO_3^-)** اغلب در آب‌های آشامیدنی وجود دارد که دلیل آن استفاده‌ی نامناسب از کودهای شیمیایی و دفع نادرست زباله‌ها می‌باشد. مقدار مجاز آن در آب برابر 10 ppm است. یون نیترات پس از ورود به خاک به راحتی در آب حل می‌شود وارد آب‌های زیرزمینی و آشامیدنی می‌شود. این یون در آب پایدار بوده، هنگام ورود به بدن، با هموگلوبین خون ترکیب شده و در انتقال اکسیژن اختلال ایجاد می‌کند و در سیستم گوارش بدن به راحتی تبدیل به یون نیتریت (NO_2^-) شده و باعث کاهش غلظت اسید معده می‌گردد. کمبود آنزیم، کاهش هموگلوبین طبیعی خون، افسردگی، تأثیر بر سیستم عصبی و در غلظت بالای 70 درصد مرگ انسان جزو نتایج آن می‌باشد.

۱ ۲ ۳ ۴ ۹۸

$$\left\{ \begin{array}{l} 1dL = 100 \text{ ml} \Rightarrow 100 \text{ ml} \times \frac{1L}{1000 \text{ ml}} = 0,1 L \text{ محلول} \\ C_6H_{12}O_6 \Rightarrow \text{جرم مولی گلوکز} = 6(12) + 12(1) + 6(16) = 180 \text{ g} \cdot mol^{-1} \\ ? \text{ mol}_{C_6H_{12}O_6} = 95 \text{ mg} \times \frac{1g}{1000 \text{ mg}} \times \frac{1 \text{ mol}}{180 \text{ g}} = 5,28 \times 10^{-4} \text{ mol} \\ M = \frac{n}{V} \Rightarrow M = \frac{5,28 \times 10^{-4} \text{ mol}}{0,1 L} = 5,28 \times 10^{-3} \frac{\text{mol}}{L} \end{array} \right.$$

۹۹ ۱ ۲ ۳ ۴ **عبارت‌های (ب و ت) نادرست هستند.**

بررسی گزینه‌ها:

ب) فرمول شیمیایی کروم (III) سولفات ($Cr_2(SO_4)_3$) می‌باشد.پ) NH_4NO_3 و $CuCO_3$ مجموع تعداد کاتیون و آنیون در هر دو ترکیب برابر 2 است.ت) $(NH_4)_3PO_4$ ، $NaOH$

ما درس

گروه آموزشی عصر

www.my-dars.ir

$$NaOH : \frac{1 \text{ تعداد کاتیون}}{1 \text{ تعداد آنیون}} = 1$$

$$(NH_4)_3PO_4 : \frac{3 \text{ تعداد کاتیون}}{1 \text{ تعداد آنیون}} = 3$$

۱۰۰ ۱ ۲ ۳ ۴ **فقط عبارت (ت) نادرست است.**الف) $MgSO_4$ (منیزیم سولفات) دارای یون‌های Mg^{2+} و SO_4^{2-} است.ب) یون‌های سولفات و نیترات دارای عنصرهای S و N هستند که باید در اختیار گیاه قرار بگیرند. (NO_3^- ، SO_4^{2-})


پ) درست است.

ت) نادرست است.



۱	۱	تعداد کاتیون:
۱	۳	تعداد آنیون:
۲	۴	مجموع:

۱۰۱ یون نیترید (N^{3-}) است پس در MN که ظرفیت‌ها ۳ به ۳ بوده و ساده شده‌اند، M دارای ظرفیت ۳ می‌باشد.
پس گزینه‌ی (۴) صحیح است.



۱۰۲ الف، ب و پ درست‌اند.

الف) آب آشامیدنی حاوی یون کلرید (Cl^-) است و با اضافه کردن چند قطره نقره نیترات ($AgNO_3$)، رسوب سفیدرنگ $AgCl$ تشکیل می‌شود.
ب) درست است.

پ) کود شیمیایی SO_4^{2-} (NH_4) براساس مطالب بیان شده مدل فضایپرکن کاتیون NH_4^+ و آنیون SO_4^{2-} آن یکسان است.
ت) گونه‌ای که دارای بار الکتریکی بوده و شامل دو یا چند اتم (نه عنصر) هستند که با پیوند کووالانسی به یکدیگر متصل شده‌اند را یون چند اتمی می‌نامند.

۱۰۳

PO_4^{3-}	NO_3^-	OH^-	CO_3^{2-}	NH_4^+	Cl^-	SO_4^{2-}
۵	۴	۲	۴	۵	۱	۵
۲	۲	۲	۲	۲	۱	۲
۷	۶	۴	۶	۷	۲	۷

تعداد اتم:
نوع عنصر:
مجموع تعداد اتم و عنصر:

در گزینه‌ی (۱) مجموع تعداد اتم و عنصر هر دو یون ($13 = 6 + 7$) بیش‌تر است.

۱۰۴ مس ($Cu(NO_3)_2$) نیترات (II) است.

۱۰۵ شکل (۱) دارای آنیون یک بار منفی و کاتیون سه بار مثبت است که می‌تواند: NO_3^- و Fe^{3+} باشند.
شکل (۲) آنیون دو بار منفی و کاتیون دو بار مثبت دارد مانند: SO_4^{2-} ، Ba^{2+} و Mg^{2+} می‌باشند و در شکل (۳) آنیون یک بار منفی و کاتیون دو بار مثبت را نشان می‌دهد مانند: PO_4^{3-} ، NO_3^- ، OH^- و Ba^{2+} پس گزینه‌ی (۴) درست است.

۱۰۶ هنگام تشکیل برف و باران، تقریباً همه‌ی مواد حل شده در آب از آن جدا می‌شود. این فرآیند الگویی برای تهییه آب خالص است. فرآیندی که تقطیر و فرآورده‌ی آن آب مطر نام دارد.

۱۰۷ کاتیون نقره (Ag^+) با یون کلرید (Cl^-) تشکیل رسوب سفیدرنگ نقره کلرید ($AgCl(s)$) می‌دهد و یون کلسیم (Ca^{2+}) با یون فسفات (PO_4^{3-}) تشکیل رسوب سفیدرنگ کلسیم فسفات ($Ca_3(PO_4)_2(s)$) می‌دهد.

۱۰۸

ابتدا جرم حل شونده را تعیین می‌کنیم تا مقدار مول آن را مشخص می‌کنیم و به کمک فرمول چگالی، حجم محلول را بدست آورده و در فرمول غلظت مولار قرار می‌دهیم و غلظت مولار بدست می‌آید.

$$CaBr_2 = 40 + 2 \times 80 = 200 \text{ g} \cdot mol^{-1}$$

$$\frac{\text{جرم حل شونده}}{\text{جرم محلول}} = \frac{x}{150} \times 100 \Rightarrow 40 = \frac{x}{150} \times 100 \Rightarrow x = 60 \text{ g}_{CaBr_2}$$



$$\text{?mol}_{CaBr_2} = 60 \text{ g} \times \frac{1 \text{ mol}}{200 \text{ g}} = 0,3 \text{ mol}_{CaBr_2}$$

$$\text{چگالي } d = \frac{m}{v} \Rightarrow 0,25 = \frac{150 \text{ g}}{x} \Rightarrow x = 600 \text{ mL} = 0,6 \text{ L}$$

$$\text{مول حل شونده} = \frac{0,3 \text{ mol}}{0,6 \text{ L}} = 0,5 \frac{\text{mol}}{\text{L}}$$

۱۰۹ مقدار KNO_3 حل شده در دمای $48^\circ C$ در 100 گرم آب برابر 80 گرم و در دمای $10^\circ C$ برابر 20 گرم

نمک است پس در اثر سرد کردن 180 گرم محلول سیر شده ($80 - 20 = 60 \text{ g}$)، 60 گرم رسوب تشکیل می‌شود و خواهیم داشت:

$$\text{رسوب} \times \frac{60 \text{ g}}{180 \text{ g}_{48^\circ C}} = 150 \text{ g}_{48^\circ C}$$

↓

$$80 \text{ g}_{\text{نمک}} + 100 \text{ g}_{\text{آب}}$$

روش دوم (فرمول تستی):



$$\frac{\text{جرم محلول}}{100 + s_p} = \frac{450 - (80 - 20)}{100 + 80} \Rightarrow x = 150 \text{ g}$$

۱۱۰ آب باران در هوای پاک تقریباً خالص است، زیرا هنگام تشکیل برف و باران، تقریباً همه مواد حل شده در آب از

آن جدا می‌شود.

۱۱۱


(الف)



ب) شمار عنصرهای سازنده $\left. \begin{array}{l} 4 = O, C, H, N : (NH_4)_2CO_3 \\ 2 = Cl, Fe : FeCl_2 \end{array} \right\}$

پ) هر مول $(NH_4)_2CO_3$ دارای: «مول اتم» $= 14$ و $3 \times O = 12$ و $2N, 8H, 1C$

ت) تعداد پیوند کووالانسی: 4 در هر دو برابر است.




پس در هر دو برابر است

۱) با توجه به جدول صفحه ۹۳ کتاب درسی، غلظت یون‌های سدیم، منیزیم، کلرید و سولفات بیش از یک گرم در هر کیلوگرم آب دریا می‌باشد.

۲) فقط عبارت «ت» نادرست است.

۳) در حدود ۲,۸ درصد (بیش از ۲,۵ درصد) از آب کره را منابع غیر اقیانوسی تشکیل می‌دهد.



۴) **۵۰% جمعیت جهان ($\frac{1}{2}$) از کم‌آبی رنج می‌برند که این رقم تا سال ۲۰۲۵ به $\frac{۶۶}{۳}$ % (حدود $\frac{۲}{۳}$) خواهد رسید.

۵) عبارت‌های «الف و پ» درست هستند.

۶) با توجه به اینکه: A : هواکره، B : زیست‌کره، C : سنگ‌کره، D : آب‌کره می‌باشد.

۷) برای عبارت (ب): در واکنش‌های زیست‌کره درشت مولکول‌ها نقش اساسی ایفا می‌کنند اما هواکره از مولکول‌های کوچک تشکیل شده است.

۸) در عبارت (ت): جانداران آبزی سالانه میلیاردها تن کربن دی‌اکسید را وارد هواکره می‌کنند.

۹) همه عبارت‌ها صحیح هستند به جز گزینه (۳):

۱۰) محلول‌ها، مخلوط همگن از دو یا چند ماده هستند که حالت فیزیکی و شیمیایی در سرتاسر آن‌ها یکسان و یکنواخت است. (محلول‌ها می‌توانند به حالت مایع – جامد و گاز وجود داشته باشند)

۱۱) توجه: در بررسی گزینه (۲)، ماده‌ای که حل‌شونده را در خود حل می‌کند و مول بیشتری دارد، حلال است.

$$?mol H_2O = \lambda g H_2O \times \frac{1 mol H_2O}{18 g H_2O} \simeq 0,044 mol H_2O$$

آب نقش حلal را دارد \Rightarrow

$$?mol C_2H_5OH = 14 g C_2H_5OH \times \frac{1 mol C_2H_5OH}{46 g C_2H_5OH} \simeq 0,3 mol C_2H_5OH$$

www.my-dars.ir

۱۲) بررسی عبارت‌ها:

۱۳) (الف) نادرست – تأثیر دما بر انحلال‌پذیری نمکی بیشتر است که ضریب دمای بزرگتری دارد ($0,8 > 0,5$) پس انحلال‌پذیری سدیم نیترات بیشتر است.

۱۴) (ب) نادرست – دمای ۲۷۳ کلوین یعنی $C^{\circ} = 0$ در هر یک از معادلات، انحلال‌پذیری سدیم نیترات و پتاسیم کلرید به ترتیب ۷۲ و ۲۷ گرم است.

۱۵) (پ) درست. در دمای اتاق ($C^{\circ} = 25$) نیز انحلال‌پذیری سدیم نیترات بیشتر است.

۱۶) (ت) درست.

$$S = 0,3(10) + 27 = 30 g \text{ حل‌شونده} \Rightarrow \frac{w}{w} = \frac{g \text{ حل‌شونده}}{g \text{ محلول}} \times 100 \Rightarrow \frac{30}{130} \times 100 \simeq 23\%$$

$$g = 100g + 30g \text{ آب} = 130g \text{ محلول}$$



۱۱۷ فقط عبارت «ب» درست است.

بررسی عبارت‌ها:
الف) نادرست.

$$\begin{aligned} ?g_{NaNO_3} &= 50 \text{ g} \times \frac{92 \text{ g } NaNO_3}{192 \text{ g }} = 23,96 \text{ g } NaNO_3 \\ &\Rightarrow g_{NaNO_3} < g_{NaCl} \\ ?g_{NaCl} &= 136 \text{ g} \times \frac{36 \text{ g } NaCl}{136 \text{ g }} = 36 \text{ g } NaCl \end{aligned}$$

ب) کلسیم سولفات دارای انحلال‌پذیری بین ۱۰٪ تا ۱ گرم است و کم محلول است ولی کلسیم فسفات انحلال‌پذیری کوچکتر از ۱۰٪ دارد و نامحلول است.
پ) نادرست.

$$?g_{NaCl} = 25 \text{ g} \times \frac{36 \text{ g}}{136 \text{ g }} = 6,6 \text{ g }$$

ت) نادرست
روش اول)

$$?g_{NaNO_3} = 48 \text{ g} \times \frac{92 \text{ g}}{192 \text{ g }} = 23 \text{ g} \Rightarrow \text{حل شونده} - 23 \text{ g} = 48 \text{ g} \Rightarrow \text{حل شونده} = 25 \text{ g}$$

روش دوم)

$$?g_{NaNO_3} = 25 \text{ g} \times \frac{100 \text{ g}}{192 \text{ g }} = 13,1 \text{ g}$$

۱۱۸ موارد «الف، ب و پ» صحیح هستند.

بررسی عبارت نادرست «ت»: در میان ترکیب‌های ناقطبی هرچه جرم مولی بیشتر باشد، نقطه جوش نیز بیشتر است.

۱۱۹ توجه داشته باشید (۱) تا (۴) درصد جرمی

$$Na^+ : \frac{\text{جرم حل شونده}}{\text{جرم محلول}} \times 100 \Rightarrow 10,5 = \frac{mg_A}{10^6 mg} \times 100 \Rightarrow mg_A = 10500 mg_{Na^+}$$

$$Mg^{2+} : ppm = \frac{\text{جرم حل شونده}}{\text{جرم محلول}} \times 10^6 \Rightarrow ppm = \frac{1350 mg}{10^6 mg} \times 10^6 = 1350$$

$$Ca^{2+} : ppm = \frac{100}{10^4} \times 10^4 = 100 \quad (\text{درصد جرمی})$$

۱۲۰ فقط عبارت‌های «الف و ب» درست‌اند.


بررسی عبارت‌ها:

$$\begin{aligned} \text{الف} \quad B : NO_3^- &\Rightarrow 7 + 3(8) + 1 = 32 e^- \Rightarrow 32 - 10 = 22 \\ C : Na^+ &\Rightarrow 11 - 1 = 10 e^- \end{aligned}$$

(ب) $AgCl \Rightarrow Ag^+, Cl^- = 2$ مول یونعبارت پ) در اثر افزودن نقره نیترات به محلول لوله آزمایش «الف» غلظت Ag^+ و Cl^- که تشکیل رسوب سفیدرنگ



می‌دهند تغییر می‌کند ولی یون‌های Na^+ و NO_3^- که یون‌های تماشاگر (ناظر) هستند هیچ تغییری نمی‌کنند.



چون اتحال‌پذیری این دو نمک در دمای $30^\circ C$ درجه سلسیوس با هم برابر است ($S_A = S_B$) پس به کمک داده‌های نمک A , معادله اتحال‌پذیری را تعیین می‌کنیم:


$$\begin{aligned} & \theta = 20^\circ C \quad 30 = a(20) + b \\ S_A = a\theta + b & \Rightarrow a = 0,25, \quad b = 25 \\ & \theta = 60^\circ C \quad 40 = a(60) + b \end{aligned}$$

$$S_A = 0,25\theta + 25 \quad S_A = S_B$$

در ادامه در دمای $30^\circ C$, اتحال‌پذیری B یعنی گرم حل شونده در 100 گرم آب را بدست می‌آوریم:

$$S_B = 0,25(30) + 25 = 32g \underset{\text{حل شونده}}{(B)} = \frac{32,5}{132,5} \times 100 \simeq \% 24,5$$

۱۲۲ اتانول (C_2H_5OH) در آب به صورت کاملاً مولکولی حل می‌شود و رسانایی ندارد.



هر چه تعداد مول‌های یون‌ها بیشتر باشد، محلول رسانایی بیشتری دارد.

$$\underbrace{2Al}_{m=?} + 6HCl \rightarrow 2AlCl_3 + 3H_2$$

$$\left\{ \begin{array}{l} 200mL \\ 0,5 \frac{mol}{L} \end{array} \right.$$

ما درس

گروه آموزشی عصر

۱۲۳

ابتدا به کمک فرمول غلظت مولار، مول اسید را تعیین می‌کنیم:

$$www.my-dars.ir$$

$$\begin{aligned} M &= \frac{n}{V} \rightarrow mol \\ \text{غلظت مولار} & \rightarrow \text{حجم (L)} \end{aligned} \Rightarrow 0,5 = \frac{n}{0,2} \rightarrow n_{HCl} = 0,1 mol$$

$$?g Al = 0,1 mol HCl \times \frac{2mol Al}{6mol HCl} \times \frac{27g Al}{1mol Al} = 0,9g Al$$

۱۲۴ بررسی گزینه (۱): با عمود کردن از دمای $10^\circ C$ بر هر یک از نمودارهای KNO_3 و KCl مقدار نمک حل شده در 100 گرم آب را تعیین می‌کنیم و برای KNO_3 حدود 18 گرم و برای KCl حدود 28 گرم نمک لازم است تا محلول سیر شده باشد.



$$\text{نمک} \frac{28g}{100g} = 200g \times \frac{56g}{\text{آب}} = 200g \text{ نمک } KCl \text{ محلول سير نشده}$$

زيرا برای ۲۰۰ گرم آب، ۵۶ گرم نمک لازم است تا محلول سير شود و ۴۰ گرم کمتر از اين مقدار است پس محلول سير نشده می شود.

$$\text{نمک} \frac{18g}{100g} = 200g \times \frac{36g}{\text{آب}} = 200g \text{ محلول فراسير شده}$$

چون ۴۰g بيشتر از ۳۶ گرم نمک برای تهيه محلول سير شده است پس محلول حاصل فراسير شده می شود.

حل شونده ۳۵g

$$A \xrightarrow{\substack{\text{درصد جرمی نمکها در نقطه} \\ \text{آب}}} \text{نمک} \frac{35g}{100g} + \underbrace{100g}_{\text{آب}} = \underbrace{135g}_{\text{ محلول}} \Rightarrow \% \frac{w}{w} = \frac{35}{135} \times 100 = \% 25,9$$

بررسی گزینه (۳): تغيير دما بر انحلال پذيری KNO_3 تاثير بيشتری دارد چون شب آن تندتر و تغييرات بيشتر است.

بررسی گزینه (۴): عرض لز مبدا منحنی انحلال يك نمک را در دمای صفر درجه سانتيگراد نشان می دهد و در KCl بيشتر از KNO_3 است.

۱ ۲ ۳ ۴ ۱۲۵

$$Li_3PO_4 : \frac{\text{تعداد کاتيون}}{\text{تعداد آنيون}} = \frac{3}{1} \quad \left\{ \begin{array}{l} 1) K_2N = \frac{1}{3} \\ 2) Al_2(CO_3)_3 = \frac{3}{2} \\ 3) Fe(NO_3)_3 = \frac{3}{1} \\ 4) MgF_2 = \frac{2}{1} \end{array} \right.$$

در حالت های الف، ب و پ یون موجود در محلول A با محلول B مورد نظر واکنش داده و تشکیل رسوب های $Fe(OH)_3$ و $Ca_3(PO_4)_2$ و $AgCl$ می دهند. و در حالت (ت) یون باریم با محلول $CuCl_2$ تشکیل $BaCl_2$ محلول می دهد نه رسوب.

۱ ۲ ۳ ۴ ۱۲۶

ابتدا جرم ۰,۰۲ مول ليتیم سولفید را محاسبه می کنیم:

$$?g Li_2S = 0,02 mol \times \frac{46g}{1mol} = 0,92g$$

$$ppm = \frac{\text{جرم حل شونده}}{\text{جرم محلول}} \times 10^6 \Rightarrow ppm = \frac{0,92g}{4000g} \times 10^6 = 230 ppm$$

www.my-dars.ir

۱ ۲ ۳ ۴ ۱۲۷

$$?mg \text{ گلوكز} = 100ml \times \frac{1L}{1000mL} \times \frac{0,012 mol}{1L} \text{ خون} \times \frac{180g}{1mol} \text{ گلوكز} \times \frac{1000mg}{1g} = 216mg$$

۱ ۲ ۳ ۴ ۱۲۸

۱ ۲ ۳ ۴ ۱۲۹

مقاييسه یون های حل شده در آب دریا:

۱ ۲ ۳ ۴ ۱۳۰

بيش ترين یون: Cl^-

بيش ترين آنيون: Cl^-

بيش ترين یون چنداتمي: SO_4^{2-}

به کمک جدول زیر، به گزینهٔ درست پی می‌بریم:

نام ترکیب یونی	فرمول شیمیایی	شمار اتم‌های هیدروژن شمار و نماد آنیون چند اتمی	
آمونیوم سولفات	$(NH_4)_2SO_4$	$1SO_4^{3-}$	۸
آلومینیم هیدروکسید	$Al(OH)_3$	$3OH^-$	۳
آمونیم فسفات	$(NH_4)_2PO_4$	$1PO_4^{3-}$	۱۲
منیزیم هیدروکسید	$Mg(OH)_2$	$2OH^-$	۲
آمونیوم هیدروکسید	NH_4OH	$1OH^-$	۵

بررسی گزینه‌های نادرست:

۱) بیشتر آب‌های روی زمین شور است نه بیشتر آب‌های آشامیدنی روی زمین.

۲) برای شناسایی این یون در یک محلول می‌توان از یک محلول حاوی یون کلسیم (Ca^{2+}) استفاده کرد.

$Ca_3(PO_4)_2(s)$ «رسوب سفیدرنگ»

۳) به آب آشامیدنی مقدار بسیار کمی یون فلورید (F^-) می‌افزایند.


توجه کنید: $Na_2SO_4:D$, $BaCl_2:C$, $BaSO_4:B$, $NaCl:A$

ترکیب B یک مادهٔ نامحلول در آب است (رسوب است) و به عنوان واکنش دهندهٔ وارد واکنش نمی‌شود.

عبارت‌های (الف و ب) نادرست هستند.

الف) آب دریاها مخلوطی همگن (محلول) است.

ب) نوع و مقدار مواد حل شده در دریاها با یکدیگر متفاوت است.



$$?g\ AgCl = 17g\ AgNO_3 \times \frac{1mol\ AgNO_3}{170g\ AgNO_3} \times \frac{1mol\ AgCl}{1mol\ AgNO_3} \times \frac{143,5g\ AgCl}{1mol\ AgCl} = 14,35g\ AgCl$$

یون‌های محلول در آب، یون‌های تماشاگر Na^+ و NO_3^- هستند که هر مول $NaNO_3(aq)$ تولید دو مول یون Na^+ و NO_3^- می‌کند.

$$?mol\ \text{یون} = 17g\ AgNO_3 \times \frac{1mol\ AgNO_3}{170g\ AgNO_3} \times \frac{2mol}{1mol\ AgNO_3} = 0,2mol\ \text{یون}$$

در گزینهٔ (۴) به دلیل کمتر بودن چگالی بدن انسان، انسان می‌تواند بر روی آبی که چگالی بیشتری دارد شناور

باشد.

بررسی گزینه‌های نادرست:

۱) نام شیمیایی ضد بخ، محلول آبی اتیلن گلیکول است.

۲) گلاب محلول آبی چند ترکیب آلی است.

۳) به جزئی از محلول که شمار مول‌های آن کمتر است حل شوندهٔ می‌گویند.

بررسی عبارت نادرست: در دمای $20^\circ C$ انحلال‌پذیری مادهٔ B برابر با ۳۳ گرم B در ۱۰۰ گرم آب است.



$$S_B = (0,3 \times 20) + 27 = 33g B$$

بنابراین نمی‌توان ۱۷,۵ گرم از آن را در ۵۰ گرم آب حل کرد زیرا در ۵۰ گرم آب ۱۶,۵ گرم ماده B حل می‌شود.

$$?g_B = 50g_{H_2O} \times \frac{33g_B}{100g_{H_2O}} = 16,5g_B$$

برای گزینه (۳) با استفاده از مقادیر داده شده مول $NaCl$ را بدست می‌آوریم: ۱ ۲ ۳ ۴ ۱۳۸

$$?mol\ NaCl = 200ml\ H_2O \times \frac{1g\ H_2O}{1ml\ H_2O} \times \frac{36g\ NaCl}{100g\ H_2O} \times \frac{58,5g\ NaCl}{1mol\ NaCl} = 1,2mol\ NaCl$$

بررسی گزینه‌های نادرست:

(۱) انحلال پذیری:



کلسیم فسفات	کلسیم سولفات
نقره کلرید	شکر
باریم سولفات	سدیم نیترات

سدیم کلرید

در این جدول ۲ ماده کم محلول و ۳ ماده نامحلول وجود دارد.

$$ppm = 10^4 \times 10^{-4} \times 10^4 = 1,9 ppm \quad (۲)$$



(۳)

$$?g_B = \frac{205g}{100g} \times 50g = 102,5g \quad \text{شکر} \quad \text{آب}$$



در دمای $25^\circ C$ در ۵۰ گرم آب $102,5g$ شکر یا هر مقدار کمتر از آن را می‌توان حل کرد.

برای هر محلول تعداد یون‌ها را در غلظت مولار داده شده ضرب می‌کنیم. ۱ ۲ ۳ ۴ ۱۳۹

۱)



۳)



در محلول $0,05$ مولار آلومینیم سولفات تعداد یون بیشتری در محلول وجود می‌آید.

۱۴۰ ۱ ۲ ۳ ۴ هرچه گشتاور دوقطبی یک ترکیب از صفر بیشتر باشد، مولکول قطبی‌تر است و نیروهای جاذبه بین مولکولی

قوی‌تر و نقطه جوش بالاتر است. (رد گزینه ۴)

مواد ناقطبی در هگزان ناقطبی و مواد قطبی در استون قطبی حل می‌شود پس مولکول B که ناقطبی است انحلال پذیری بیشتری در هگزان دارد

و A و C با قطبیت بیشتر، مولکول قطبی هستند و انحلال پذیری آنها در استون بیشتر است.

۱۴۱ ۱ ۲ ۳ ۴ در ترکیب‌های هیدروژن‌دار یک گروه مانند (گروه ۱۵ و ۱۶ و ۱۷) ماده‌ای که پیوند هیدروژنی دارد نقطه جوش

بالاتری دارد و سایر مولکول‌های گروه که مولکول‌های قطبی با جاذبه بین مولکولی و اندروالس هستند هرچه حجم و جرم مولکول بیشتر باشد،

نقطه جوش بالاتر است:

۱۷ : گروه $HF > HBr > HCl$

۱۶ : گروه $H_2O > H_2Se > H_2S$

۱۵ : گروه $NH_3 > ASH_3 > PH_3$

و بین مولکول‌های HF ، NH_3 ، H_2O ، H_2S ، هرچه تعداد پیوند هیدروژنی بیشتر باشد نقطه جوش بالاتر است و مولکول آب نقطه جوش



بالاتری دارد و چون قطبیت HF از NH_3 بیشتر است. نقطه جوش HF هم بالاتر از NH_3 است.

$H_3O > HF > NH_3$: نقطه جوش

۱۴۲ عبارت‌های «الف و ت» درست هستند.

بررسی عبارت‌های نادرست:

ب) برای شناسایی یون باریم (Ba^{2+}) اگر از محلول KCl استفاده شود، $BaCl_2$ تشکیل می‌شود که در آب محلول است و رسوب تشکیل نمی‌دهد.

پ) درون یک نمونه آب آشامیدنی، یون‌های کلسیم و فسفات نمی‌توانند هم‌مان وجود داشته باشند زیرا با یکدیگر تشکیل رسوب سفیدرنگ کلسیم فسفات $Ca_3(PO_4)_2$ می‌دهند.

۱۴۳ چون درصد جرمی این دو محلول برابر است پس با توجه به مقادیر منیزیم سولفات، درصد جرمی را تعیین می‌کنیم.

$$MgSO_4 : \% \frac{w}{w} = \frac{\text{جرم حل شونده}}{\text{جرم محلول}} \times 100 \Rightarrow \frac{3}{50} \times 100 = \% 6 = \text{درصد جرمی برای هر دو محلول}$$

↓
(حل شونده + حلال)
 $47 + 3 = 50$

$$Li_3PO_4 : \% \frac{w}{w} = \frac{\text{جرم حل شونده}}{\text{جرم محلول}} \times 100 \Rightarrow 6 = \frac{x}{200} \times 100 \Rightarrow x = 12g Li_3PO_4$$

حل شونده + حلال = محلول
 $200 = x + 12 \Rightarrow x = 188g$ حلال (آب)


۱۴۴ طبق تعریف: انحلال‌پذیری برابر با بیشترین مقدار حل شونده در 100 گرم آب است.

$$100g H_3O \times \frac{0,34g}{2000g H_3O} = 0,02g \text{ حل شونده (نمک)}$$

اگر انحلال‌پذیری بین 1% تا 1 باشد، ماده کم محلول است.

۱۴۵ آب باران در هوای پاک تقریباً خالص است، این فرآیند تقطیر نام دارد و فرآورده آن آب م قطر است.

۱۴۶



۱۴۷ زیست‌کره شامل گانداران روی کره زمین است و در واکنش‌های آن‌ها درشت مولکول‌ها نقش اساسی ایفا می‌کنند.

۱۴۸ با توجه به معادله انحلال‌پذیری این ماده، مقدار حل شونده را در 100 گرم آب محاسبه می‌کنیم تا انحلال‌پذیری

ماده در شرایط داده شده بدست بیاید:

$$1) S = 0,3(0) + 27 \Rightarrow S = 27g \xrightarrow[\text{آب}]{\text{آب}} \frac{27g}{100g} = 0,27g = \text{انحلال‌پذیری}$$

پس باید $0,27g$ ماده در 100 گرم آب حل بشود که کمتر از مقدار مورد نظر در شکل است: محلول سیر نشده است.

$$2) S = 0,3(10) + 27 \Rightarrow S = 30g \Rightarrow \frac{30g}{100g} = 0,3g = \text{انحلال‌پذیری}$$

در این شکل محلول سیر شده است.

$$3) S = 0,3(20) + 27 = 33g \Rightarrow \frac{33g}{100g} = 0,33g = \text{انحلال‌پذیری}$$

و مقدار $0,33g$ حل شونده در 100 گرم آب باید حل بشود تا محلول سیر بشود اما $0,33g > 0,27g$ پس محلول

فراسیر شده است.

$$4) S = 0,3(30) + 27 = 36g \Rightarrow \text{آب} = 100g \times \frac{36g}{\text{آب}} = 36g \text{ ماده}$$

۳۶ < ۳۵ محلول سیر نشده است.

۱۴۹ عبارت‌های الف و ب درست هستند.

بررسی عبارت‌های نادرست:

پ و ت) آب دارای پیوند هیدروژنی و H_2S دارای نیروی جاذبه واندروالسی است. آب به علت داشتن نیروی جاذبه بین مولکولی قوی‌تر، نقطهٔ جوش بالاتری دارد و در دمای اتاق به حالت مایع است ولی H_2S به حالت گازی می‌باشد.

۱۵۰ گشتاور دوقطبی اغلب هیدروکربن‌ها ناچیز و در حدود صفر است.

۱۵۱ توجه: در ترکیب‌های مولکولی مانند: F_2 , Cl_2 , Br_2 و I_2 به علت داشتن نیروی جاذبه بین مولکولی از نوع واندروالس با افزایش حجم و جرم مولکول دمای جوش افزایش می‌یابد.

بررسی گزینه‌های نادرست:

۱) همگی مولکول ناقطبی هستند.

۲) نیروی بین مولکولی در یہ قوی‌تر است. (در توجه بالا توضیح داده شده است).

۳) مولکول ناقطبی در میدان الکتریکی جهت‌گیری ندارد.

۱۵۲

$$1) ?g NaOH = 100ml \times \frac{1L \text{ محلول}}{1000ml \text{ محلول}} \times \frac{0,01 mol NaOH}{1L \text{ محلول}} \times \frac{40g NaOH}{1mol NaOH} = 0,04g NaOH$$

$$2) ?g NaOH = 100g \times \frac{1ml \text{ محلول}}{2,13g \text{ محلول}} \times \frac{1L \text{ محلول}}{1000ml \text{ محلول}} \times \frac{0,1 mol NaOH}{1L \text{ محلول}} \times \frac{40g NaOH}{1mol NaOH} = 0,188g NaOH$$

$$3) ?g NaCl = 5ml \times \frac{1,2g \text{ محلول}}{1ml \text{ محلول}} \times \frac{20g NaCl}{100g \text{ محلول}} = 1,2g NaCl$$

$$4) ?g Na_2SO_4 = 0,6mol Na_2SO_4 \times \frac{142g Na_2SO_4}{1mol Na_2SO_4} = 56,8g Na_2SO_4$$

۱۵۳ ۱) چون غلظت یون کلرید در محلول حاصل خواسته شده پس ابتدا تعداد مول یون Cl^- را در هر دو محلول بدست

می‌آوریم:

$$\text{محلول : } ?mol Cl^- = 100ml \times \frac{1L \text{ محلول}}{1000ml \text{ محلول}} \times \frac{0,08mol KCl}{1L \text{ محلول}} \times \frac{1mol Cl^-}{1mol KCl} = 0,008 mol Cl^- KCl$$

$$CaCl_2 \text{ محلول : } ? mol Cl^- = 1000ml \times \frac{1L \text{ محلول}}{1000ml \text{ محلول}} \times \frac{0,01 mol CaCl_2}{1L \text{ محلول}} \times \frac{2mol Cl^-}{1mol CaCl_2} = 0,002 mol Cl^-$$

جرم کل یون کلرید موجود در محلول حاصل برابر است با

$$?g Cl^- = 0,01 mol Cl^- \times \frac{35,5g Cl^-}{1mol Cl^-} = 0,355g Cl^-$$

\Leftrightarrow برای محلول‌های بسیار رقیق مانند آب که دارای چگالی $\frac{g}{ml}$ هستند ($1g = 1ml$)

۱۰۰ml KCl م محلول ۱۱۰۰g یا محلول ۱۱۰۰ml $+ 1000ml CaCl_2$

$$ppm(Cl^-) = \frac{\text{جرم حل شونده}}{\text{حجم محلول}} \times 10^6 \Rightarrow ppm = \frac{0,355}{1100} \times 10^6 \simeq 322,73$$



بررسی گزینه‌های نادرست: ۱ ۲ ۳ ۴ ۱۵۴

۱) ماده‌ای که در میدان الکتریکی جهت‌گیری می‌کند، قطبی است و نقطهٔ جوش بالاتری دارد.

۲) در جرم‌های برابر از آب و یخ، بخ جرم بیشتر و چگالی کم‌تری دارد.

۳) نقطهٔ جوش HCl بیشتر از F_2 می‌باشد زیرا مولکول HCl قطبی و F_2 مولکول ناقطبی می‌باشند.

۴) طبق قانون هنری در دمای ثابت، با افزایش فشار انحلال‌پذیری گازها در آب افزایش می‌باید پس نمودارها باید ۱۵۵

سیر صعودی داشته باشند (رد گزینه ۲ و ۴)

انحلال‌پذیری گاز CO_2 با وجود ناقطبی بودن از گاز NO که مولکول قطبی است بیشتر است. چون جرم مولی آن بیشتر است. و گاز NO به دلیل قطبی بودن انحلال‌پذیری بیشتری نسبت به گاز N_2 دارد.

بررسی گزینه‌ها: ۱ ۲ ۳ ۴ ۱۵۶




۱) حداقل (بیشترین مقدار ماده) ۲۶ گرم از این نمک را می‌توان در ۱۰۰ گرم آب با دمای $25^\circ C$ حل کرد.

$$\text{نمک } \frac{26g}{126g} = \frac{2,52g}{\text{ محلول}} \times \text{ محلول}$$

۳) در اینگونه بیماران، مقدار نمک‌های کلسیم‌دار در ادرار از انحلال‌پذیری آنها بیشتر است.

۴) محلول حاصل سیر نشده بدست می‌آید.

۱ ۲ ۳ ۴ ۱۵۷



۱ ۲ ۳ ۴ ۱۵۸ همهٔ موارد درست است.

الف) تعداد اتم‌های یک واحد سازنده از ترکیب‌های B و D به ترتیب برابر ۱۴ و ۱۳ می‌باشد. پس اختلاف آنها برابر با یک است.ب) تعداد الکترون‌های جابه‌جا شده بین کاتیون و آنیون در ترکیب‌های A و D برابر با ۶ است.پ) با جابه‌جایی کاتیون‌های A و D خواهیم داشت: $AlPO_4$, $CaSO_4$ که تعداد اتم‌های اکسیژن در آن‌ها برابر است.ت) کلسیم فسفات دارای انحلال‌پذیری کوچکتر از $10^\circ C$ است پس نامحلول در آب است.

۱ ۲ ۳ ۴ ۱۵۹

$$\text{مولاریته} = \frac{n}{v}$$

www.my-dars.ir

چون در حجم یکسان تعداد مول ذرهٔ حل‌شونده در A بیشتر است پس غلظت مولی محلول A دو برابر محلول B است.اگر محلول A را به دو بخش هم حجم تقسیم کنیم، غلظت در هر بخش تغییری نمی‌کند ولی دو برابر غلظت محلول B می‌شود.

۱ ۲ ۳ ۴ ۱۶۰ عبارت‌های (ب) و (ت) نادرست هستند.

بررسی عبارت‌های نادرست:

ب) در فشار $9atm$ ، $9,6 \times 10^{-3} mol$ گرم NO در ۱۰۰ گرم آب حل می‌شود.

$$\text{?mol } NO = 0,06g NO \times \frac{1 \text{ mol } NO}{40g NO} = 0,002 \text{ mol } NO$$

ت) مولکول NO یک مولکول قطبی است و نیروی بین مولکولی در آن قوی‌تر است و افزایش فشار بیشترین تأثیر را در انحلال‌پذیری آن در آب دارد.



بررسی عبارت‌های نادرست: ۱ ۲ ۳ ۴ ۱۶۱

ب) مولکول قطبی و F_2 ناقطبی است پس نقطه جوش HCl بیشتر از F_2 می‌باشد. (البته چون جرم‌های نزدیک به هم دارند قطبیت مؤثرer است)

پ) مولکول CO قطبی است و گشتاور دوقطبی آن صفر نیست.

ث) کلسیم سولفات کم محلول در آب ولی نقره کلرید در آب نامحلول است.

۱ ۲ ۳ ۴ ۱۶۲

$$ppm = \frac{(Ca^{2+}) \text{ g}}{\text{ محلول g}} \times 10^6 \Rightarrow 40 = \frac{x}{500} \times 10^6 \Rightarrow x = 0,02 \text{ g } Ca^{2+}$$

$$\begin{aligned} ?ml Ca(NO_3)_2 &= 0,02 \text{ g } Ca^{2+} \times \frac{1 \text{ mol } Ca^{2+}}{40 \text{ g } Ca^{2+}} \times \frac{1 \text{ mol } Ca(NO_3)_2}{1 \text{ mol } Ca^{2+}} \\ &\times \frac{1 \text{ L}}{0,05 \text{ mol } Ca(NO_3)_2} \times \frac{1000 \text{ mol}}{1 \text{ L}} = 10 \text{ ml } Ca(NO_3)_2 \end{aligned}$$

فقط عبارت (ب) درست است. ۱ ۲ ۳ ۴ ۱۶۳


بررسی عبارت‌ها:

الف) در اثر این واکنش رسوب سفید رنگ نقره کلرید ($AgCl$) تشکیل می‌شود.

(ب)

$$\frac{\text{ جرم حل شونده}}{\text{ جرم محلول}} \times 100 = \frac{\left\{ \begin{array}{l} NaCl \rightarrow \frac{23 \text{ g Na}}{58,5 \text{ g NaCl}} \times 100 = \% 39,32 \\ AgNO_3 \rightarrow \frac{14 \text{ g N}}{170 \text{ g AgNO}_3} \times 100 = \% 8,23 \end{array} \right\}}{\frac{8,23}{39,32}} = 0,2$$

(پ)



$$?g AgCl = 58,5 \text{ g NaCl} \times \frac{1 \text{ mol NaCl}}{58,5 \text{ g NaCl}} \times \frac{1 \text{ mol AgCl}}{1 \text{ mol NaCl}} \times \frac{143,5 \text{ g AgCl}}{1 \text{ mol AgCl}} = 143,5 \text{ g AgCl}$$

ت) غلظت این یون در طول واکنش ثابت می‌ماند

$$\begin{aligned} 170 \text{ g} \times \frac{1 \text{ mol}}{170 \text{ g}} &= 1 \text{ mol} \\ \uparrow & \\ \text{غله} \text{ت مولار} &= \frac{\text{mol}}{L} \Rightarrow \frac{1}{1} = 1 \\ \downarrow & \\ 500 + 500 &= 1000 \text{ ml} = 1 \text{ L} \\ \text{مخلوط نهایی} & \end{aligned}$$

فقط عبارت دوم درست می‌باشد. ۱ ۲ ۳ ۴ ۱۶۴

بررسی عبارت‌های نادرست:

* عبارت اول:

$$M_1 = \frac{\text{mol}}{L} = \frac{0,16}{0,05} = 3,2 \text{ mol} \cdot L^{-1}$$

$$M_f = \frac{\text{mol}}{L} = \frac{0,08}{0,05} = 1,6 \text{ mol} \cdot L^{-1}$$

مولاریتۀ این دو محلول برابر نیستند. زیرا تعداد مول‌ها در محلول (۱) دو برابر تعداد مول‌ها در محلول (۴) است پس غلظت مولار محلول (۱) بزرگ‌تر از غلظت مولار محلول (۴) است.



(۱) دو برابر غلظت مولار محلول (۴) است.

* عبارت سوم: نادرست است زیرا:

$$\text{مجموع مول ها در محلول (۱) و (۲)} = ۱۲ \times ۰,۰۲ = ۰,۲۴ \text{ mol} \Rightarrow M_{\text{مخلوط}} = \frac{۰,۲۴}{۰,۱} = ۲,۴ \text{ mol} \cdot L^{-1}$$

$$\text{حجم کل} = ۵۰ + ۵۰ = ۱۰۰ \text{ ml} = ۰,۱ \text{ L}$$

$$\left\{ \begin{array}{l} \text{مولاریتۀ محلول (۲)} \\ \text{حجم} = ۵۰ \text{ mol} = \frac{۰,۲۴}{۰,۰۵} = ۴,۸ \text{ mol} \cdot L^{-1} \end{array} \right.$$

عبارت چهارم: جرم ذرهای سازندهٔ دو محلول متفاوت است پس غلظت ppm یکسان نمی‌باشد.

عبارت پنجم: مولاریتۀ شکل‌های (۳) و (۴) و (۵) یکسان است و کمترین مولاریتۀ به هر سه شکل مربوط است.


۱۶۵ ۱ ۲ ۳ ۴ فقط عبارت‌های (ب و ت) درست هستند.

بررسی عبارت‌های نادرست:

الف) در ترکیب NH_4NO_3 , سه نوع عنصر N , H و O وجود دارند.


ب) شکل و فضا پرکن نیترات و کربنات از کتاب.

پ) تعداد یون‌ها در این دو ترکیب یونی متفاوت است.



$$\text{ت) } \frac{\text{کاتیون}}{\text{آنیون}} = \frac{۱}{۳} \quad Fe(NO_۳)_۳$$

۱ ۲ ۳ ۴ ۱۶۶



بررسی گزینه‌ها:

۱) از این واکنش برای شناسایی یون $Ca^{۲+}$ استفاده می‌شود که آرایش گاز نجیب $[Ar]_{۱,۸}$ را دارد.

(۲)

$$\frac{\text{مجموع ضرایب فرآورده‌ها}}{\text{مجموع ضرایب واکنش‌دهنده‌ها}} = \frac{۱ + ۶}{۳ + ۲} = \frac{۷}{۵} = ۱,۴$$

۳) در پایان واکنش یک رسوب سفید رنگ بوجود می‌آید نه محلول.

۴) فرآوردهٔ نامحلول کلسیم فسفات $Ca_۳(PO_۴)_۲$ می‌باشد و نسبت شمار آنیون به کاتیون در آن برابر $۶/۳ \approx ۲$ می‌باشد.

www.my-dars.ir

۱ ۲ ۳ ۴ ۱۶۷

$$\text{محلول g Cl}_۲(g) \times \frac{۱۰^۶ \text{ g}}{۸۰ \text{ g Cl}_۲(g)} = ۲ \times ۱۰^{+۴} \text{ g Cl}_۲(g)$$

$$\text{محلول g H}_۲O \times \frac{۱۰۰ \text{ cm}^۳ H_۲O}{۱ \text{ L H}_۲O} \times \frac{۱ \text{ g H}_۲O}{۱ \text{ cm}^۳ H_۲O} \times \frac{۱ \text{ mol}}{۱ \text{ g Cl}_۲(g)}$$

$$?g = 16 \text{ m}^۳ H_۲O \times \frac{۱۰۰ \text{ L H}_۲O}{۱ \text{ m}^۳ H_۲O}$$

۱۶۸ ۱ ۲ ۳ ۴ عبارت‌های (الف و ب) صحیح هستند.

بررسی عبارت‌های نادرست:

پ) در روش اسمز معکوس میکروب‌ها از آب جدا نمی‌شوند.

ت) بدون وجود پمپ ایجاد فشار نیز مولکول‌های آب از غشای نیمه‌تراوا عبور می‌کنند.

۱۶۹ ۱ ۲ ۳ ۴ بررسی گزینه‌های نادرست:

۱) گلاب دو آتشه محلول غلیظی از ترکیب‌های آلی در آب است.







- (۲) خواص یک محلول علاوه بر خواص حلال و حل شونده به مقدار هر یک از آنها بستگی دارد.
 (۳) ضد یخ محلول اتیلن گلیکول در آب است.

۱۷۵ ۱ ۲ ۳ ۴ **توجه:** الف) هگزان ناقطبی در آب نامحلول است و بر سطح آب قرار می‌گیرد پس چگالی آن از آب کمتر است و جرم آن نیز کمتر است.

$$\downarrow P = \frac{\downarrow M}{V}$$

۱۷۶ ۱ ۲ ۳ ۴ مقایسه یون‌های حل شده در آب دریا به صورت زیر است:
 $Br^- < CO_3^{2-} < K^+ < Ca^{2+} < Mg^{2+} < SO_4^{2-} < Na^+ < Cl^-$



۱۸۱ در دمای $25^\circ C$ و در 100 گرم آب، مقدار نمک حل شده کمتر از 1% می‌باشد پس یک ماده نامحلول در آب است.

$$Ca_3(PO_4)_2 = (3 \times 40) + 2(31 + 4 \times 16) = 310 \text{ g} \cdot mol^{-1}, \quad Ca_3(PO_4)_2 = A$$

$$?g PO_4^{3-} = 5 \times 10^{-4} g A \times \frac{1mol A}{310g A} \times \frac{2mol PO_4^{3-}}{1mol A} \times \frac{95g PO_4^{3-}}{1mol PO_4^{3-}} = 3,06 \times 10^{-4} g PO_4^{3-}$$

$$ppm = \frac{g \text{ حل شونده}}{g \text{ محلول}} \times 10^6$$

$$ppm = \frac{3,06 \times 10^{-4} g PO_4^{3-}}{100g} \times 10^6 = 3,06$$

گروه آموزشی عصر

www.my-dars.ir

۱۸۲ ۱ ۲ ۳ ۴ الف) F_2 مولکول ناقطبی و HCl مولکول قطبی است و HCl در میدان الکتریکی دارای جهت‌گیری می‌باشد. بررسی سایر عبارت‌ها:

- ب) HCl مولکول قطبی در میدان الکتریکی $(H - Cl)$ اتم کلر دارای سر جزئی بار منفی به سمت قطب مثبت قرار می‌گیرد.
- پ) نقطه جوش F_2 از HCl کمتر است و HCl مولکول قطبی با داشتن نیروهای بین مولکولی قوی‌تر آسان‌تر به مایع تبدیل می‌شود.
- ت) گشتاور دوقطبی F_2 برابر صفر و HCl بیشتر از صفر است. پس جمع گشتاورهای دوقطبی این دو مولکول صفر نیست.
- آ) آب در حالت مایع در پیوند هیدروژنی و در حالت جامد دارای ۴ پیوند هیدروژنی است و در حالت بخار پیوند هیدروژنی ندارد.



بررسی گزینه‌های نادرست:

- (۱) فقط عناصر (O , N , F) با اتم هیدروژن در تشکیل پیوند هیدروژنی شرکت می‌کنند.
- (۲) بین مولکول‌های آب هر اتم اکسیژن با پیوند هیدروژنی اتم هیدروژن را جذب می‌کند.
- (۳) اتانول با داشتن عامل ($-OH$) دارای نیروی بین مولکولی از نوع هیدروژنی و متان (CH_4) از نوع واندروالس است.

۱ ۲ ۳ ۴ ۱۷۶

$$\frac{\text{حجم حل شونده}}{\text{حجم محلول}} \times 100 = \text{درصد جرمی}$$

$$0,5 = \frac{\text{حجم حل شونده}}{50} \times 100 \Rightarrow \text{حجم حل شونده} = 0,25g$$

$$ppm = \frac{\text{حجم حل شونده}}{\text{حجم محلول}} \times 10^{-6}$$

$$ppm = \frac{0,25g}{(50 + 950)g} \times 10^{-6} = 250$$

۱۷۷ ابتدا جرم KCl مورد نیاز برای تهیه ۴۰۰ میلی‌لیتر محلول ۱,۰ مولار آن را محاسبه می‌کنیم:

$$xgKCl = 400mL KCl \times \frac{1L}{1000mL} \times \frac{0,1molKCl}{1L} \times \frac{74,5gKCl}{1molKCl} = 2,98gKCl$$

$$\frac{KCl}{\text{حجم محلول}} \times 100 \rightarrow 25 = \frac{2,98}{\text{حجم محلول}} \times 100 \Rightarrow 11,92g$$

۱۷۸ راه حل اول:

اگر ۱۰۰ گرم از این محلول داشته باشیم، ۱۶ گرم آن آمونیوم نیترات است.

$$?molNH_4NO_3 = 16gNH_4NO_3 \times \frac{1molNH_4NO_3}{80gNH_4NO_3} = 0,2molNH_4NO_3$$

$$?\text{ محلول} = 100g \times \frac{1mL}{\text{ محلول}} \times \frac{10^{-3}L}{1mL} \times \frac{\text{ محلول}}{1,2g} = \frac{1}{12}L$$

$$\frac{\text{مول حل شونده (mol)}}{\text{حجم محلول (L)}} \Rightarrow M = \frac{1}{12} = 2,4mol \cdot L^{-1}$$

راه حل دوم:

$$C = 10 \cdot a \cdot d \Rightarrow C = 10 \times 16 \times 1,2$$

$$C = 198g \cdot L^{-1}$$

$$\frac{198}{80} = \text{مولاریت} = 2,4mol \cdot L^{-1}$$

۱۷۹ در دمای $40^{\circ}C$ حدود ۶ گرم نمک در ۱۰۰ گرم آب، حل شده است.




طبق نمودار، اگر ۱۶۰ گرم محلول سیر شده را از دمای $C = ۴۰^{\circ}$ به $C = ۳۵^{\circ}$ سرد کنیم، جرم محلول به حدود ۱۴۵ گرم می‌رسد و $(145g - 140g) = ۵g$ نمک رسوب خواهد کرد. وقتی به ازای ۱۶۰ گرم محلول، ۱۵ گرم نمک رسوب می‌کند، به ازای ۴۸۰ گرم محلول، حدود ۴۵ گرم نمک رسوب خواهد کرد.

حال اگر بخواهیم این ۴۵ گرم رسوب را بدون افزایش دما در دمای $C = ۳۰^{\circ}$ حل کنیم، مطابق نمودار، تقریباً به ۱۰۰ گرم آب نیاز داریم.

۱۸۰ موارد «ب» و «پ» صحیح هستند، مورد «آ»:

- محیط بی‌اثر در جوشکاری - برش فلزات - ساخت لامپ‌های رشته‌ای	آرگون حاصل نقطیز جز به جز
- پر کردن بالن‌ها - جوشکاری - کپسول غواصی - خنک کردن قطعات الکترونیکی در دستگاه‌های MRI تصویربرداری ماند	هلیم حاصل واکنش‌های هسته‌ای در ژرفای زمین

مورد «پ»:



بیشترین ضربی استوکیومتری

مورد «ت»: وجود یون‌های Fe^{3+} در آب و تبدیل آن به یون‌های Fe^{3+} , سبب می‌شود هنگام چکه کردن شیرهای منزل پس از مدتی رسوب قهوه‌ای رنگ به وجود آید.

۱۸۱ ۱ گزینه «۱»: با اضافه کردن محلول باریم کلرید به محلول سدیم سولفات، ترکیب نامحلول باریم سولفات تشکیل می‌شود که ترکیبی سه‌تایی است.

گزینه «۲»: نام ترکیب $Zn(NO_3)_2$ به صورت روی نیترات بوده و سایر ترکیبات صحیح نام‌گذاری شده‌اند.

گزینه «۳»: آلومینیم کربنات: $Al_2(CO_3)_3 \leftarrow$ تعداد مول الکترون‌های مبادله شده برای تشکیل یک مول از این ترکیب: ۶

کروم (II) فسفات: $Cr_2(PO_4)_3 \leftarrow$ نسبت تعداد کاتیون به آنیون: $\frac{2}{3}$

$$\frac{6}{1} = 6 = 4 \quad \text{نسبت موردنظر}$$

www.my-dars.ir

گزینه «۴»: ترکیب باریم فسفید (Ba_3P_2) فقط دارای یون تک اتمی است، بنابراین ترکیب برخلاف آمونیوم نیترات (NH_4NO_3 ، فقط دارای پیوند یونی است).

۱۸۲ ۱ در فرایند اسمز، آب از محیط رقیق تر (A) به سمت محیط غلیظ تر (B) می‌رود و با گذشت زمان جرم و حجم مایع کاهش می‌یابد و از ۹۰ گرم $A \xrightarrow{90g H_2O \times 18g \cdot mol^{-1}} 90g H_2O$ کم تر می‌شود. جرم و حجم محلول B افزایش، اما غلظت محلول B کاهش می‌یابد. با وارد کردن نیرو بر محلول B، فرآیند اسمز معکوس روی می‌دهد و مولکول‌های آب از محلول غلیظ (B) به مایع (A) می‌روند و جرم مایع A از ۹۰ گرم بیشتر خواهد شد.

$$\frac{\text{جرم نمک ها در آب اقیانوس ها}}{\text{جرم آب روی کره زمین}} = \frac{5 \times 10^{16} \text{ تن}}{1,5 \times 10^{18} \text{ تن}} = \frac{1}{30}$$

- عبارت اول درست است.

- عبارت دوم درست است. همواره انحلال پذیری گازهای قطبی بیشتر از گازهای ناقطبی نیست در اینجا با این که گاز CO_2 مولکولهای ناقطبی دارد اما در فشار $1 atm$ و در هر دمایی، انحلال پذیری بیشتری نسبت به گاز NO که دارای مولکولهای قطبی است، دارد و دلیل آن واکنش CO_2 با آب می‌باشد.

- عبارت سوم درست است.

- عبارت چهارم نادرست است. دما با نحلال پذیری رابطه خطی ندارد.

$$\begin{cases} 25g & \text{محلول} \\ 75g & \text{آب} \\ 100g & \text{ محلول} \end{cases} \Rightarrow \frac{NaCl}{\text{آب}} = \frac{\text{جرم حل شونده}}{\text{جرم حل}} \times 100$$

$$\Rightarrow \frac{25}{75} \times 100 \approx 33,3g$$

برای تعیین نوع محلول ساخته شده به جرم حل شونده و حلال نیاز داریم:

$$NaCl \times \frac{58,5g NaCl}{1mol NaCl} = 3,51g NaCl$$

$$10mL \times \frac{1g}{1mL} = 10g$$

$$\left. \begin{array}{c} (3,51) \\ (100) \end{array} \right\rangle \frac{(انحلال پذیری)}{(جرم حل)} = \frac{3,51}{100}$$

مای درس

$$Pb^{3+} = 1000mL KI \times \frac{1L \text{ محلول } KI}{1000mL KI} \times \frac{0,15mol KI}{1L \text{ محلول } KI} \times \frac{1mol I^-}{1mol KI} \times \frac{1mol Pb^{3+}}{2mol I^-} \times \frac{20,8g Pb^{3+}}{1mol Pb^{3+}} = 31,2g Pb^{3+}$$

www.my-dars.ir

$$ppm = \frac{Pb^{3+}}{\text{جرم محلول}} \times 10^6 \Rightarrow ppm = \frac{31,2}{10^6} \times 10^6 = 31,2$$

$$(M_2) = 0,5 + \left(\frac{30}{100} \times 0,5 \right) = 0,65 \frac{mol}{L}$$

$$M = \text{غليظ} V \times \text{رقيق} V = \text{رقيق} M \times \text{رقيق} V$$

$$0,5 \times 0,25 = 0,65 \times V$$



$$\Rightarrow V = \frac{0,5 \times 0,25}{0,65} \simeq 0,192L = 192mL$$


حجم محلول پایانی باید $192mL$ باشد یا به عبارت دیگر $58 - 250$ از محلول رقیق باید تبخیر شود تا غلظت محلول اسید HCl افزایش یابد.

بررسی موارد: ۱ ۲ ۳ ۴ ۱۸۸


مورد (الف) $\text{Ca}_3(\text{PO}_4)_2$ اگرچه شامل ۵ یون است اما در آب نامحلول است و رسوب می‌باشد بنابراین رسانایی الکتریکی $\text{CaSO}_4 > \text{Ca}(\text{CO}_3)_2$ است.

مورد (ب) HCl یک اسید قوی است، پس محلول آن رسانای قوی برای جریان برق است.
مورد (پ) متانول در آب به صورت کاملاً مولکولی حل می‌شود و رسانایی الکتریکی ندارد.


۱ ۲ ۳ ۴ ۱۸۹



بررسی موارد: ۱ ۲ ۳ ۴ ۱۹۰



مورد (ب) صحیح است:



ماهی درس

گروه آموزشی عصر

www.my-dars.ir

مورد (پ) مولکول‌های AsH_3 و PH_3 که قادر به تشکیل پیوند هیدروژنی نیستند در دمای اتاق NH_3 نیز گاز است و قادر پیوند هیدروژنی است.

مورد (ت) جرم مولی AsH_3 بیشتر از PH_3 است؛ پس نیروهای واندروالسی قوی تری دارد.

بررسی موارد: ۱ ۲ ۳ ۴ ۱۹۱

مورد (الف) افزایش حجم آب بر اثر یخ زدن به دیواره بافت کلم آسیب می‌رساند. (نادرست)

مورد (ب) میله شیشه‌ای مالش داده شده با موی سر، باردار می‌شود و باریکه آب را منحرف می‌کند. (درست)

مورد (پ) و ت درست هستند.

بررسی موارد: ۱ ۲ ۳ ۴ ۱۹۲

مورد (الف) F_2 و N_2 هر دو ناقطبی‌اند و CO و HCl هر دو قطبی‌اند؛ بنابراین نقطه جوش ناقطبی



> قطبی است، لازم به ذکر است که هر ۴ ترکیب جرم مولی مشابه یا نزدیک به یکدیگر دارند.
مورد ب) هر چه قدر دمای جوش گازی بیشتر باشد، راحت‌تر به مایع تبدیل می‌شود؛ بنابراین CO راحت‌تر به مایع تبدیل می‌شود تا N_2 زیرا CO قطبی است و نقطه جوش بالاتری دارد.

مورد پ) در ترکیبات مولکولی با جرم مولی مشابه، ترکیب با مولکول‌های قطبی نقطه جوش بالاتری دارد.
مورد ت) صحیح است.

بررسی موارد: ۱ ۲ ۳ ۴ ۱۹۳

مورد الف) با عمود کردن از دمای $15^\circ C$ به هر یک از نمودارهای KCl و KNO_3 ، مقدار نمک حل شده در 100 g آب را تعیین می‌کنیم که برابر 18 g برای KCl و برای 28 g برای KNO_3 نمک نیاز است تا محلول سیر شده تهیه شود که براساس محاسبات زیر برای 50 g آب در هر دو محلول بیشتر از 5 g نیاز است؛ بنابراین هر دو سیر نشده هستند
بررسی مورد ب)

$$\text{نمک } KCl \times \frac{18\text{ g}}{100\text{ g}} = 14\text{ g} \quad (\text{نمک } KCl) > 5\text{ g}$$


$$\text{نمک } KNO_3 \times \frac{18\text{ g}}{100\text{ g}} = 9\text{ g} \quad (KNO_3) > 5\text{ g}$$

مورد پ)

$$\begin{aligned} A &= \left\{ \begin{array}{l} \text{حل شونده } 35\text{ g} \\ \text{درصد جرمی نمک‌ها در نقطه } A \\ \text{ محلول } 135 \end{array} \right. \Rightarrow w/w\% = \frac{35}{135} \times 100 = 25,9 \\ \text{نمک } KCl &\times \frac{25\text{ g}}{100\text{ g}} = 5\text{ g} > 5\text{ g} \quad (\text{نمک } KCl) > 5\text{ g} \end{aligned}$$

مورد ت) ترکیب یونی دوتایی KCl و ترکیب یونی سه‌تایی KNO_3 است.

بررسی موارد: ۱ ۲ ۳ ۴ ۱۹۴



$$M = n/V \Rightarrow$$

$$M_{Na^+} = \frac{0,375}{0,5} = 0,75 \quad M_{PO_4^{3-}} = \frac{0,125}{0,5} = 0,25$$

$$0,75 - 0,25 = 0,5$$

بررسی موارد: ۱ ۲ ۳ ۴ ۱۹۵

$$x = gr? \left\{ \begin{array}{l} 200\text{ mL} \\ 0,5 \frac{\text{mol}}{\text{lit}} \end{array} \right.$$

ابتدا به کمک فرمول غلظت مولار، مول اسید را تعیین می‌کنیم:



$$M = \frac{n}{v} \Rightarrow 0,5 = \frac{n}{0,2} \Rightarrow n_{HCl} = 0,1 \text{ mol}$$

$$0,1 \text{ mol } HCl \times \frac{1 \text{ mol } Mg}{1 \text{ mol } HCl} \times \frac{24 \text{ gr } Mg}{1 \text{ mol } Mg} = 1,2 \text{ g } \cdot Mg$$

۱ ۲ ۳ ۴ ۱۹۶

$$mLH_2 = 200 \text{ mL } HCl \times \frac{1 \text{ L}}{1000 \text{ mL}} \times \frac{0,5 \text{ mol } HCl}{1 \text{ L } HCl} \times \frac{2 \text{ mol } H_2}{5 \text{ mol } HCl} \times \frac{2 \text{ g } H_2}{1 \text{ mol } H_2} = 0,1 \text{ g } H_2$$

$$gH_2O = 0,1 \text{ g } H_2 \times \frac{1 \text{ mol } H_2}{2 \text{ g } H_2} \times \frac{2 \text{ mol } H_2O}{2 \text{ mol } H_2} \times \frac{18 \text{ g } H_2O}{1 \text{ mol } H_2O} = 0,9 \text{ g } H_2O$$

در اين دما و فشار ۱ مول از هر گازی برابر ۲۵ لیتر است؛ بنابراین چگالی آب به صورت گاز هم ۲۵ لیتر است.

$$H_2 \text{ چگالی} = \rho = \frac{m}{V} = 0,08 \text{ g/l} = \frac{2 \text{ : یک مول}}{V} = 25$$

$$H_2O \text{ لیتر} = 0,9 \text{ g } H_2O \times \frac{25 \text{ L}}{18 \text{ g } H_2O} = 1,25 \text{ L}$$

۱ ۲ ۳ ۴ ۱۹۷

$$CaBr_2 = 40 + (2 \times 80) = 200 \text{ g } \cdot mol^{-1}$$

$$gCaBr_2 = 2 \text{ mol } CaBr_2 \times \frac{200 \text{ gr } CaBr_2}{1 \text{ mol } CaBr_2} = 400 \text{ g } CaBr_2$$

$$\text{ محلول } 1200 \text{ g} = \text{ محلول } 1L \times \frac{1000 \text{ mL}}{1 \text{ lit}} = \text{ چگالی محلول}$$

$$\frac{\text{ جرم حل شونده}}{\text{ جرم محلول}} \times 100 = \frac{400}{1200} \times 100 = 33,3 \text{ درصد جرمی}$$

بررسی موارد: ۱ ۲ ۳ ۴ ۱۹۸


مورد الف) حالت *I*، جامد، *II* مایع و *III* گاز است بنابراین در حالت گاز مولکولهای آب آزادانه و نامنظم از جایی به جایی دیگر می‌روند.

مورد ب) از آنجا که حجم بیشتر از آب است پس چگالی آن کمتر از آب است.

مورد پ) آب تنها در حالت‌های مایع و جامد پیوند هیدروژنی تشکیل می‌دهد.

مورد ت) با توجه به شکل این عبارت صحیح است.

www.my-dars.ir



گزینه‌های الف، ب و ت صحیح هستند.

بررسی گزینه‌پ) به مرور زمان و با جابجا شدن مولکولهای آب به سمت محلول رقیق، غلظت محلول غلیظ زیاد می‌شود و درنتیجه فشار



بیشتری برای جابجایی مولکول‌های آب لازم است.

۱ برسی گزینه‌ها: ۲۰۰

گزینهٔ ۱: صحیح است.

گزینهٔ ۲: مولکول CO_2 ناقطبی است و در میدان الکتریکی جهت گیری نمی‌کند.

گزینهٔ ۳: مولکول CO_2 ناقطبی است، اما دارای پیوندهای کووالانسی قطبی است.

گزینهٔ ۴: مولکول CO_2 چون ناقطبی است، پس نقطهٔ جوش کمتری دارد؛ اما از آنجا که نیروهای بین مولکولی در H_2O قوی‌تر است، پس آسان‌تر مایع می‌شود.

۱ برسی موارد: ۲۰۱

مورد (الف) آلمینیوم فسفات ($AlPO_4$) است و آهن (II) آرسنات ($Fe_3(AsO_4)_2$) است.

مورد (ب) در Fe_3O_4 ، ۳ یون آهن و ۴ یون اکسید (O^{2-}) وجود دارد و از آنجا که ترکیب بار ندارد؛ بنابراین:

$$3Fe - \lambda = 0 \Rightarrow$$

$$3Fe = +\lambda$$

$$Fe = \lambda/3$$

چون بار کسری نداریم، پس نتیجهٔ می‌گیریم ۲ تا از Fe^{2+} هستند و یکی Fe^{3+} از طرفی فرمول آهن (III) منگنات به صورت Fe_3O_4 است که در آن به صورت Fe^{3+} است؛ زیرا منگنات (MnO_4^-) است.

۱ نزدیک ۷۵ درصد سطح زمین (نه جرم زمین) را آب پوشانده است. ۲۰۲

۱ برسی عبارت‌های نادرست: ۲۰۳

ب) $NaCl$ زیرا Na^+ و Cl^- فراوان ترین یونها هستند.

پ) کوه‌های یخ جزء منابع آب شیرین قابل استفاده نمی‌باشند.

۱ برسی گزینه‌های نادرست: ۲۰۴

گزینهٔ «۱»: مقایسهٔ غلظت برخی از این یون‌ها بر حسب میلی‌گرم به کیلوگرم آب دریا به صورت: $CO_3^{2-} < Ca^{2+} < Mg^{2+} < SO_4^{2-}$ صحیح است.

گزینهٔ «۳»: مقدار یون کلرید محلول در آب می‌تواند از انحلال ترکیب‌های یونی دوتایی کلردار مختلفی به وجود آید و صرفاً نمی‌توان گفت مربوط به سدیم کلرید است. اگر تمام Cl^- حاصل از $NaCl$ باشد پس نباید غلظت Cl^- بزرگ‌تر از Na^+ باشد.

گزینهٔ «۴»: جرم کل مواد حل شده در آب‌های کره زمین تقریباً ثابت است.

۱ برسی موارد: ۲۰۵

آب g	حل شونده g
۱۰۰	$2,5 \times 10^{-3}$
۵۰۰۰	x

جرم حل شونده (اکسیژن) $= ۱۲۵g$

$$?mmolO_2 = ۰,۱۲۵gO_2 \times \frac{1molO_2}{۳۲gO_2} \simeq ۰,۰۰۳۹molO_2 = ۳,۹mmolO_2$$

۱ برسی موارد: ۲۰۶

$$100mL \times \frac{1,3g}{1mL} = 130g = \text{جرم محلول}$$



$$\frac{\text{جرم حل شونده}}{\text{جرم محلول}} \times 100 = \frac{\text{درصد جرمی}}{130} \Rightarrow 20 = \frac{\text{جرم حل شونده}}{100} \times 100 \Rightarrow \text{جرم حل شونده} = 20 - 26 = 130 - 26 = 104g$$

انحلال پذیری KNO_3 در دمای $30^\circ C$ به تقریب ۴۵ گرم در ۱۰۰ گرم آب است، پس این محلول سیر نشده است.

$$\frac{20}{100} : \text{دمای } 10^\circ C = \frac{x}{104} \Rightarrow x = 20,8g \Rightarrow \text{جرم رسوب} = 26 - 20,8 = 5,2g$$

۲۰۷ موارد «پ» و «ت» درست هستند.

بررسی سایر موارد:

موردن(f) گشتاور دوقطبی H_2S بزرگتر از صفر است.

موردن(b) استون فاقد پیوند هیدروژنی است.

۲۰۸ بررسی گزینه ها:

گزینه (۱)

$$\begin{aligned} ?gCl^- &= 0,05gFeCl_3 \times \frac{1mol}{162,5g} \times \frac{3molCl^-}{1molFeCl_3} \times \frac{35,5g}{1mol} = 0,0327gCl^- \\ ppmCl^- &= \frac{Cl^- \text{ یون}}{\text{جرم کل محلول}} \times 10^6 = \frac{0,0327}{1000} \times 10^6 = 32,7ppm \end{aligned}$$

گزینه (۲)

$$\begin{aligned} ?gCl^- &= 0,1gKCl \times \frac{1mol}{74,5g} \times \frac{1molCl^-}{1molKCl} \times \frac{35,5g}{1mol} = 0,0476gCl^- \\ ppmCl^- &= \frac{0,0476}{1000} \times 10^6 = 47,6ppm \end{aligned}$$

گزینه (۳)

$$\begin{aligned} ?gCl^- &= 0,05gCaCl_2 \times \frac{1mol}{111g} \times \frac{2molCl^-}{1molCaCl_2} \times \frac{35,5g}{1mol} = 0,032gCl^- \\ ppmCl^- &\approx \frac{0,032}{1000} \times 10^6 = 32ppm \end{aligned}$$

گزینه (۴)

$$\begin{aligned} ?gCl^- &= 0,05gNaCl \times \frac{1mol}{58,5g} \times \frac{1molCl^-}{1molNaCl} \times \frac{35,5g}{1mol} = 0,030gCl^- \\ ppmCl^- &= \frac{0,030}{1000} \times 10^6 = 30ppm \end{aligned}$$

۲۰۹ رسانایی الکتریکی در محلولی بیشتر است که تعداد یون بیشتری داشته باشد. به این ترتیب، محلول ۲۰ مولار شامل ۴۰ مول یون، محلول ۱۰ مولار $MgCl_2$ شامل ۳۰ مول یون، محلول ۲۰ مولار $AlCl_3$ شامل ۶۰ مول یون و محلول $NaCl$ شامل ۱۰ مول یون است. رسانایی الکتریکی محلول های ۱۰ مولار $NaCl$ و $NaNO_3$ به تقریب مشابه هم است.

۲۱۰ در هیچ یک از روش های صافی کربن، تقطیر و اسمز معکوس، میکروب ها از بین نمی روند.

۲۱۱ آب شور در مصارف کشاورزی هم قابل استفاده نیست.

$$KCl \text{ در محلول } molCl^- = 0,2 \times 0,2 = 0,04molCl^-$$



$$CaCl_2 \text{ در محلول } mol Cl^- = 0,25 \times 0,1 \times 2 = 0,05 mol Cl^-$$

= مجموع مول های به دست آمده برای Cl^- در محلول $0,09 mol$

$$\frac{0,09 mol}{0,45 L} = 0,2 mol \cdot L^{-1}$$

۲۱۳ بررسی موارد:

(آ) ترکیب های یونی در حالت جامد رسانای جریان برق نمی باشند.

(ب) محلول HF رسانای ضعیف جریان برق (الکتروولیت ضعیف) است و محلول اتانول به دلیل اتحال مولکولی غیر الکتروولیت است.

(پ) وجود یون پتاسیم (K^+) برای تنظیم و عملکرد مناسب دستگاه عصبی بسیار ضروری است.

۲۱۴ ابتدا گنجایش مقدار آب در هر مخزن را محاسبه می کنیم:


$$V = 4 \times 4 \times 4 = 64 m^3 = 64 \times 10^3 L$$

$$?gH_2O = 64 \times 10^3 L \times \frac{1000 mL}{1 L} \times \frac{1 g}{1 mL} = 64 \times 10^6 gH_2O$$

سپس کلر مورد نیاز برای هر مخزن:

$$?gCl^- = 64 \times 10^6 gH_2O \times \frac{142 gCl^-}{10^6 gH_2O} = 9088 gCl^-$$

و در نهایت مقدار $CaCl_2$ لازم را محاسبه می کنیم:



$$?kg CaCl_2 = 9088 gCl^- \times \frac{1 mol Cl^-}{35,5 g Cl^-} \times \frac{1 mol CaCl_2}{2 mol Cl^-} \times \frac{111 g CaCl_2}{1 mol CaCl_2} \times \frac{1 kg CaCl_2}{1000 g CaCl_2} \sim 14,2 kg CaCl_2$$

روازنی از ۵ مخزن استفاده می شود:

$$5 \times 14,2 = 71 kg$$

www.my-dars.ir

۲۱۵ موارد ب و پ صحیح می باشند.

بررسی سایر موارد:

مورد (الف) در نمودار اتحال پذیری هر چه شبی نمودار بیشتر باشد وابستگی به دما بیشتر می شود

مورد (ت) با کاهش دما اتحال پذیری لیتیم سولفات افزایش می یابد و اتحال پذیری $NaCl$ کاهش می یابد.

۲۱۶ گزینه های الف و ت صحیح هستند.

بررسی سایر موارد:

مورد (ب) تعداد مول های C_2H_5OH و H_2O را محاسبه می کنیم:



$$50gH_2O \times \frac{1molH_2O}{18gH_2O} = 2,78mol$$

$$100gC_2H_5OH \times \frac{1molC_2H_5OH}{46gC_2H_5OH} = 2,17mol$$

تعداد مول‌های H_2O بيشتر است، پس حلal است.
مورد پ) آب دريای مرده (بحرالمیت) فقط دارای چنین ویژگی است.

۱ ۲ ۳ ۴ ۲۱۷

$$\left\{ \begin{array}{l} 500ml \\ \text{مولار} 8,0 \end{array} \right. \text{ محلول اولیه}$$

$$\left\{ \begin{array}{l} x mL \\ \text{مولار} 0,08 \end{array} \right. \text{ محلول رقیق}$$


$$\text{مول} = \frac{x}{0,5lit} \Rightarrow \text{مولاریته محلول اولیه} = \frac{0,8}{0,5} = 1,6 molNaOH$$

با افزودن آب محلول شونده تغییر نمی‌کند، يعني

$$\text{مول} = \frac{\text{مول}}{\text{حجم}} = \frac{0,4}{x} \Rightarrow x = 5lit \Rightarrow 5 - 0,5 = 4,5lit = 4500mL$$




بررسی موارد: ۱ ۲ ۳ ۴ ۲۱۸

مورد الف) آمونیوم فسفات دارای فرمول $(NH_4)_3PO_4$ است.



تعداد پیوندهای کووالانسی در کاتیون و آئیون ۴ تاست.

مورد ب)



مورد ت) در آمونیوم فسفات نسبت اتم‌ها به عنصرها $\frac{5}{4}$ است. در حالی که در $Fe_3(SO_4)_2$ اين نسبت $\frac{20}{3}$ است.

بررسی موارد: ۱ ۲ ۳ ۴ ۲۱۹

مورد الف) در نوع و مقدار حلشونده با يكديگر تفاوت دارند.

مورد ب) ۲,۸ درصد از منابع آب کره، غير اقيانوسی است که از اين مقدار $2,15$ درصد به کوه‌های يخ مربوط است:

$$\frac{2,15}{2,8} \times 100 = 76\% > \frac{3}{4}$$

مورد پ) لاشه جانوران و گیاهان پس از تجزیه به صورت مولکول‌های کوچک‌تر وارد آب کره، هواکره و سنگ‌کره می‌شوند.

مورد ت) زمین از دیدگاه شیمیایی پویاست؛ يعني بخش‌های گوناگون آن با يكديگر برهم کنش‌های فیزیکی و شیمیایی دارند؛ از جمله انحلال برخی نمک‌ها در آب.

بررسی موارد: ۱ ۲ ۳ ۴ ۲۲۰

موراد الف و ب و پ صحیح هستند.

مورد ت) هر چقدر رد پای آب ایجاد شده سنگین‌تر باشد، منابع آب شیرین زودتر مصرف و تمام می‌شوند.

بررسی موارد: ۱ ۲ ۳ ۴ ۲۲۱



مورد الف) آمونیوم سولفات $(NH_4)_2SO_4$ ، عناصر N و S را در اختیار گیاه قرار می‌دهد.
مورد ب) صحیح است.

مورد پ) سدیم آزید و کلسیم آزید دارای فرمول NaN_3 و $Ca(N_3)_2$ هستند.

مورد ت) کاتیون Mn^{2+} به صورت $MnSO_4$ است:



1 2 3 4 ۲۲۲

مورد الف) فراوانی کاتیون‌های گروه اول بیشتر از گروه دوم است.

مورد ب) صحیح است.

مورد پ) برای حفظ سلامت دندان‌ها، یون فلوئورید را می‌افزایند نه گاز فلوئور را.

مورد ت) صحیح است.

1 2 3 4 ۲۲۳

گزینه ۱) گشتاور دو قطبی، کمیتی است که با افزایش قطبیت، افزایش می‌یابد.

گزینه ۲) مولکول‌هایی که دارای هیدروژن متصل به F ، O و N هستند، توانایی تشکیل پیوند هیدروژنی را دارند؛ بنابراین NH_3 می‌تواند F_2 نمی‌تواند.

گزینه ۳) به جز پیوند هیدروژنی، به نیروهای جاذبه بین مولکولی، نیروهای واندروالسی می‌گویند.

گزینه ۴) مولکول H_2O با ساختار  است که O جذب قطب مثبت و H ها جذب قطب منفی می‌شوند.

1 2 3 4 ۲۲۴

گزینه ۱) برای شناسایی یون Ba^{2+} از محلول سدیم سولفات استفاده می‌شود تا رسوب سفیدرنگ $BaSO_4$ ایجاد شود.

گزینه ۲) در محصول نماد $AgCl$ باید جامد (S) باشد.

گزینه ۳) صحیح است.

گزینه ۴) دو ماده جامد به طور مستقیم با یکدیگر واکنش نمی‌دهند.

1 2 3 4 ۲۲۵

$$ppm = \frac{KNO_3 \text{ جرم}}{\text{جرم محلول}} \times 10^6 \Rightarrow 500 = \frac{x}{250} \times 10^6 \Rightarrow x = 0,125g$$

حال جرم یون NO_3^- را محاسبه می‌کنیم:

$$0,125g KNO_3 \times \frac{1 mol KNO_3}{101g KNO_3} \times \frac{1 mol NO_3^-}{1 mol KNO_3} \times \frac{62g NO_3^-}{1 mol NO_3^-} = 0,077g NO_3^-$$

در مرحله بعد جرم یون NO_3^- موجود در کلسیم نیترات را محاسبه می‌کنیم:

$$0,042g Ca(NO_3)_2 \times \frac{1 mol Ca(NO_3)_2}{116g Ca(NO_3)_2} \times \frac{2 mol NO_3^-}{1 mol Ca(NO_3)_2} \times \frac{62g NO_3^-}{1 mol NO_3^-} = 0,044$$

$$ppm = \frac{0,044 + 0,077}{250} \times 10^6 = 30.8 ppm$$

1 2 3 4 ۲۲۶

بررسی سایر موارد:


مورد الف) تجزیه لاشه جانداران بر اثر واکنش‌های شیمیایی ارتباط زیست‌کره و هواکره را نشان می‌دهد.



مورد ب) فراوان ترین کاتیون Na^+ _{۱۱} و فراوان ترین آنیون Cl^- _{۱۷} است که اولی به آرایش الکترونی Ne _{۱۰} و دومی به آرایش الکترونی Ar _{۱۸} رسیده است.


بررسی موارد: ۱ ۲ ۳ ۴ ۲۲۷

مورد گزینه الف) آنیون ترکیبات b و d , سولفات (SO_4^{2-}) است که ۴ جفت الکترون پیوندی (پیوند کووالانسی) دارد.



مورد ب) ترکیب a دارای فرمول $Fe(NO_3)_2$ است و ترکیب C دارای فرمول $Cr_2(CO_3)_3$ است که هر دو دارای ۹ اتم O هستند، که این نسبت $\frac{9}{9} = 1$ است.

مورد پ) صحیح است:



بررسی موارد: ۱ ۲ ۳ ۴ ۲۲۸

مورد الف)

$$Mg(NO_3)_2 : 24 + 28 + 96 = 148 g \cdot mol^{-1}$$

$$M = \frac{10ad}{148} = \frac{10 \times 80 \times 1/5}{148} \approx 1,11 \text{ مول مولی}$$

مورد ب)

$$\frac{\text{مول حل شونده}}{\text{حجم محلول (lit)}} = \frac{x}{0,5} \Rightarrow 1,11 = \frac{x}{0,5} \Rightarrow x \approx 0,55 mol Mg(NO_3)_2 \text{ مولاریته}$$

به ازای هر مول منیزیم نیترات، ۰,۵۵ مول نیترات تولید می شود؛ یعنی: $2 \times 0,55 = 1 mol NO_3^-$

بررسی موارد: ۱ ۲ ۳ ۴ ۲۲۹

مورد الف) Na^+ و Cl^- ، بیشترین مقدار یون ها در آب دریا هستند.

مورد ب) درشت مولکول ها نقش اساسی را در زیست کرده ایفا می کنند.

مورد پ) کوه های یخی پس از اقیانوس ها با $15/2$ درصد از وسعت زمین

موردت) 66 درصد از مردم جهان از آبی رنج می برند.

تنها در گزینه ۱ دو گزینه صحیح و دو گزینه ناصحیح وجود دارد.

۱ ۲ ۳ ۴ ۲۳۰ انحلال پذیری گرم حل شونده را در 100 گرم آب بیان می کند.

بررسی I)

$$ppm = \frac{V}{10^6} \times \frac{V \times 10^{-4}}{100} \text{ یا نامحلول } 100 < 10^{-4}$$

بررسی II).

$$37 mol A \times \frac{148 g A}{1 mol A} = 5476 g A$$



$$\frac{4576 \text{ gA}}{1480000 \text{ gH}_2\text{O}} = \frac{x}{100 \text{ gH}_2\text{O}} \Rightarrow x = 0,37 \text{ g}$$

مورد (الف) با توجه به نمودار در دمای 30°C ، احلال پذیری NaNO_3 است و در دمای 10°C ، احلال پذیری NaNO_3 بنا بر این کم محلول است.

بررسی موارد: ۱ ۲ ۳ ۴ ۲۳۱

مورد (الف) با توجه به نمودار در دمای 30°C ، احلال پذیری NaNO_3 است و در دمای 10°C ، احلال پذیری NaNO_3 است که:

$$95 - 80 = 15 \text{ g}$$

$$450 \text{ g NaNO}_3 \times \frac{15 \text{ g}}{100 \text{ g} + \frac{95 \text{ g}}{\text{آب NaNO}_3}} = 34,6 \text{ g NaNO}_3$$

مورد (ب) با توجه به نمودار احلال پذیری KNO_3 در دمای 40°C برابر ۶ گرم است.

$$60 \text{ g KNO}_3 \times \frac{1 \text{ mol KNO}_3}{101 \text{ g KNO}_3} = 0,58 \text{ mol KNO}_3 = 0,58 \text{ mol KNO}_3 \times 100 + 60 = 160 \text{ g}$$

$$\frac{m}{V} = \frac{160}{V} \Rightarrow 1,3 = \frac{160}{V} \Rightarrow V = 123 \text{ mL} \text{ یا } 123 \text{ L}$$

$$\frac{n}{V} = \frac{0,5}{0,123} = 4 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$$

بررسی گزینه ها: ۱ ۲ ۳ ۴ ۲۳۲

گزینه (۱) از آنجا که شب نمودار منفی است؛ بنا بر این می تواند نمودار Li_2SO_4 باشد که احلال پذیری آن با دما کاهش می یابد.

گزینه (۲) احلال پذیری در دمای 10°C به صورت زیر است:

$$S = -0,17 \times (100) + 37 = 20 \text{ gr}$$

یعنی در ۲۴۰ گرم محلول، ۲۰ گرم نمک وجود دارد.

$$\frac{20 \text{ g}}{100 \text{ gH}_2\text{O}} = \frac{40 \text{ gr}}{200 \text{ gH}_2\text{O}}$$

گزینه (۳) از آنجا که نمودار Li_2SO_4 ، نزولی است و نمودار NaNO_3 صعودی است؛ پس با افزایش دما، احلال پذیری این دو نمک از هم دور می شود.

گزینه (۴) در دمای 0°C ، احلال پذیری 37 g است. در ۲۰۰ گرم آب، ۷۴ گرم محلول شونده حل می شود که با توجه به شکل ۳۷ گرم از ۷۴ گرم کمتر است \Leftrightarrow محلول سیرنشده است.

بررسی موارد: ۱ ۲ ۳ ۴ ۲۳۳

مورد (الف) دستگاه قند خون میلی گرم گلوکز را در دسی لیتر خون نشان می دهد.

$$\frac{\text{مول حل شونده}}{\text{لیتر محلول}} = \frac{x}{0,024} = \frac{x}{0,1 \text{ Lit}}$$

$$\Rightarrow x = 24 \times 10^{-4} \text{ mol} \times \frac{180 \text{ g}}{1 \text{ mol}} \times \frac{1000 \text{ mg}}{1 \text{ g}} = 432 \text{ mg}$$

مورد (ب) جرم NaOH در محلول اولیه:



$$ppm = \frac{\text{جرم حل شونده}}{\text{جرم محلول}} \times 10^6 \Rightarrow 280 = \frac{x}{500}$$

اگر مقدار a گرم آب به محلول اضافه کنیم:

$$x = 140000g$$

$$70 = \frac{140000}{a + 500} \Rightarrow 70a + 35000 = 140000 \Rightarrow 70a = 105000 \Rightarrow a = 1500g$$


بررسی موارد: ۱ ۲ ۳ ۴ ۲۳۴

مورد (الف) آنیون های کلرید و فسفات به ترتیب برای شناسایی کاتیون های Ag^+ و Ca^{2+} استفاده می شود که طی آن رسوب سفیدرنگ نقره کلرید و کلسیم فسفات تولید می شود.

مورد (ب)



مورد (پ)



$$\frac{\text{آنیون}}{\text{کاتیون}} = \frac{1}{1}$$

مورد (ت) نقره نیترات و سدیم نیترات هر دو در آب محلولند؛ بنابراین برای شناسایی یون سدیم نمی توان استفاده کرد.

بررسی موارد: ۱ ۲ ۳ ۴ ۲۳۵

مورد (الف)



$$\frac{H}{O} = \frac{1}{3} = 1$$

مورد (ب)

$$Li_2SO_4 \quad \frac{\text{اتم}}{\text{عنصر}} = \frac{7}{3}$$

$$Mn_2(CO_3)_3 \quad \frac{\text{اتم}}{\text{عنصر}} = \frac{14}{3}$$


ما درس

گروه آموزشی عصر

مورد (پ) در $CaCl_2$ نسبت آنیون به کاتیون ۲ است. در AlN نسبت کاتیون به آنیون یک است.

مورد (ت) در $(NH_4)_2SO_4$ ، ۱۲ پیوند اشتراکی وجود دارد:

www.my-dars.ir



ابتدا باید معادله انحلال پذیری پتانسیم کلرید را به دست بیاوریم:

$$S - 40 = \frac{50 - 40}{75 - 45}(T - 45) \Rightarrow S = \frac{1}{3}T + 25$$

دمایی را که محلول الان در آن قرار دارد به دست می آوریم:



$$\begin{array}{c|c} \text{KCl} & \text{گرم آب} \\ \hline 120 & 300 \\ x & 100 \end{array} \Rightarrow x = \frac{100 \times 120}{300} = 40 \text{ g KCl}$$

پس در اين دما، ۴۰ گرم KCl در ۱۰۰g آب حل شده است. يعني دماي ۴۵°C

$$S = \frac{1}{3}T + 25 \xrightarrow{T=70} S = \frac{1}{3} \times 70 + 25 \approx 48,33 \text{ g KCl}$$

بنابراین در دماي ۷۰°C مقدار ۴۸,۳۳ گرم KCl در ۱۰۰g آب حل شده است.

$$\frac{48,33}{148,33} \times 100 \approx 32,6\%$$

بررسی گزینه ها: ۱ ۲ ۳ ۴ ۲۳۷

گزینه «۱»: پیوند هیدروژنی HF قوی تر از NH_۳ است. به همین دليل نقطه جوش NH_۳ باید کمتر از HF باشد.

گزینه «۲»: قطبیت مولکول H_۲O بیش تر از H_۲S است.

گزینه «۳»: پیوند هیدروژنی نوعی جاذبه بین مولکولی است و ضعیف تر از پیوند کوالانسی می باشد.

گزینه «۴»: به هنگام تبخیر آب، بر پیوند هیدروژنی غلبه می شود.

از يك مول از اين ترکيب ۴ مول یون در آب حاصل می شود. ۱ ۲ ۳ ۴ ۲۳۸



$$\frac{0,016}{4} = 0,004 \frac{\text{mol}}{\text{L}} P^{3-}$$

$$= \frac{m}{V} \Rightarrow V = \frac{m}{\rho} = \frac{2,28}{1,14} = 2l = 2000 \text{ mL} \cdot g P^{-3} = 0,004 \frac{\text{mol}}{\text{L}} P^{3-} \times \frac{31g P^{3-}}{1 \text{ mol } P^{3-}} = 0,124 \frac{g}{\text{L}} P^{3-} \times 2L = 0,248 \text{ g } P^{3-}$$

$$\text{محلول} = 2000 \text{ mL} \times \frac{1,14 \text{ g}}{1 \text{ mL}} = 2280 \text{ g}$$

$$ppm = \frac{\text{جرم حل شونده}}{\text{جرم محلول}} \times 10^6 = \frac{0,248}{2280} \times 10^6 \approx 108,8$$

ماي درس

گروه آموزشی عصر

www.my-dars.ir

۱ ۲ ۳ ۴ ۲۳۹

حل شونده (g)	محلول سير شده (g)
۲۲۰	۱۲۰
X	۱۵۰

محلول = ۲۷۵g




$$?mL \times \frac{1mL}{1,1g} = 250mL = 275g \text{ محلول}$$

بررسی موارد نادرست: ۱ ۲ ۳ ۴ ۲۴۰


مورد «ب»: آب اقیانوس‌ها و دریاها مخلوطی همگن است که اغلب مزه‌ای شور دارد.

مورد «ت»: تفاوت آب آشامیدنی و دیگر آب‌ها در نوع و مقدار حل شونده‌های آن‌هاست.

۲۴۱ در میان آنیون‌های چند اتمی موجود در آب دریا، مقدار یون سولفات از همه بیشتر است. کاتیونی که بیش از کاتیون‌های دیگر در آب دریا موجود است، یون سدیم می‌باشد.



فراوانی یون‌های تک اتمی به صورت طبق واکنش: ۱ ۲ ۳ ۴ ۲۴۲




در میان محصولات، کلسیم فسفات، رسوب و سدیم کلرید محلول است.

بررسی سایر گزینه‌ها:


گزینه ۱: $(NH_4)_2CO_3$ دارای واحدهای یونی چند اتمی آمونیوم و کربنات می‌باشد.

گزینه ۲:




گزینه ۳: آمونیوم سولفات با فرمول $(NH_4)_2SO_4$ ، اتم‌های نیتروژن و گوگرد را در اختیار گیاه قرار می‌دهد.

۲۴۳ مطابق معادله زیر: ۱ ۲ ۳ ۴



۲۴۴ تنها مورد «الف» نادرست است. ۱ ۲ ۳ ۴



بررسی سایر موارد:

ب) قهوه‌ای رنگ



ماهی درس



ت) از سوختن بنزین گازهای CO , H_2O و CO_2 تولید می‌شود که بی‌رنگ هستند.
www.my-dars.ir

۱ ۲ ۳ ۴ ۲۴۵

$$CrO \rightarrow a = \frac{1}{1} \text{ نسبت کاتیون به آنیون ۲}$$

$$Cr_2O_7 \rightarrow a = \frac{2}{3} \text{ نسبت کاتیون به آنیون ۵}$$

$$MgCl_2 \rightarrow b = \frac{1}{2} \text{ نسبت کاتیون به آنیون ۳}$$

بررسی سایر گزینه‌ها:


گزینه (۳):



خ

دیجه

جباری



تعداد الکترون‌های با $l = 2$ کاتیون Cr^{3+} برابر ۳ است.

گزینه (۱):

$$a = 2, 5 \quad , \quad b = 3 \Rightarrow |b - a| = 1, 2$$

اختلاف a و b , ۳ نمی‌شود.

گزینه (۲): a و b زمانی بزرگ‌ترین هستند که $MgCl_2$ و Cr_2O_3 داشته باشیم.


۱ ۲ ۳ ۴ ۲۴۶

$$Fe_2(SO_4)_3 \Rightarrow 17 \text{ اتم}$$

$$Ca_3(PO_4)_2 \Rightarrow 13 \text{ اتم}$$

$$(NH_4)_2CO_3 \Rightarrow 14 \text{ اتم}$$

$$Al(NO_3)_3 \Rightarrow 13 \text{ اتم}$$



۱ ۲ ۳ ۴ ۲۴۷

$$\frac{1L \text{ محلول}}{1000mL \text{ محلول}} \times \frac{0.2mol NaOH}{1L \text{ محلول}} \times \frac{40g NaOH}{1mol NaOH} = 4g NaOH$$

$$\frac{1L \text{ محلول}}{1000mL \text{ محلول}} \times \frac{0.6mol NaOH}{1L \text{ محلول}} \times \frac{40g NaOH}{1mol NaOH} = 12g NaOH$$


$$\Rightarrow \text{حجم NaOH افزوده شده} = 12 - 4 = 8g$$

۱ ۲ ۳ ۴ ۲۴۸

بررسی سایر موارد:

مورد «ب»: آمونیوم سولفات ($(NH_4)_2SO_4$) دارای ۱۵ اتم است و منیزیم هیدروکسید ($Mg(OH)_2$) ۵ اتم دارد.

مورد «پ»: هر دو نسبت بیان شده برابر ۲ می‌باشد. در $(NH_4)_2SO_4$ نسبت کاتیون به آنیون برابر ۲ است. در $Mg(NO_3)_2$ نیز نسبت آنیون به کاتیون برابر ۲ است.




www.my-dars.ir

۱ ۲ ۳ ۴ ۲۴۹

بررسی موارد:

مورد «الف»: مولکول‌های H_2O در حالت بخار از یکدیگر جدا هستند به طوری که پیوند هیدروژنی بین آن‌ها بسیار ناچیز است و گویی وجود ندارد.

مورد «ب»: پیوندهای بین مولکولی هیدروژنی از پیوندهای کووالانسی بین اتم‌ها ضعیف‌تر است، به گونه‌ای که وقتی مولکول آب به بخار تبدیل می‌شود پیوندهای هیدروژنی از بین می‌رود؛ اما پیوندهای کووالانسی بین اتم‌ها H و O برقرار می‌ماند.



مورد «پ»: در ساختارهای شش ضلعی بیخ، اتم‌های اکسیژن در رأس حلقه‌های شش ضلعی قرار دارند.
مورد «ت»: از آنجا که آب در هنگام بخ زدن افزایش حجم دارد بنابراین چگالی بخ از آب کمتر است.

۱ ۲ ۳ ۴ ۲۵۰


$$\frac{\text{حجم حل شونده}}{\text{حجم محلول اولیه}} = \frac{10}{100} \times 100 \Rightarrow \frac{x}{100} = \frac{20}{200} \Rightarrow x = 20g \quad \text{درصد جرمی محلول اولیه}$$

$$\frac{\text{حجم حل شونده}}{\text{حجم محلول ثانویه}} = \frac{20}{100} \times 100 \Rightarrow \frac{20 + y}{200 + y} = \frac{25}{100} \Rightarrow y = 25g \quad \text{درصد جرمی محلول ثانویه}$$

۱ ۲ ۳ ۴ ۲۵۱

مورد الف) با استفاده از جریان برق، منیزیم کلرید مذاب به عنصرهای سازنده اش تجزیه می‌شود.

$$?mol C_6H_{12}O_6 = 1L \times \frac{10dL}{1L} \times \frac{100mg}{1dL} \times \frac{1mol}{180000mg} \simeq 5,5 \times 10^{-3}$$




۱ ۲ ۳ ۴ ۲۵۲

$$\frac{\text{حجم محلول}}{\text{حجم محلول چگالی}} = \frac{1g \cdot mL^{-1}}{xg \cdot mL^{-1}} \Rightarrow x = 80g \quad \text{حجم محلول}$$

$$\frac{\text{حجم حل شونده}}{\text{حجم محلول}} = \frac{ygK_2SO_4}{80g} \times 100 \Rightarrow 60 = \frac{ygK_2SO_4}{80g} \times 100 \Rightarrow y = 48gK_2SO_4$$

با توجه به معادله تفکیک K_2SO_4 ، مقدار مول یون سولفات را به دست می‌آوریم:



$$?mol SO_4^{2-} = 48gK_2SO_4 \times \frac{1mol K_2SO_4}{174gK_2SO_4} \times \frac{1mol SO_4^{2-}}{1mol K_2SO_4} = 0,28mol SO_4^{2-}$$

$$\frac{\text{مول حل شونده}}{\text{حجم محلول}} = \frac{0,28mol}{0,08L} = 3,5mol \cdot L^{-1} \quad \text{غلظت}$$

۱ ۲ ۳ ۴ ۲۵۳

$$S = -0,15\theta + 36$$

$$\left. \begin{array}{l} S = -0,15(20) + 36 = 33 \\ S = -0,15(70) + 36 = 25,5 \end{array} \right\} \Rightarrow 33 - 25,5 = 7,5$$

ضریب θ منفی است. پس با افزایش دما انحلال پذیری کاهش می‌یابد.

حجم محلول در دمای ۲۰ درجه سلسیوس:

$$100 + 33 = 133g$$



$$\frac{رسوب}{رسوب - ۳۰g} = \frac{۱۲۳g}{۵۳۲g} \times \text{ محلول سيرشده} = ۳۰g$$

۳۰ گرم ماده حل شونده رسوب می‌کند و جرم محلول سيرشده در دمای C° برابر ۵۰۲ گرم است.
بررسی گزینه ۳ و ۴: از آنجا که شيب منفي است انحلال پذيری گرماده است و با افزایش دما محلول از سيرشده به سيرشده جدید و رسوب تبدیل می‌شود.

۱ ۲ ۳ ۴ ۲۵۴ همه عبارت‌های ييان شده درست هستند.

بررسی موارد:

مورد (الف) با توجه به نمودار، انحلال پذيری، انحلال پذيری $NaNO_3$ در دمای $30^{\circ}C$ بيشتر از انحلال پذيری KNO_3 در همين دما است.
مورد (ب) با توجه به نمودار، انحلال پذيری KNO_3 در دمای $35^{\circ}C$ برابر ۵۰ گرم در ۱۰۰ گرم آب است. پس با اضافه کردن ۵۰ گرم نمک به ۵۰ گرم آب تنها ۲۵ گرم از آن حل می‌شود، بنابراین، ۷۵ گرم محلول سيرشده خواهیم داشت.

۱۰۰ گرم آب	۵۰ گرم نمک
۵۰ گرم نمک	۱۰۰ گرم آب

$$\text{ محلول} = ۷۵g = ۵۰ + ۲۵ = \text{ جرم حل شونده} + \text{ جرم حلال} = \text{ جرم محلول}$$

مورد (پ) با افزایش دما انحلال پذيری سدیم کلرید با شيب ملایمی افزایش می‌یابد.

مورد (ت) چون شيب نمودار انحلال پذيری KCl بيشتر از KNO_3 است؛ بنابراین تأثير دما بر انحلال پذيری KNO_3 بيشتر خواهد بود.

۱ ۲ ۳ ۴ ۲۵۵

$$\frac{xgNaOH}{\text{ جرم محلول}} = \frac{xgNaOH}{100} \times 100$$

$$25 = \frac{xgNaOH}{100} \times 100 \Rightarrow x = 20gNaOH$$

$$\text{?molNaOH} = 20gNaOH \times \frac{1\text{molNaOH}}{40gNaOH} = 0,5\text{molNaOH}$$

$$\text{تعداد مول حل شونده} = \frac{0,5}{\text{ لیتر محلول}} \Rightarrow 2 = \frac{0,5}{\text{ لیتر محلول}}$$

$$250mL = 0,25L = \text{ حجم محلول}$$

۱ ۲ ۳ ۴ ۲۵۶ پيوند هيدروژني، قوي ترین نيروي بين مولکولي در موادی است که در مولکول آنها، اتم هيدروژن به يكی از اتم های F, N, O با پيوند اشتراکي متصل است.

www.my-dars.ir


۱ ۲ ۳ ۴ ۲۵۷ بيشترین مقدار از يك حل شونده را که در دمای معين در ۱۰۰ گرم حلال حل می‌شود، انحلال پذيری می‌نامند.

۱ ۲ ۳ ۴ ۲۵۸ در ميان منابع غيراقيانوسی، کوه‌های يخ بيشترین سهم را به خود اختصاص می‌دهد.

۱ ۲ ۳ ۴ ۲۵۹ یونی که از اتصال دو یا چند اتم تشکیل شده است، یون چنداتمی نام دارد. یون‌های SO_4^{2-} و N_3^- هر دو یون چنداتمی هستند.

۱ ۲ ۳ ۴ ۲۶۰ بررسی عبارت‌ها:

مورد (الف) H_2S در دمای اتاق، گاز است. (غلط)مورد (ب) جرم مولی H_2S از آب بيشتر و نقطه جوش آن از آب كمتر است. (صحیح)مورد (پ) H_2S دارای مولکول‌های قطبی است. (غلط)

مورد ت) مولکول H_2S ساختاری خمیده دارد. (غلط)

۱ ۲ ۳ ۴ ۲۶۱

$$\text{تعداد کاتیون} : Mg(OH)_2 = \frac{1}{2}$$

تعداد آنیون

$$\text{تعداد آنیون} : NaNO_3 = \frac{1}{1}$$

تعداد کاتیون

$$\text{تعداد آنیون} : (NH_4)_2CO_3 = \frac{1}{2}$$

تعداد کاتیون

$$\text{تعداد آنیون} : NH_4OH = \frac{1}{1}$$

تعداد کاتیون تعداد کاتیون


$$\text{تعداد آنیون} : FeSO_4 = \frac{1}{1}$$

تعداد کاتیون

۱ ۲ ۳ ۴ ۲۶۲

بررسی مورد نادرست:

مورد ت) در یون های چنداتمی بار الکتریکی به اتم خاصی تعلق نداشته و متعلق به کل یون است.



۱ ۲ ۳ ۴ ۲۶۳

مولکول های قطبی در میدان الکتریکی جهت گیری می کنند.

مولکول های قطبی: H_2O, NH_3, CO, HCl مولکول های ناقطبی: CH_4, CO_2, N_2

۱ ۲ ۳ ۴ ۲۶۴

ابتدا محلول سدیم هیدروکسید را رقیق می کنیم و غلظت جدید را به دست می آوریم:

$$C_{m1} V_1 = C_{m2} V_2 \Rightarrow 5 \times 10 = C_{m2} \times 100 \Rightarrow C_{m2} = 0,5 \text{ مولار}$$

$$?mL NaOH(aq) = 2mL H_2SO_4(aq) \times \frac{1,4g H_2SO_4(aq)}{1mL H_2SO_4(aq)} \times \frac{49g H_2SO_4}{100g H_2SO_4(aq)} \times \frac{1mol H_2SO_4}{98g H_2SO_4}$$

$$\times \frac{2mol NaOH}{1mol H_2SO_4} \times \frac{1L NaOH(aq)}{0,5mol NaOH} \times \frac{1000mLNaOH(aq)}{1L NaOH(aq)} = 56mL NaOH(aq)$$

روش دوم:

$$C_m = \frac{10ad}{M} = \frac{10 \times 49 \times 1,4}{98} = 7MH_2SO_4$$




$$\frac{2mL \times 7M}{1} = \frac{xmL \times 0,5}{2} \Rightarrow x = 56mL$$

۱ ۲ ۳ ۴ ۲۶۵

انحلال سدیم کلرید در آب برخلاف انحلال اتانول در آب، یونی است و مولکول های قطبی آب از سرهای مخالف به یون های شبکه بلور نزدیک شده، نیروی جاذبه ای میان آن ها برقرار می شود. این نیروی جاذبه، یون - دوقطبی نام دارد و باعث تشکیل یون های $Na^+(aq)$ (شکل ۱) و یون های $Cl^- (aq)$ شود. در این فرآیند انحلال، ماده حل شونده ویژگی ساختاری خود را حفظ نکرده است و یون های سازنده شبکه بلور یونی، تفکیک و آپوشیده شده اند.



ساختار آب به صورت زیر است که سر (+ و -) مولکول را می‌توان به درستی تشخیص داد.



۲۶۶ به طور کلی نیروی بین حل شونده و حلال زمانی از (نیروی بین ذرات حلال + نیروی بین ذرات حل شونده) بیشتر می‌شود که انحلال خود به خودی انجام شود.

برای ترکیب‌های $AgNO_4$, $BaCl_2$, Na_2S , $MgSO_4$ که در آب حل می‌شوند و محلول هستند، داریم: میانگین قدرت پیوند یونی در ترکیب و پیوندهای هیدروژنی در آب \geq (نیروی جاذبه یون - دوقطبی در محلول)

۲۶۷ اتانول C_2H_5OH و استون C_2H_4O از جمله حلال‌های آلی به شمار می‌روند که به دلیل قطبی بودن و توانایی تشکیل پیوند هیدروژنی، می‌توانند به هر نسبتی در آب حل شوند و محلول سیر شده در آن‌ها معنا ندارد.

۲۶۸


$$\text{جرم حل شونده} + \text{جرم حلال} = \text{جرم محلول}$$

$$144 = x + 69 \Rightarrow x = 75g$$


$$\frac{75g}{50g} \underset{x}{\mid} \frac{\text{حل}}{\text{حل شونده}} = \frac{69g}{x} \Rightarrow x = 46$$

۲۶۹ جمله‌های «الف» و «ت»، درست هستند.

انحلال پذیری گاز کربن دی‌اکسید بیشتر از گاز نیتروژن مونوکسید است، زیرا مولکول‌های CO_2 با آب وارد واکنش می‌شوند.



مورد (الف) بر اساس نمودار زیر صحیح است.



مورد (ب) بر اساس قانون هنری تغییرات انحلال پذیری با تغییرات فشار رابطه مستقیم دارند.

۲۷۰ گاز اکسیژن گازی، ناقطبی با جرم مولی $32g \cdot mol^{-1}$ است. گاز A باید دارای حداقل یکی از ویژگی‌های زیر باشد:

www.my-dars.ir

(۱) قطبی باشد. (مانند NO)

(۲) جرم مولی بیشتر از $32g \cdot mol^{-1}$ داشته باشد. (مانند Cl_2 با جرم مولی $71g \cdot mol^{-1}$ و CO_2 با جرم مولی $44g \cdot mol^{-1}$)



(۳) با آب واکنش دهد:

۲۷۱ اطلاعات داده شده در ردیف ۲ و ردیف ۴ جدول نادرست بیان شده است.

علامت مقایسه در ردیف ۲ باید به صورت < علامت مقایسه در ردیف ۴ باید به صورت > باشد.

نکته: $BaSO_4$ در آب نامحلول و $MgSO_4$ در آب محلول می‌باشد.

نکته: وقتی یک انحلال خود به خودی انجام می‌شود، نیروهای جاذبه حل شونده - حل بزرگ‌تر از حالت اولیه حل جدأ و حل شونده جدا هستند.



۲۷۲ به منظور محاسبه انحلال پذیری باید جرم حل شونده در $100^{\circ}C$ از حلال را محاسبه کنیم:

$$\text{حل شونده } 16,66g \times \frac{150g}{100g} \simeq \text{حل شونده } 25g \Rightarrow 150 - 25 = 125g : \text{مقدار حل شونده}$$

$$\text{حل شونده } 25g \times \frac{100g}{125g} = 20g : \text{انحلال پذیری حل شونده}$$

$$S_{(A-10)} = 100g \times \frac{(25 - 5)g}{125g} = 16g$$

$$\Rightarrow S_2 - S_1 = \frac{16 - 20}{(A - 10) - A} = \frac{4}{10}$$

۲۷۳ بررسی سایر گزینه ها:


گزینه ۱: $NaCl$ در آب محلول بوده و به طور کامل به یون تفکیک می شود و محلول آن الکتروولیت قوی می باشد.

به طور جزئی به یون تفکیک شده و محلول آن الکتروولیت ضعیف است.

گزینه ۲: هر ترکیبی که به خوبی به یون تفکیک شود، الکتروولیت قوی است؛ ولی در صورتی می تواند رسانای خوبی برای جریان برق باشد که غلظت یون های آن در آب زیاد باشد.

گزینه ۴: در قانون هنری، وابستگی انحلال پذیری گازها به تغییرات فشار، مورد بررسی قرار می گیرد.

۲۷۴ مولکول های CO_2 و SO_3 به دلیل ناقطبی بودن، گشتاور دوقطبی برابر با صفر دارند:



بررسی سایر گزینه ها:

گزینه ۱: $\ddot{O} = \ddot{O}$ غیر قطبی $\rightarrow \mu = 0$ قطبی $H-O-H$ غیر قطبی ها

گزینه ۲: $H-C-H$ غیر قطبی $\rightarrow \mu \neq 0$ قطبی ها

گزینه ۴: $H-F$ قطبی $\rightarrow \ddot{O} = \ddot{O}$ غیر قطبی


۲۷۵ با توجه به جداول زیر و تشکیل پیوند هیدروژنی بین مولکول های O_2 , H_2O , NH_3 و HF گزینه های ۱، ۲ و ۴ صحیح می باشد.

نقطه جوش (°C)	حالت فیزیکی (25°C)	جرم مولی (gmol⁻¹)	قطبیت مولکول	مدل فضایپرکن	فرمول شیمیایی	ماده
100	مایع	18	قطبی		H_2O	آب
-60	گاز	34	قطبی		H_2S	هیدروژن سولفید



ترکیب مولکولی	جرم مولی ($gmol^{-1}$)	نقطه جوش ($^{\circ}C$)
HF	۲۰	۱۹
HCl	۳۶,۵	-۸۵
HBr	۸۱	-۶۷
NH_3	۱۷	-۳۳,۵
PH_3	۳۴	-۸۷,۵
AsH_3	۷۸	-۶۲,۵

نقطه جوش اتانول از نقطه جوش آب کمتر است (در شرایط یکسان) می‌توان نوشت:



بررسی سایر گزینه‌ها: ۱ ۲ ۳ ۴ ۲۷۶

گزینه «۱»: الف) درصد جرمی را با نماد $W/W\%$ نشان می‌دهند که هم‌ارز با شمار قسمت‌های حل شونده در ۱۰۰ قسمت محلول است.

گزینه «۲»: برای بیان ساده‌تر غلظت محلول‌های بسیار رقیق از کمیتی به نام ppm استفاده می‌شود که نشان می‌دهد در یک میلیون گرم (۱۰۰۰ کیلوگرم) از محلول، چند گرم حل شونده وجود دارد.

گزینه «۴»: غلظت مولی (مولار) محلول بیانگر تعداد مول‌های حل شونده در یک لیتر محلول است.


بررسی گزینه‌ها: ۱ ۲ ۳ ۴ ۲۷۷

گزینه «۱»: نمودار مورد نظر مربوط به ترکیب‌های هیدروژن‌دار و از عنصرهای گروه‌های ۱۶ یا ۱۷ جدول دوره‌ای می‌باشد، اما نمی‌تواند مربوط به ترکیب‌های PH_3 , NH_3 و AsH_3 باشد، زیرا نقطه جوش هر سه ماده بر حسب درجه سلسیوس منفی است.

گزینه «۲»: بین مولکول‌های ماده A می‌تواند پیوند هیدروژنی برقرار شود.

گزینه «۳»: گشتاور دوقطبی ماده A از ماده B بیشتر است.

گزینه «۴»: در ساختار لوویس ماده B بیش از یک جفت الکترون ناپیوندی وجود دارد، زیرا اگر نمودار داده شده مربوط به گروه ۱۶ باشد، B همان H_2S و اگر مربوط به گروه ۱۷ باشد، B همان HCl است.



مای درس

کروه‌آموزشی عصر

www.my-dars.ir

می‌توانیم ترتیب زیر را نیز به خاطر بسپاریم (در نقطه جوش):

۱۴: گروه $CH_4 < SiH_4 < GeH_4$

۱۵: گروه $NH_3 > SbH_3 > PH_3$

۱۶: گروه $H_2O > H_2Te > H_2S$

۱۷: گروه $HF > HBr > HCl$

ابتدا معادله انحلال پذیری نمک سدیم نیترات را به دست می‌آوریم: ۱ ۲ ۳ ۴ ۲۷۸

$$S = ۰,۸\theta + ۷۲ \Rightarrow \theta = ۲۲,۵ \Rightarrow S = ۱۸ + ۷۲ = ۹۰ g / ۱۰۰ g H_2O$$


$$\text{محلول} \times \frac{۹۰ g NaNO_3}{۱۹۰ g NaNO_3} = ۱۸ g$$

$$\text{درصد جرمی} = \frac{\text{جرم حل شونده}}{\text{جرم محلول}} \times ۱۰۰ \Rightarrow ۵۰ = \frac{S}{۱۰۰ + S} \times ۱۰۰ \Rightarrow S = ۱۰۰ g / ۱۰۰ g H_2O$$

حال با استفاده از معادله انحلال پذیری دما را به دست می‌آوریم:



$$S = 0,8\theta + 72 \Rightarrow 100 = 0,8\theta + 72 \Rightarrow \theta = 35^\circ C$$



$$1440g_{AgNO_3} \times \frac{1ml \text{ محلول}}{1,2g \text{ محلول}} \times \frac{0,5mol AgNO_3}{1000ml \text{ محلول}} \times \frac{1mol KCl}{1mol AgNO_3} \times \frac{74,5g KCl}{1mol KCl} = 44,7g_{KCl}$$

با توجه به اينکه انحلال پذيری نمک KCl در دمای C در دمای $25^\circ C$ برابر 50 گرم است.

$$\text{نمک باقیمانده در محلول} = \frac{\frac{50g}{450g} \times 150g}{150g} = 150g - 44,7g = 105,3g$$

$$\text{مقدار آب موجود در محلول} = 450 - 150 = 300g$$

$$\text{جرم نمک} = \frac{105,3}{300} \times 100 = 35,1 g / 100g H_2O$$

که با توجه به نمودار، دمای مورد نظر برابر $30^\circ C$ یا $30^\circ K$ است.

۲۸۰ رد پاي آب نشان مي دهد که هر فرد چه مقدار از آب قابل استفاده و در دسترس مصرف مي کند، درنتيجه چه مقدار از حجم منابع آب کم مي شود.

۲۸۱ افزودن استون به آب و همچنين يد به هگزان منجر به تشکيل محلول مي شود درحالی که افزودن هگزان به آب، مخلوطی ناهمنگ پديد مي آورد.

استون و آب هر دو نقطبي اند و از آنجا که شبие، شبие را حل مي کند؛ پس در يكديگر محلولند.

۲۸۲ از آنجا که ييشتر مواد غذائي حاوي یون پتاسييم است، كمبود آن به ندرت احساس مي شود.
بررسی سایر گزینه ها:

گزینه ۱: محیط شیمیایی مناسب برای ایجاد و برقراری جریان الکتریکی در بدن، يك محلول آبی محتوى یون های گوناگون است.

گزینه ۲: نياز روزانه بدن هر فرد بالغ به یون پتاسييم دو برابر یون سدیم است.

گزینه ۴: اختلال در حرکت یون های پتاسييم مانع از انتقال پیام های عصبی شده و گاهی در موارد شدید منجر به مرگ مي شود.

۲۸۳ **۱ ۲ ۳ ۴** موارد (الف) و (ت) صحیح هستند.

بررسی سایر موارد:

مورد (ب): آب تصفیه شده به روش تقطیر را باید پیش از مصرف کلرزنی کرد.

مورد (پ): هنگامی که خiar را در آب شور قرار دهیم، چروکیده می شود.

مورد (ت): مقدار آب موردنیاز برای تولید يك کيلوگرم گوجه فرنگی 180 لیتر است.


$$\text{چگالی محلول} = \frac{g}{mL} \times \text{حجم محلول} (mL) = \text{جرم محلول}$$

$$= 10^7 mL \times 1,25 \frac{g}{mL} = 1,25 \times 10^7 g$$

$$ppm = \frac{\text{جرم حل شونده}}{\text{جرم محلول}} \times 10^6$$



$$\Rightarrow \lambda_0 = \frac{x}{1,25 \times 10^7} \times 10^6 \Rightarrow x = \frac{\lambda_0 \times 1,25 \times 10^7}{10^6} = 1000 \text{ g}$$






NH_4OH الف: ۱ ۲ ۳ ۴ ۲۸۵

ب: یونی تولید نمی شود.

پ: سدیم فسفات

ت: باریم هیدروکسید

انحلال اتانول در آب مولکولی است و یون تولید نمی کند.



۱ ۲ ۳ ۴ ۲۸۶

$$0,0338 \text{ mol} \times \frac{136 \text{ g}}{1 \text{ mol}} = 4,54 \text{ g}$$

$$2LH_2O \times \frac{1000 \text{ mL} H_2O}{1 \text{ L} H_2O} \times \frac{1 \text{ g} H_2O}{1 \text{ mL} H_2O} = 2000 \text{ g} H_2O$$

$$\begin{array}{c|cc} \text{مواد نامحلول} & \text{کم محلول} & \\ \hline x & 0,01 & 1 \\ & \text{محلول} & \end{array}$$

ما درس

کواموزی عصر

۱ ۲ ۳ ۴ ۲۸۷ موارد (ب) و (ت) نادرست هستند:

موردن (ب):

$$ppm = \frac{\text{جرم حل شونده}}{\text{جرم محلول}} \times 10^6 \Rightarrow 0,25 ppm = \frac{x}{1000} \times 10^{-3} \times 10^6$$

$$\Rightarrow x = 0,25 mg$$

موردن (ت) جرم مولی CO برابر با ۲۸ گرم بر مول می باشد.

$$ppm = \frac{\text{جرم حل شونده}}{\text{جرم محلول}} \times 10^6 \Rightarrow 280 ppm = \frac{x}{1000} \times 10^6$$

$$\Rightarrow x = 0,28 \quad , \quad g = 0,01 \text{ mol } CO$$

موردن (پ):



$$ppm \times 10^{-4} = 400 \times 10^{-4} = 0,04 \text{ درصد جرمی}$$

بررسی گزینه ها: ۱ ۲ ۳ ۴ ۲۸۸

گزینه ۱: محلول اتانول رسانایی الکتریکی ندارد؛ زیرا فاقد یون است.

گزینه ۲: پتاسیم برمید (KBr) در آب ۲ مول یون تولید می کند؛ درحالیکه آمونیوم کربنات (NH_4CO_3)، ۳ مول یون تولید می کند؛ پس رسانایی الکتریکی KBr کوچکتر از NH_4CO_3 است.

گزینه ۳: $NaCl$ در حالت محلول و مذاب رسانایی جریان برق است.

گزینه ۴: هر چه قدر ذرات حل شونده باردار در یک محلول بیشتر باشد، رسانایی الکتریکی محلول بیشتر است.

۱ ۲ ۳ ۴ ۲۸۹

$$M = \frac{n}{V} \text{ غلظت مولی}$$

$$1) 1,5 \text{ g } NaNO_3 \times \frac{1 \text{ mol } NaNO_3}{85 \text{ g } NaNO_3} \times \frac{2 \text{ mol } \text{یون}}{1 \text{ mol } NaNO_3} = 0,2 \text{ mol } \text{یون}$$

$$2) 5,85 \text{ g } NaCl \times \frac{1 \text{ mol } NaCl}{58,5 \text{ g } NaCl} \times \frac{2 \text{ mol } \text{یون}}{1 \text{ mol } NaCl} = 0,2 \text{ mol } L^{-1} \text{ (غلظت مولی)}$$

$$M = \frac{0,2}{0,1} = 2 \text{ mol } \cdot L^{-1} \text{ (غلظت مولی)}$$

پس محلول سمت راست ($NaCl$) غلیظ تر است.

گزینه های ۱، ۲ و ۳ درست هستند. فرایند اسمز تا جایی که غلظت هر دو محلول تقریباً برابر شود، ادامه می یابد. جایه جایی مولکول های آب به صورت دوطرفه می باشد؛ اما برایند این انتقال ها باعث حفظ تعادل و ثابت ماندن سطح محلول در هر ظرف می شود و نیازی به انتقال کامل آب به ظرف دیگر نیست.

از آنجا که یون ها از غشاء عبور نمی کنند؛ بنابراین مقدار مول آنیون نیترات در ظرف (۱) تقریباً ثابت است.

بررسی گزینه ها: ۱ ۲ ۳ ۴ ۲۹۰

گزینه ۱:

www.my-dars.ir

$$\text{جرم حل شونده} = \frac{x}{\text{جرم محلول}} \times 100 \Rightarrow 25 = \frac{x}{100} \times 100 \Rightarrow x = 25 \text{ g}$$

گزینه ۲:

$$\text{شکر g} \times \frac{125 \text{ g}}{225 \text{ g}} \simeq 22,2 \text{ g} = \text{شکر g} \text{ محلول g} = ۴۰ \text{ g}$$

گزینه ۳:

$$ppm = \frac{\text{جرم حل شونده}}{\text{جرم محلول}} \times 10^6 \Rightarrow 0,25 = \frac{x}{2} \times 10^6 \Rightarrow x = 5 \times 10^{-7} \text{ g}$$

گزینه ۴:



$$? g NaOH = ۱۰ g \text{ محلول} \times \frac{۱ mL \text{ محلول}}{۱,۲۵ g \text{ محلول}} \times \frac{۱ L \text{ محلول}}{۱۰۰ mL \text{ محلول}} \times \frac{۰,۱ mol NaOH}{۱ L \text{ محلول}}$$

$$\times \frac{۴۰ g NaOH}{۱ mol NaOH} = ۳,۲ \times ۱۰^{-۴} g NaOH$$



ماي درس

گروه آموزشی عصر

www.my-dars.ir

پاسخنامہ کلیدی

۱	۱	۲	۳	۴
۲	۱	۲	۳	۴
۳	۱	۲	۳	۴
۴	۱	۲	۳	۴
۵	۱	۲	۳	۴
۶	۱	۲	۳	۴
۷	۱	۲	۳	۴
۸	۱	۲	۳	۴
۹	۱	۲	۳	۴
۱۰	۱	۲	۳	۴
۱۱	۱	۲	۳	۴
۱۲	۱	۲	۳	۴
۱۳	۱	۲	۳	۴
۱۴	۱	۲	۳	۴
۱۵	۱	۲	۳	۴
۱۶	۱	۲	۳	۴
۱۷	۱	۲	۳	۴
۱۸	۱	۲	۳	۴
۱۹	۱	۲	۳	۴
۲۰	۱	۲	۳	۴
۲۱	۱	۲	۳	۴
۲۲	۱	۲	۳	۴
۲۳	۱	۲	۳	۴
۲۴	۱	۲	۳	۴
۲۵	۱	۲	۳	۴
۲۶	۱	۲	۳	۴
۲۷	۱	۲	۳	۴
۲۸	۱	۲	۳	۴
۲۹	۱	۲	۳	۴
۳۰	۱	۲	۳	۴
۳۱	۱	۲	۳	۴
۳۲	۱	۲	۳	۴
۳۳	۱	۲	۳	۴
۳۴	۱	۲	۳	۴
۳۵	۱	۲	۳	۴

۳۶	۱	۲	۳	۴
۳۷	۱	۲	۳	۴
۳۸	۱	۲	۳	۴
۳۹	۱	۲	۳	۴
۴۰	۱	۲	۳	۴
۴۱	۱	۲	۳	۴
۴۲	۱	۲	۳	۴
۴۳	۱	۲	۳	۴
۴۴	۱	۲	۳	۴
۴۵	۱	۲	۳	۴
۴۶	۱	۲	۳	۴
۴۷	۱	۲	۳	۴
۴۸	۱	۲	۳	۴
۴۹	۱	۲	۳	۴
۵۰	۱	۲	۳	۴
۵۱	۱	۲	۳	۴
۵۲	۱	۲	۳	۴
۵۳	۱	۲	۳	۴
۵۴	۱	۲	۳	۴
۵۵	۱	۲	۳	۴
۵۶	۱	۲	۳	۴
۵۷	۱	۲	۳	۴
۵۸	۱	۲	۳	۴
۵۹	۱	۲	۳	۴
۶۰	۱	۲	۳	۴
۶۱	۱	۲	۳	۴
۶۲	۱	۲	۳	۴
۶۳	۱	۲	۳	۴
۶۴	۱	۲	۳	۴
۶۵	۱	۲	۳	۴
۶۶	۱	۲	۳	۴
۶۷	۱	۲	۳	۴
۶۸	۱	۲	۳	۴
۶۹	۱	۲	۳	۴
۷۰	۱	۲	۳	۴

۷۱	۱	۲	۳	۴
۷۲	۱	۲	۳	۴
۷۳	۱	۲	۳	۴
۷۴	۱	۲	۳	۴
۷۵	۱	۲	۳	۴
۷۶	۱	۲	۳	۴
۷۷	۱	۲	۳	۴
۷۸	۱	۲	۳	۴
۷۹	۱	۲	۳	۴
۸۰	۱	۲	۳	۴
۸۱	۱	۲	۳	۴
۸۲	۱	۲	۳	۴
۸۳	۱	۲	۳	۴
۸۴	۱	۲	۳	۴
۸۵	۱	۲	۳	۴
۸۶	۱	۲	۳	۴
۸۷	۱	۲	۳	۴
۸۸	۱	۲	۳	۴
۸۹	۱	۲	۳	۴
۹۰	۱	۲	۳	۴
۹۱	۱	۲	۳	۴
۹۲	۱	۲	۳	۴
۹۳	۱	۲	۳	۴
۹۴	۱	۲	۳	۴
۹۵	۱	۲	۳	۴
۹۶	۱	۲	۳	۴
۹۷	۱	۲	۳	۴
۹۸	۱	۲	۳	۴
۹۹	۱	۲	۳	۴
۱۰۰	۱	۲	۳	۴
۱۰۱	۱	۲	۳	۴
۱۰۲	۱	۲	۳	۴
۱۰۳	۱	۲	۳	۴
۱۰۴	۱	۲	۳	۴
۱۰۵	۱	۲	۳	۴

۱۰۶	۱	۲	۳	۴
۱۰۷	۱	۲	۳	۴
۱۰۸	۱	۲	۳	۴
۱۰۹	۱	۲	۳	۴
۱۱۰	۱	۲	۳	۴
۱۱۱	۱	۲	۳	۴
۱۱۲	۱	۲	۳	۴
۱۱۳	۱	۲	۳	۴
۱۱۴	۱	۲	۳	۴
۱۱۵	۱	۲	۳	۴
۱۱۶	۱	۲	۳	۴
۱۱۷	۱	۲	۳	۴
۱۱۸	۱	۲	۳	۴
۱۱۹	۱	۲	۳	۴
۱۲۰	۱	۲	۳	۴
۱۲۱	۱	۲	۳	۴
۱۲۲	۱	۲	۳	۴
۱۲۳	۱	۲	۳	۴
۱۲۴	۱	۲	۳	۴
۱۲۵	۱	۲	۳	۴
۱۲۶	۱	۲	۳	۴
۱۲۷	۱	۲	۳	۴
۱۲۸	۱	۲	۳	۴
۱۲۹	۱	۲	۳	۴
۱۳۰	۱	۲	۳	۴
۱۳۱	۱	۲	۳	۴
۱۳۲	۱	۲	۳	۴
۱۳۳	۱	۲	۳	۴
۱۳۴	۱	۲	۳	۴
۱۳۵	۱	۲	۳	۴
۱۳۶	۱	۲	۳	۴
۱۳۷	۱	۲	۳	۴
۱۳۸	۱	۲	۳	۴
۱۳۹	۱	۲	۳	۴
۱۴۰	۱	۲	۳	۴



۱۴۱	۱	۲	۳	۴
۱۴۲	۱	۲	۳	۴
۱۴۳	۱	۲	۳	۴
۱۴۴	۱	۲	۳	۴
۱۴۵	۱	۲	۳	۴
۱۴۶	۱	۲	۳	۴
۱۴۷	۱	۲	۳	۴
۱۴۸	۱	۲	۳	۴
۱۴۹	۱	۲	۳	۴
۱۵۰	۱	۲	۳	۴
۱۵۱	۱	۲	۳	۴
۱۵۲	۱	۲	۳	۴
۱۵۳	۱	۲	۳	۴
۱۵۴	۱	۲	۳	۴
۱۵۵	۱	۲	۳	۴
۱۵۶	۱	۲	۳	۴
۱۵۷	۱	۲	۳	۴
۱۵۸	۱	۲	۳	۴
۱۵۹	۱	۲	۳	۴
۱۶۰	۱	۲	۳	۴
۱۶۱	۱	۲	۳	۴
۱۶۲	۱	۲	۳	۴
۱۶۳	۱	۲	۳	۴
۱۶۴	۱	۲	۳	۴
۱۶۵	۱	۲	۳	۴
۱۶۶	۱	۲	۳	۴
۱۶۷	۱	۲	۳	۴
۱۶۸	۱	۲	۳	۴
۱۶۹	۱	۲	۳	۴
۱۷۰	۱	۲	۳	۴
۱۷۱	۱	۲	۳	۴
۱۷۲	۱	۲	۳	۴
۱۷۳	۱	۲	۳	۴
۱۷۴	۱	۲	۳	۴
۱۷۵	۱	۲	۳	۴

۱۷۶	۱	۲	۳	۴
۱۷۷	۱	۲	۳	۴
۱۷۸	۱	۲	۳	۴
۱۷۹	۱	۲	۳	۴
۱۸۰	۱	۲	۳	۴
۱۸۱	۱	۲	۳	۴
۱۸۲	۱	۲	۳	۴
۱۸۳	۱	۲	۳	۴
۱۸۴	۱	۲	۳	۴
۱۸۵	۱	۲	۳	۴
۱۸۶	۱	۲	۳	۴
۱۸۷	۱	۲	۳	۴
۱۸۸	۱	۲	۳	۴
۱۸۹	۱	۲	۳	۴
۱۹۰	۱	۲	۳	۴
۱۹۱	۱	۲	۳	۴
۱۹۲	۱	۲	۳	۴
۱۹۳	۱	۲	۳	۴
۱۹۴	۱	۲	۳	۴
۱۹۵	۱	۲	۳	۴
۱۹۶	۱	۲	۳	۴
۱۹۷	۱	۲	۳	۴
۱۹۸	۱	۲	۳	۴
۱۹۹	۱	۲	۳	۴
۲۰۰	۱	۲	۳	۴
۲۰۱	۱	۲	۳	۴
۲۰۲	۱	۲	۳	۴
۲۰۳	۱	۲	۳	۴
۲۰۴	۱	۲	۳	۴
۲۰۵	۱	۲	۳	۴
۲۰۶	۱	۲	۳	۴
۲۰۷	۱	۲	۳	۴
۲۰۸	۱	۲	۳	۴
۲۰۹	۱	۲	۳	۴
۲۱۰	۱	۲	۳	۴

۲۱۱	۱	۲	۳	۴
۲۱۲	۱	۲	۳	۴
۲۱۳	۱	۲	۳	۴
۲۱۴	۱	۲	۳	۴
۲۱۵	۱	۲	۳	۴
۲۱۶	۱	۲	۳	۴
۲۱۷	۱	۲	۳	۴
۲۱۸	۱	۲	۳	۴
۲۱۹	۱	۲	۳	۴
۲۲۰	۱	۲	۳	۴
۲۲۱	۱	۲	۳	۴
۲۲۲	۱	۲	۳	۴
۲۲۳	۱	۲	۳	۴
۲۲۴	۱	۲	۳	۴
۲۲۵	۱	۲	۳	۴
۲۲۶	۱	۲	۳	۴
۲۲۷	۱	۲	۳	۴
۲۲۸	۱	۲	۳	۴
۲۲۹	۱	۲	۳	۴
۲۳۰	۱	۲	۳	۴
۲۳۱	۱	۲	۳	۴
۲۳۲	۱	۲	۳	۴
۲۳۳	۱	۲	۳	۴
۲۳۴	۱	۲	۳	۴
۲۳۵	۱	۲	۳	۴
۲۳۶	۱	۲	۳	۴
۲۳۷	۱	۲	۳	۴
۲۳۸	۱	۲	۳	۴
۲۳۹	۱	۲	۳	۴
۲۳۰	۱	۲	۳	۴
۲۳۱	۱	۲	۳	۴
۲۳۲	۱	۲	۳	۴
۲۳۳	۱	۲	۳	۴
۲۳۴	۱	۲	۳	۴
۲۳۵	۱	۲	۳	۴
۲۳۶	۱	۲	۳	۴
۲۳۷	۱	۲	۳	۴
۲۳۸	۱	۲	۳	۴
۲۳۹	۱	۲	۳	۴
۲۴۰	۱	۲	۳	۴
۲۴۱	۱	۲	۳	۴
۲۴۲	۱	۲	۳	۴
۲۴۳	۱	۲	۳	۴
۲۴۴	۱	۲	۳	۴
۲۴۵	۱	۲	۳	۴
۲۴۶	۱	۲	۳	۴

۲۴۷	۱	۲	۳	۴
۲۴۸	۱	۲	۳	۴
۲۴۹	۱	۲	۳	۴
۲۵۰	۱	۲	۳	۴
۲۵۱	۱	۲	۳	۴
۲۵۲	۱	۲	۳	۴
۲۵۳	۱	۲	۳	۴
۲۵۴	۱	۲	۳	۴
۲۵۵	۱	۲	۳	۴
۲۵۶	۱	۲	۳	۴
۲۵۷	۱	۲	۳	۴
۲۵۸	۱	۲	۳	۴
۲۵۹	۱	۲	۳	۴
۲۶۰	۱	۲	۳	۴
۲۶۱	۱	۲	۳	۴
۲۶۲	۱	۲	۳	۴
۲۶۳	۱	۲	۳	۴
۲۶۴	۱	۲	۳	۴
۲۶۵	۱	۲	۳	۴
۲۶۶	۱	۲	۳	۴
۲۶۷	۱	۲	۳	۴
۲۶۸	۱	۲	۳	۴
۲۶۹	۱	۲	۳	۴
۲۷۰	۱	۲	۳	۴
۲۷۱	۱	۲	۳	۴
۲۷۲	۱	۲	۳	۴
۲۷۳	۱	۲	۳	۴
۲۷۴	۱	۲	۳	۴
۲۷۵	۱	۲	۳	۴
۲۷۶	۱	۲	۳	۴
۲۷۷	۱	۲	۳	۴
۲۷۸	۱	۲	۳	۴
۲۷۹	۱	۲	۳	۴
۲۸۰	۱	۲	۳	۴



۲۸۱ ۱ ۲ ۳ ۴
۲۸۲ ۱ ۲ ۳ ۴
۲۸۳ ۱ ۲ ۳ ۴

۲۸۴ ۱ ۲ ۳ ۴
۲۸۵ ۱ ۲ ۳ ۴
۲۸۶ ۱ ۲ ۳ ۴

۲۸۷ ۱ ۲ ۳ ۴
۲۸۸ ۱ ۲ ۳ ۴
۲۸۹ ۱ ۲ ۳ ۴

۲۹۰ ۱ ۲ ۳ ۴



مای درس

گروه آموزشی عصر

www.my-dars.ir