

# سوالات موضوعی نهایی

## ((ریاضیات کسرت))

پایه دوازدهم رشته می ریاضی فنریک

# ماه درس



تئیه کننده: حاره عامری  
[www.my-dars.ir](http://www.my-dars.ir)

عضو گروه ریاضی دوره دوم متوسطه استان خوزستان

# (( فصل اول : آشنایی با نظریه اعداد ))

\*\*\*

## درس ۱: استدلال ریاضی

### استدلال ریاضی

۱	درستی یا نادرستی گزاره‌ی زیر را مشخص کنید.	۲۵/۰ نمره	دی ۷۹
۲	اگر $k$ حاصل ضرب دو عدد طبیعی متوالی باشد، آنگاه $1 + 4k^2$ مربع کامل است.	۱ نمره	فرداد ۸۹ خ
۳	درستی یا نادرستی گزاره‌های زیر را تعیین کنید. الف: مجموع هر دو عدد فرد، عددی زوج است. ب: برای هر عدد طبیعی $n$ بزرگتر از ۱، عدد $1 - 2^n$ اول است.	۵/۰ نمره	شهرپور ۸۹
۴	گزاره‌ی درست را اثبات کنید و برای گزاره نادرست، مثال نقض ارائه دهید. الف: مجموع هر دو عدد گنگ، عددی گنگ است. ب: اگر از مربع عددی فرد یک واحد کم کنیم، حاصل همواره بر ۸ بخش پذیر است.	۲۵/۱ نمره	فرداد ۹۹
۵	درست یا نادرست بودن گزاره‌های زیر را تعیین کنید. الف: برای هر دو عدد حقیقی $x$ و $y$ ، داریم: $\sqrt{x+y} = \sqrt{x} + \sqrt{y}$ . ب: اگر $a$ و $b$ دو عدد حقیقی باشند و $ab = 0$ آنگاه $a = 0$ یا $b = 0$ . پ: اگر $a, b \in R$ داریم: $a < b \Leftrightarrow a^2 < b^2$ . ت: حاصل جمع هر دو عدد گنگ، عددی گنگ است.	۱ نمره	شهرپور ۹۹
۶	درستی یا نادرستی گزاره‌ی زیر را مشخص کرده و اگر نادرست است، مثال نقض ارائه کنید. برای هر عدد طبیعی $n$ بزرگتر از ۱، عدد $1 - 2^n$ اول است.	۵/۰ نمره	دی ۹۹
۷	درست یا نادرست بودن گزاره‌های زیر را مشخص کنید. الف: حاصل ضرب سه عدد طبیعی متوالی بر ۶ بخش پذیر است. ب: هیچ عدد صحیحی مانند $x$ و $y$ وجود ندارند که رابطه‌ی $x^2 + y^2 = (x+y)^2$ برقرار باشد.	۵/۰ نمره	فرداد ۰۴

سئوالات موضوعی امتحانات نهایی کشوری فصل اول درس ریاضیات گسسته پایه‌ی دوازدهم رشته‌ی ریاضی

۱ نمره	شهریور ۱۴۰۰	ثابت کنید حاصل جمع یک عدد گویا و یک عدد گنگ، عددی گنگ است.	۸
-----------	----------------	--	---

**اثبات با در نظر گرفتن همه‌ی حالت‌ها (روش اشباع)**

			۱
			۲

**اثبات غیر مستقیم**

۱/۲۵ نمره	دی ۹۷	اگر $\alpha$ و $\beta$ دو عدد گنگ باشند ولی $\alpha + \beta$ گویا باشد. ثابت کنید $2\alpha + \beta$ گنگ است.	۱
۲/۳ نمره	بهمن ۹۶	ثابت کنید حاصل جمع یک عدد گویا و یک عدد گنگ، عددی گنگ است.	۲
۱ نمره	فروردین ۹۶	با استفاده از روش برهان خلف، ثابت کنید، اگر $x$ یک عدد گنگ باشد، $\frac{1}{x}$ نیز عددی گنگ است.	۳
۱/۵ نمره	دی ۹۶	اگر $\alpha$ و $\beta$ دو عدد گنگ باشند ولی $\alpha + \beta$ گویا باشد، با استفاده از برهان خلف ثابت $\alpha - \beta$ گنگ است.	۴

**اثبات بازگشتی / گزاره‌های هم ارز**

۱ نمره	دی ۹۷	گزاره‌ی زیر را به روش بازگشتی ( گزاره‌های هم ارز ) ثابت کنید. برای هر دو عدد حقیقی $x$ و $y$ داریم: $x^2 + y^2 + 1 \geq xy + x + y$	۱
۱ نمره	فروردین ۹۸	ثابت کنید، میانگین حسابی دو عدد نامنفی از میانگین هندسی آنها کمتر نیست.	۲
۱/۷ نمره	بهمن ۹۸	گزاره‌ی زیر را به روش بازگشتی ( گزاره‌های هم ارز ) ثابت کنید. برای هر عدد حقیقی $a > 0$ داریم: $a + \frac{1}{a} \geq 2$	۳

۱ نمره	۹۷	$x^2 + y^2 + 1 \geq xy + x + y$ برای دو عدد حقیقی $x$ و $y$ نشان دهید: گزاره‌ی زیر را به روش بازگشتی ثابت کنید.	۴
۵/۱ نمره	شهرپور ۹۶	$x^2 + y^2 + z^2 \geq xy + yz + xz$ برای هر سه عدد حقیقی $x$ و $y$ و $z$ ثابت کنید.	۵
۱ نمره	۹۸	$a + \frac{1}{a} \geq 2$ آنگاه $a > 0$ بروش بازگشتی، ثابت کنید، اگر	۶
۱ نمره	۹۹	$\frac{x}{y} + \frac{y}{x} \geq 2$ اگر $x$ و $y$ دو عدد حقیقی مثبت باشند، ثابت کنید	۷
۵/۲/۱ نمره	شهرپور ۹۹	$\frac{a+b}{2} \geq \sqrt{ab}$ ثابت کنید اگر $a$ و $b$ دو عدد حقیقی نامنفی باشند، داریم:	۸
۵/۳/۱ نمره	۹۰	به روش بازگشتی، ثابت کنید حاصل هر دو عدد حقیقی، کوچکتر یا مساوی با نصف مجموع مربعات آنها است.	۹

## درس ۲: بخش پذیری در اعداد صحیح

### عادکردن و ویژگی‌های آن

۱ نمره	۹۷	اگر $1 < a$ و $a   5k + 3$ و $a   9k + 4$ و $a   5k + 9$ ثابت کنید $a$ عددی اول است.	۱
۵/۲/۱ نمره	۹۸	اگر عددی مانند $k$ در $\mathbb{Z}$ باشد به طوری که $1   4k + 5$ ، $5   4k + 2$ ، $6   4k + 1$ ، ثابت کنید	۲
۵/۲/۰ نمره	۹۸	درستی یا نادرستی عبارت زیر را مشخص کنید. $a   b$ آنگاه $a^3   b^3$	۳
۱ نمره	۹۸	اگر عدد طبیعی $a > 1$ در دو شرط $a   4k + 9$ و $a   4k + 14$ صدق کند، مقدار $a$ را بیابید.	۴

**سوالات موضوعی امتحانات نهایی کشوری فصل اول درس ریاضیات گسسته پایه‌ی دوازدهم رشته‌ی ریاضی**

۲۵/۱۱ نمره	فرزند ۹۹	اگر باقی مانده‌ی تقسیم عدد $a$ بر ۴ برابر ۳ باشد، در این صورت باقی مانده‌ی تقسیم عدد $3 + 2a$ بر ۸ را به دست آورید.	۵
۱ نمره	فرزند ۹۹	$n = 5$ و $n \in N$ ثابت کنید $n   7k + 6$ و $n   9k + 7$ یا $n = 5$	۶
۲۵/۱۱ نمره	فرزند ۹۹ خ	اگر $2 - 2m$ و $a + 1$ بر $a$ ، برای $a$ چند جواب طبیعی وجود دارد؟	۷
۲۵/۱۱ نمره	شهریور ۹۹	فرض کنیم $a$ و $n$ دو عدد طبیعی باشند به طوری که $a   3n + 4$ و $a   2n + 3$ . نشان دهید: $a = 1$	۸
۵/۵ نمره	فرزند ۱۴۰	جاهاي خالي را با عدد يا کلمه‌ی مناسب پرکنيد. دو عدد $a$ و $b$ اعدادی صحیح و $a$ مخالف صفر است. اگر $a   b$ آنگاه عدد ..... شمارنده‌ی عدد ..... است.	۹
۲۵/۰ نمره	شهریور ۱۴۰	درستی یا نادرستی عبارت زیر را تعیین کنید. $a^n   b^n$ و $m$ و $n$ دو عدد طبیعی باشند که $n \leq m$ ، آنگاه $a   b$	۱۰
۱ نمره	شهریور ۱۴۰	اگر $1 > a   5k + 3$ و $a   9k + 4$ ، ثابت کنید $a$ عددی اول است.	۱۱

**بزرگترین مقسوم علیه مشترک و کوچکترین مضرب مشترک دو عدد**

۲۵/۰ نمره	دی ۹۷	درستی یا نادرستی گزاره‌ی زیر را مشخص کنید. هر دو عدد صحیح متوالی نسبت به هم اول‌اند.	۱
۵/۰ نمره	پیش ۸۹	در جای خالی عدد مناسب قرار دهید. حاصل $[12, 8] = [6, 8]$ برابر ..... خواهد شد.	۲
۲۵/۰ نمره	فرزند ۸۹ خ	حاصل عبارت مقابله کدام یک از گزینه‌های زیر است? $([m^2, m], m^5) = \dots$ الف) $m$ ب) $m^\circ$ ج) $m^5$ د) $m^2$	۳

**تنهیه کننده: جابر عامری دبیر ریاضی و عضو گروه ریاضی متوسطه‌ی دوم استان خوزستان**

۴	جای خالی را پر کنید.	اگر و تنها اگر دو شرط زیر برقرار باشند. $[a,b] = c$	۵/۰ نمره	شهریور ۹۷	۱) $a   c$ و $b   c$ ۲) $\forall m > 0 \dots$
۵	درست یا نادرست بودن عبارت زیر را مشخص کنید.	$[a,b] =  b $ ، آنگاه $a   b$	۵/۰ نمره	دی ۹۷	
۶	فرض کنید $a$ عددی طبیعی باشد، حاصل $[21a^3, 35a^3]$ را به دست آورید.		۱ نمره	دی ۹۷	
۷	جهای خالی را با عدد یا عبارت مناسب پر کنید. الف: اگر برای دو عدد صحیح و ناصفر $a$ و $b$ داشته باشیم، $(a,b) = 1$ ، می‌گوییم $a$ و $b$ دو عدد ..... هستند. ب: اگر $a   b$ ، مقدار $[a,b]$ برابر با ..... است.		۱ نمره	فروردین ۹۷	
۸	بزرگترین مقسوم عليه مشترک دو عدد $4k + 1$ و $16k^2 - 1$ را بیابید.		۵/۰ نمره	فروردین ۹۷	
۹	درستی یا نادرستی گزاره‌ی زیر را مشخص کرده و اگر نادرست است، مثال نقض ارائه کنید. برای دو عدد طبیعی $a$ و $b$ ، آنگاه $a   b$ اگر $a   b$		۵/۰ نمره	دی ۹۷	
۱۰	اگر $a$ عددی طبیعی باشد، حاصل $(5a + 4, 2a + 3)$ را به دست آورید.		۵/۰ نمره	دی ۹۷	
۱۱	جای خالی را با عدد یا کلمه‌ی مناسب پر کنید. عدد $m$ یک عدد صحیح است. حاصل $(2m, 6m^3)$ برابر با ..... است.		۵/۰ نمره	خرداد ۹۷	
۱۲	درستی یا نادرستی عبارت زیر را تعیین کنید.	$(a,b) = a$ آنگاه $a   b$ اگر $a   b$	۵/۰ نمره	شهریور ۹۷	

**سئوالات موضوعی امتحانات نهایی کشوری فصل اول درس ریاضیات گسسته پایه‌ی دوازدهم رشته‌ی ریاضی**

۱	۱۰	<p>پاسخ سؤال زیر را به دست آورید. دلیل پاسخ خود را به طور کامل بنویسید.</p> <p>اگر عددی صحیح و فرد باشد و <math>b   a + 2</math> در این صورت باقی مانده‌ی تقسیم عدد <math>a^2 + b^2 + 3</math> را برابر ۸ بباید.</p>
۲	۹	<p>اگر باقی مانده‌ی تقسیم <math>m</math> و <math>n</math> بر ۱۳ به ترتیب اعداد ۲ و ۹ باشد. در این صورت باقی مانده‌ی تقسیم عدد <math>5n - 3m</math> بر ۱۳ را به دست آورید.</p>
۳	۸	<p>در جاهای خالی عدد مناسب قرار دهید.</p> <p>در تقسیم عدد <math>127 - 15</math> باقیمانده برابر ..... و خارج قسمت ..... است.</p>
۴	۷	<p>اگر باقی مانده‌ی تقسیم <math>a</math> بر دو عدد ۶ و ۵ به ترتیب ۳ و ۲ باشد، باقی مانده‌ی تقسیم عدد <math>a</math> بر ۳۰ بباید.</p>
۵	۶	<p>اگر باقی مانده‌ی تقسیم عدد طبیعی <math>a</math> بر ۳۱ برابر ۱۹ باشد، باقی مانده‌ی <math>1 - 2a</math> تقسیم بر ۳۱ را به دست آورید.</p>
۶	۵	<p>ثابت کنید اگر <math>p &gt; 3</math> عددی اول باشد؛ آنگاه به یکی از دو صورت <math>p = 6k + 1</math> یا <math>p = 6k + 5</math> نوشته می‌شود.</p>
۷	۴	<p>اگر باقی مانده‌ی تقسیم اعداد <math>m</math> و <math>n</math> بر ۱۷ به ترتیب ۵ و ۳ باشد، در این صورت باقی مانده‌ی تقسیم عدد <math>2m - 5n</math> بر ۱۷ را محاسبه کنید.</p>
۸	۳	<p>اگر باقی مانده‌ی تقسیم اعداد <math>a</math> و <math>b</math> بر ۱۷ برابر ۵ و ۳ باشد، در این صورت باقی مانده‌ی تقسیم عدد <math>2a - 5b</math> بر ۱۷ را بباید.</p>
۹	۲	<p>ثابت کنید اگر <math>p \geq 5</math> عددی اول باشد، آنگاه به یکی از دو صورت <math>p = 4k + 1</math> یا <math>p = 4k + 3</math> نوشته می‌شود.</p>
۱۰	۱	<p>اگر <math>a</math> عددی صحیح و دلخواه باشد، ثابت کنید همواره یکی از اعداد صحیح <math>a + 2</math> یا <math>a + 4</math> بر ۳ بخش پذیر است.</p>

**افراز مجموعه‌ی اعداد صحیح**

**(صفحه‌ی ۶)**

**www.my-dars.ir**

۱۳/۰ نفره	پنجم	درستی یا نادرستی گزاره‌ی زیر را مشخص کنید.  مربع هر عدد فرد را می‌توان به صورت $1 - 8k$ نوشت. ( $k \in \mathbb{Z}$ )	۱
			۲

### درس ۳: بخش پذیری در اعداد صحیح و کاربرد‌ها همنهشتی و ویژگی‌های آن

۱ نمره	۹۷	پاسخ سوال زیر را به دست آورید. دلیل پاسخ خود را به طور کامل بنویسید.  باقي مانده‌ی تقسیم عدد $10 + 12 + 1000 \times 13$ بر ۷ را به دست آورید.	۱
۱ نمره	۹۸	اگر در یک سال، شنبه روز اوّل مهر باشد. در این صورت با استفاده از همنهشتی تعیین کنید ۱۲ بهمن، در همان سال چه روزی از هفته است؟	۲
۵/۰ نمره	خرداد ۹۸	درستی یا نادرستی عبارت زیر را مشخص کنید.  الف: اگر $a \equiv b \pmod{n}$ و $a \equiv b \pmod{m}$ آنگاه $n \mid m$ است.  ب : باقیمانده‌ی تقسیم عدد $4985327$ بر عدد $11$ برابر $6$ است.	۳
۵/۰ نمره	خرداد ۹۸	در جای خالی کلمه‌ی مناسب قرار دهید.  اگر ۱۲ بهمن جمعه باشد، ۳۱ مرداد همان سال ..... است.	۴
۵/۱ نمره	شهریور ۹۸	باقي مانده‌ی تقسیم $7^{27} + 19^7$ را بر $13$ بیابید.	۵
۱ نمره	۹۸	باقي مانده‌ی تقسیم $13^{22}$ را بر $17$ به دست آورید.	۶
۱ نمره	۹۸	ثابت کنید می‌توان دو طرف یک رابطه‌ی هم نهشتی را در عددی صحیح ضرب کرد. به عبارتی دیگر، برای اعداد صحیح $a$ و $b$ و $c$ عدد طبیعی $m$ ، اگر $a \equiv b \pmod{m}$ و $c \equiv d \pmod{m}$ آنگاه $ac \equiv bd \pmod{m}$ .	۷
۵/۱ نمره	خرداد ۹۹	باقي مانده‌ی تقسیم $7^{30}$ بر $15$ را به دست آورید.	۸

**سوالات موضوعی امتحانات نهایی کشوری فصل اول درس ریاضیات گسسته پایه‌ی دوازدهم رشته‌ی ریاضی**

۳۲/۱ نمره	شهریور ۹۹	رقم یکان عدد $7 + 2^{11}$ را به دست آورید.	۹
۱ نمره	شهریور ۹۹	فرض کنیم $a^n \equiv b^m$ و $n \in N$ ، $a \equiv b$ ، $a, b \in Z$ و $m \in N$ ، ثابت کنید	۱۰
۳۵/۱ نمره	دی ۹۹	باقي مانده‌ی تقسیم $38^{36} + 19$ را بر ۴ به دست آورید.	۱۱
۷۵/۰ نمره	خرداد ۱۴	باقي مانده‌ی تقسیم عدد $11 + 9 \times 2^5 = 1000$ را بر ۷ بیابید.	۱۲
۳۵/۰ نمره	شهریور ۰۴	درستی یا نادرستی عبارت زیر را تعیین کنید. $a \equiv b$ باشد، آنگاه باقی مانده‌های تقسیم دو عدد $a$ و $b$ بر $m$ مساوی‌اند.	۱۳
۱ نمره	شهریور ۰۴	اگر دو عدد $(3a - 5)$ و $(4a - 7)$ رقم یکان برابر داشته باشند، رقم یک عدد $6 + 9a$ را به دست آورید.	۱۴

**معادله‌ی همنهشتی**

۱ نمره	دی ۹۷	معادله‌ی همنهشتی $3x \equiv 13$ را حل کرده و جواب عمومی آن را بدست آورید.	۱
۱ نمره	مهر ۹۸	جواب عمومی معادله‌ی $4x \equiv 17$ را به دست آورید.	۲
۳۵/۰ نمره	دی ۹۸	درست یا نادرست بودن عبارت زیر را مشخص کنید.	۳
۳۵/۰ نمره	خرداد ۹۹	معادله‌ی هم نهشتی $ax \equiv b$ دارای جواب است، اگر و تنها اگر $(a, b)   m$	۴

۵/۵ نمره	دی ۹۹	درستی یا نادرستی گزاره‌ی زیر را مشخص کرده و اگر نادرست است، مثال نقض ارائه کنید. $m$ $(a,b) \mid m \quad ax \equiv b \text{ دارای جواب است اگر و تنها اگر}$	۵
۱ نمره	دی ۹۹	معادله‌ی همنهشتی $8x \equiv 20$ را حل کرده و جواب عمومی آن را به دست آورید.	۶
۱ نمره	فرداد ۱۴۰	معادله‌ی $7x \equiv 1$ را حل کنید.	۷
۵/۲۰ نمره	شهریور ۱۴۰	درستی یا نادرستی عبارت زیر را تعیین کنید. منظور از حل معادله‌ی هم نهشتی، پیدا کردن همه‌ی جواب‌های حقیقی است که در معادله‌ی $ax \equiv b$ صدق کند.	۸

### معادله‌ی سیاله

۱/۵ نمره	فرداد ۱۴۰	با تبدیل معادله‌ی سیاله‌ی خطی $18 = 5x + 2y$ به معادله‌ی هم نهشتی و حل آن، جواب‌های عمومی این معادله را بباید.	۱
۱ نمره	فرداد ۸۹۸۷	جواب‌های عمومی معادله‌ی سیاله‌ی خطی $11 = 5y + 7x$ را بدست آورید.	۲
۱/۵ نمره	شهریور ۹۸۷	با تبدیل معادله‌ی سیاله‌ی خطی $29000 = 2000x + 5000y$ به معادله‌ی هم نهشتی و حل آن، جواب عمومی این معادله را بباید.	۳
۵/۵ نمره	دی ۹۹	جواب‌های عمومی معادله‌ی سیاله‌ی خطی $7 = 9x + 13y$ را بدست آورید.	۴
۵/۷ نمره	فرداد ۹۹۷	معادله‌ی سیاله‌ی $4x + 3y = 19$ را در نظر بگیرید. الف: نشان دهید معادله‌ی سیاله دارای جواب است. ب: جواب عمومی معادله‌ی سیاله داده شده را بباید.	۵
۱ نمره	شهریور ۹۹	معادله‌ی سیاله‌ی $2x + 5y = 19$ را حل کنید.	۶

۷	معادله‌ی سیاله‌ی $5x + 2y = 18$ را حل کرده و جواب عمومی آن را بنویسید.	۱۰
---	--	----

تهریه کننده : جابر عامری

عضو گروه ریاضی دوره‌ی دوم متوسطه استان خوزستان

[www.mathtower.ir](http://www.mathtower.ir)

@amerimath

ماهی درس  
گروه آموزشی عصر

[www.my-dars.ir](http://www.my-dars.ir)

## پاسخ سوالات موضوعی نهایی

### فصل سوم ریاضیات گستته پایه دوازدهم ریاضی فیزیک

#### درس ۱: مباحثی در ترکیبیات

##### یادآوری و تکمیل

$\binom{4}{2} \times \binom{5}{3} \times 5! = 7200$	۱
الف) $5! \times 6!$ ب) $5! \times 7!$ ج) $10! \times 2!$	۲
$4! \times 2^4 = 24 \times 16 = 384$	۳
ج: $3! \times 7!$	۴
ب: $5! \times 4!$	۵
الف: $4! \times 4!$	۶
ب: $4! \times 3!$	۷
الف: $3! \times 3!$	۸
ب) $2! \times 7!$ الف) $2! \times 6!$	۹

##### معادلات حسابی

$x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = 8$ $x_i \geq 1, i = 1, 2, 3, 4$	۱
$\Rightarrow \binom{8-1}{4-1} = \binom{7}{3} = 35$	
$x_1 + x_2 + x_3 + x_4 + x_5 = 10$ $x_i \geq 1, i = 1, 2, 3, 4 \rightarrow x_1 + y_2 + 1 + y_3 + 1 + y_4 + 1 + y_5 + 1 = 10$ $\rightarrow x_1 + y_2 + y_3 + y_4 + y_5 = 6 \rightarrow \binom{6+5-1}{5-1} = \binom{10}{4} = 210$ تعداد جواب های صحیح نامنفی ۲۱۰	۲

## پاسخ سوالات موضوعی ریاضیات گسسته ..... فصل ۳

$x_1 + x_2 + x_3 + x_4 + x_5 = 12$ $\frac{x_1 = y_1 + 3, \quad x_5 = y_5 + 4}{y_1 + 3 + x_2 + x_3 + x_4 + y_5 + 4 = 12}$ $\rightarrow y_1 + x_2 + x_3 + x_4 + y_5 = 5 \rightarrow \binom{5+5-1}{5-1} = \binom{9}{4} = 126$	۳
$\binom{8+4-1}{4-1} = \binom{11}{3} = 165$ <p>ب) ابتدا ۱ شاخه (به اجبار) از هر نوع گل بر می داریم. ۸ - ۴ = ۴ شاخه گل باقی مانده را به دلخواه از بین ۴ نوع گل انتخاب می کنیم. لذا تعداد حالات برابر است با :</p> $\binom{4+4-1}{4-1} = \binom{7}{3} = 35$	۴ (الف)
$x_1 + x_2 + x_3 + x_4 + x_5 + x_6 = 12$ $\rightarrow (y_1 + 3) + x_2 + x_3 + x_4 + (y_5 + 4) + x_6 = 12$ $\rightarrow y_1 + x_2 + x_3 + x_4 + y_5 + x_6 = 5$ $\binom{5+6-1}{6-1} = \binom{10}{5} = 252$ <p>لذا تعداد جواب های مورد نظر برابر است با :</p>	۵
$x_1 + x_2 + x_3 + x_4 + x_5 = 14 \rightarrow (y_1 + 3) + x_2 + (y_3 + 4) + x_4 + x_5 = 14$ $\rightarrow y_1 + x_2 + y_3 + x_4 + x_5 = 7$ $\binom{7+5-1}{5-1} = \binom{11}{4} = 330$ <p>لذا تعداد جواب های مورد نظر برابر است با :</p>	۶
$x_1 + x_2 + \dots + x_5 = 11, \quad x_2 \geq 2, \quad x_5 \geq 4$ $x_2 = y_2 + 2 \quad \text{و} \quad x_5 = y_5 + 4$ $x_1 + (y_2 + 2) + x_3 + x_4 + (y_5 + 4) = 11 \rightarrow x_1 + y_2 + x_3 + x_4 + y_5 = 5$ <p>جواب صحیح و نامنفی</p>	۷

## پاسخ سوالات موضوعی ریاضیات گسسته ..... فصل ۳

$x_1, x_2, x_3, x_4 \geq 1 \quad \text{و} \quad x_2 \geq 3 \quad \text{و} \quad x_5 \geq 4$ $x_1 + x_2 + x_3 + x_4 + x_5 = 17$ $\rightarrow (y_1 + 1) + (y_2 + 3) + (y_3 + 1) + (y_4 + 1) + (y_5 + 4) = 17$ $\rightarrow y_1 + y_2 + y_3 + y_4 + y_5 = 7$ <p style="text-align: center;">تعداد جواب های صحیح نامنفی</p> $\binom{n+k-1}{k-1} = \binom{7+5-1}{5-1} = \binom{11}{4} = 33.$	۸
$x_1 + x_2 + x_3 + x_4 + x_5 = 17$ $x_2 > 2 \rightarrow x_2 - 2 > 0 \rightarrow x_2 = y_2 + 2$ $x_5 > 3 \rightarrow x_5 - 3 > 0 \rightarrow x_5 = y_5 + 3$ $\rightarrow x_1 + (y_2 + 2) + x_3 + x_4 + (y_5 + 3) = 17$ $\rightarrow x_1 + y_2 + x_3 + x_4 + y_5 = 12$ <p style="text-align: center;">تعداد جواب های طبیعی</p> $\binom{n-1}{k-1} = \binom{12-1}{5-1} = \binom{11}{4} = 33.$	روش دوم:
$y_1 = x_1 - 1 \geq 0 \rightarrow x_1 = y_1 + 1$ $y_2 = x_2 - 3 \geq 0 \rightarrow x_2 = y_2 + 3$ $x_1 + x_2 + x_3 + \dots + x_5 = 14 \rightarrow (y_1 + 1) + x_2 + (y_3 + 4) + \dots + x_5 = 14$ $\rightarrow y_1 + x_2 + y_3 + \dots + x_5 = 9$ <p style="text-align: center;">تعداد جوابهای صحیح و نامنفی</p> $\binom{9+5-1}{5-1} = \binom{13}{4} = 715$	۹
$y_2 = x_2 - 3, \quad y_2 \geq 0 \quad \text{و} \quad x_5 = 2$ $x_1 + (y_2 + 3) + x_3 + x_4 + 2 + x_5 = 17 \rightarrow x_1 + y_2 + x_3 + x_4 + x_5 = 12$ <p style="text-align: center;">تعداد جواب های صحیح و نامنفی</p> $\binom{16}{4} =$	۱۰

پاسخ سوالات موضوعی ریاضیات گسسته ..... فصل ۳

$x_1 + x_2 + x_3 + x_4 + x_5 + x_6 = 12 \quad : \quad x_1 \geq 1, \quad x_4 > 3, \quad x_6 = 1$ $y_1 = x_1 - 1 \quad : \quad y_1 \geq 0$ $y_4 = x_4 - 4 \quad : \quad y_4 \geq 0$ $y_6 = 1$ $y_1 + 1 + x_2 + x_3 + y_4 + 4 + x_5 + 1 = 12 \rightarrow y_1 + x_2 + x_3 + y_4 + x_5 = 6$ <b>جواب</b> $\binom{1+4}{4} = 210.$	۱۱
$y_1 = x_1 - 3 \quad ; \quad y_1 \geq 0 \rightarrow x_1 = y_1 + 3$ $y_4 = x_4 - 4 \quad ; \quad y_4 \geq 0 \rightarrow x_4 = y_4 + 4$ $x_1 + x_2 + x_3 + x_4 + x_5 = 15 \rightarrow (y_1 + 3) + x_2 + x_3 + (y_4 + 4) + x_5 = 15$ $\rightarrow y_1 + x_2 + x_3 + y_4 + x_5 = 8$ <b>جواب</b> $\binom{12}{4} = 495$	۱۲

جایگشت های با تکرار

$p = \frac{9!}{3! \times 2! \times 2!} = 3 \times 7!$	۱
<b>روش اول</b> $\binom{9}{2,3,4} = \frac{9!}{2! \times 3! \times 4!} = 126.$ <b>روش دوم</b> $\binom{9}{2} \times \binom{7}{3} \times \binom{4}{4} = \frac{9!}{2! \times 7!} \times \frac{7!}{3! \times 4!} \times \frac{4!}{4! \times 0!} = 36 \times 35 \times 1 = 126.$	۲
۳	
$\binom{8}{4,2} = \frac{8!}{4! \times 2!} = \frac{8 \times 7 \times 6 \times 5 \times 4!}{4! \times 1 \times 2} = 84.$	۴
$\binom{7}{2,3,1,1} = \frac{7!}{2! \times 3! \times 1! \times 1!} = \frac{7!}{2! \times 3!} = 42.$	۵

پاسخ سوالات موضوعی ریاضیات گسسته ..... فصل ۳

$\binom{10}{4,1,3,2} = \frac{10!}{4! \times 1! \times 3! \times 2!} = \frac{10!}{4! \times 3! \times 2!}$	۶
$\binom{8}{4} \times \binom{4}{3} \times \binom{1}{1} = 280 : \text{روش دوم}$	۷
$\frac{8!}{3! \times 4! \times 1!} = 280 : \text{روش اول}$	۸

مربع های لاتین

<table border="1" style="margin-bottom: 10px;"> <tr><td>۱</td><td>۳</td><td>۲</td></tr> <tr><td>۳</td><td>۲</td><td>۱</td></tr> <tr><td>۲</td><td>۱</td><td>۳</td></tr> </table> <table border="1" style="margin-bottom: 10px;"> <tr><td>۲</td><td>۱</td><td>۳</td></tr> <tr><td>۳</td><td>۲</td><td>۱</td></tr> <tr><td>۱</td><td>۳</td><td>۲</td></tr> </table> <p style="text-align: center;">⇒</p> <table border="1"> <tr><td>۱۲</td><td>۳۱</td><td>۲۳</td></tr> <tr><td>۳۳</td><td>۲۲</td><td>۱۱</td></tr> <tr><td>۲۱</td><td>۱۳</td><td>۳۲</td></tr> </table>	۱	۳	۲	۳	۲	۱	۲	۱	۳	۲	۱	۳	۳	۲	۱	۱	۳	۲	۱۲	۳۱	۲۳	۳۳	۲۲	۱۱	۲۱	۱۳	۳۲	۱																					
۱	۳	۲																																															
۳	۲	۱																																															
۲	۱	۳																																															
۲	۱	۳																																															
۳	۲	۱																																															
۱	۳	۲																																															
۱۲	۳۱	۲۳																																															
۳۳	۲۲	۱۱																																															
۲۱	۱۳	۳۲																																															
۱۵	۲																																																
<table border="1" style="margin-bottom: 10px;"> <tr><td></td><td>ش</td><td>ی</td><td>د</td></tr> <tr><td>A</td><td>۱</td><td>۲</td><td>۳</td></tr> <tr><td>B</td><td>۳</td><td>۱</td><td>۲</td></tr> <tr><td>C</td><td>۲</td><td>۳</td><td>۱</td></tr> </table> <table border="1" style="margin-bottom: 10px;"> <tr><td></td><td>ش</td><td>ی</td><td>د</td></tr> <tr><td>A</td><td>۲</td><td>۱</td><td>۳</td></tr> <tr><td>B</td><td>۱</td><td>۳</td><td>۲</td></tr> <tr><td>C</td><td>۳</td><td>۲</td><td>۱</td></tr> </table> <p style="text-align: center;">⇒</p> <table border="1"> <tr><td></td><td>ش</td><td>ی</td><td>د</td></tr> <tr><td>A</td><td>۱۲</td><td>۲۱</td><td>۳۳</td></tr> <tr><td>B</td><td>۳۱</td><td>۱۳</td><td>۲۲</td></tr> <tr><td>C</td><td>۲۳</td><td>۳۲</td><td>۱۱</td></tr> </table>		ش	ی	د	A	۱	۲	۳	B	۳	۱	۲	C	۲	۳	۱		ش	ی	د	A	۲	۱	۳	B	۱	۳	۲	C	۳	۲	۱		ش	ی	د	A	۱۲	۲۱	۳۳	B	۳۱	۱۳	۲۲	C	۲۳	۳۲	۱۱	۳
	ش	ی	د																																														
A	۱	۲	۳																																														
B	۳	۱	۲																																														
C	۲	۳	۱																																														
	ش	ی	د																																														
A	۲	۱	۳																																														
B	۱	۳	۲																																														
C	۳	۲	۱																																														
	ش	ی	د																																														
A	۱۲	۲۱	۳۳																																														
B	۳۱	۱۳	۲۲																																														
C	۲۳	۳۲	۱۱																																														
درست	۴																																																
<table border="1" style="margin-bottom: 10px;"> <tr><td>۲</td><td>۳</td><td>۱</td></tr> <tr><td>۱</td><td>۲</td><td>۳</td></tr> <tr><td>۳</td><td>۱</td><td>۲</td></tr> </table> <p style="text-align: center;">و</p> <table border="1" style="margin-bottom: 10px;"> <tr><td>۱</td><td>۳</td><td>۲</td></tr> <tr><td>۳</td><td>۲</td><td>۱</td></tr> <tr><td>۲</td><td>۱</td><td>۳</td></tr> </table>	۲	۳	۱	۱	۲	۳	۳	۱	۲	۱	۳	۲	۳	۲	۱	۲	۱	۳	۵																														
۲	۳	۱																																															
۱	۲	۳																																															
۳	۱	۲																																															
۱	۳	۲																																															
۳	۲	۱																																															
۲	۱	۳																																															

<table border="1" style="margin-bottom: 10px;"> <tr><td>۴</td><td>۲</td><td>۱</td><td>۳</td></tr> <tr><td>۳</td><td>۱</td><td>۲</td><td>۴</td></tr> <tr><td>۱</td><td>۴</td><td>۳</td><td>۲</td></tr> <tr><td>۲</td><td>۳</td><td>۴</td><td>۱</td></tr> </table> <p style="text-align: center;"><math>\Rightarrow \begin{matrix} 1 \rightarrow 3 \\ 2 \rightarrow 2 \\ 3 \rightarrow 4 \\ 4 \rightarrow 1 \end{matrix} \Rightarrow</math></p> <table border="1" style="margin-top: 10px;"> <tr><td>۱</td><td>۲</td><td>۳</td><td>۴</td></tr> <tr><td>۴</td><td>۳</td><td>۲</td><td>۱</td></tr> <tr><td>۳</td><td>۱</td><td>۴</td><td>۲</td></tr> <tr><td>۲</td><td>۴</td><td>۱</td><td>۳</td></tr> </table>	۴	۲	۱	۳	۳	۱	۲	۴	۱	۴	۳	۲	۲	۳	۴	۱	۱	۲	۳	۴	۴	۳	۲	۱	۳	۱	۴	۲	۲	۴	۱	۳	۶
۴	۲	۱	۳																														
۳	۱	۲	۴																														
۱	۴	۳	۲																														
۲	۳	۴	۱																														
۱	۲	۳	۴																														
۴	۳	۲	۱																														
۳	۱	۴	۲																														
۲	۴	۱	۳																														
<p>در هیچ سطر یا ستونی از مربع جدید عضو تکراری وجود ندارد، بنابراین مربع جدید، مربع لاتین می باشد.</p>	۷																																
<table border="1" style="margin-bottom: 10px;"> <tr><td>۱</td><td>۲</td><td>۳</td><td>۴</td></tr> <tr><td><math>T_1</math></td><td><math>T_1</math></td><td><math>T_1</math></td><td><math>T_1</math></td></tr> <tr><td><math>T_2</math></td><td><math>T_2</math></td><td><math>T_2</math></td><td><math>T_2</math></td></tr> <tr><td><math>T_3</math></td><td><math>T_3</math></td><td><math>T_3</math></td><td><math>T_3</math></td></tr> <tr><td><math>T_4</math></td><td><math>T_4</math></td><td><math>T_4</math></td><td><math>T_4</math></td></tr> </table> <p>این جدول یکی از پاسخ های ممکن است.</p>	۱	۲	۳	۴	$T_1$	$T_1$	$T_1$	$T_1$	$T_2$	$T_2$	$T_2$	$T_2$	$T_3$	$T_3$	$T_3$	$T_3$	$T_4$	$T_4$	$T_4$	$T_4$	۸												
۱	۲	۳	۴																														
$T_1$	$T_1$	$T_1$	$T_1$																														
$T_2$	$T_2$	$T_2$	$T_2$																														
$T_3$	$T_3$	$T_3$	$T_3$																														
$T_4$	$T_4$	$T_4$	$T_4$																														
<table border="1" style="margin-bottom: 10px;"> <tr><td>۱۱</td><td>۲۲</td><td>۳۳</td></tr> <tr><td>۳۲</td><td>۱۳</td><td>۲۱</td></tr> <tr><td>۲۳</td><td>۳۱</td><td>۱۲</td></tr> </table> <p>این دو مربع متعامندند، زیر در جدول تلفیقی شده از این دو مربع ، عدد تکراری وجود ندارد.</p>	۱۱	۲۲	۳۳	۳۲	۱۳	۲۱	۲۳	۳۱	۱۲	۹																							
۱۱	۲۲	۳۳																															
۳۲	۱۳	۲۱																															
۲۳	۳۱	۱۲																															
<p>با استفاده از جایگشت مناسب مربع لاتین جدید خواهیم داشت.</p> <table border="1" style="margin-bottom: 10px;"> <tr><td>۳</td><td>۲</td><td>۱</td><td>۴</td></tr> <tr><td>۱</td><td>۴</td><td>۳</td><td>۲</td></tr> <tr><td>۴</td><td>۱</td><td>۲</td><td>۳</td></tr> <tr><td>۲</td><td>۳</td><td>۴</td><td>۱</td></tr> </table> <p>( مثلاً با جایگشت <math>1 \rightarrow 4</math> و <math>4 \rightarrow 3</math> و <math>3 \rightarrow 2</math> و <math>2 \rightarrow 1</math> ) مربع جدید به صورت</p> <p>مقابل در خواهد آمد</p>	۳	۲	۱	۴	۱	۴	۳	۲	۴	۱	۲	۳	۲	۳	۴	۱	۹																
۳	۲	۱	۴																														
۱	۴	۳	۲																														
۴	۱	۲	۳																														
۲	۳	۴	۱																														

گروه آموزشی عصر

[www.my-dars.ir](http://www.my-dars.ir)

### پاسخ سوالات موضوعی ریاضیات گسسته ..... فصل ۳

۱۰

ابتدا در هر مورد، مربع های داده شده را تلفیق می کنیم. (برهم نهی)

الف :

۳۲	۲۱	۱۳
۱۱	۳۳	۲۲
۲۳	۱۲	۳۱

با مشاهده مربع تلفیقی، معلوم می شود که دو مربع داده شده متعامدند.

زیرا عدد دو رقمی تکراری در مربع تلفیقی وجود ندارد.

ب :

۱۳	۲۱	۳۲
۳۲	۱۳	۲۱
۲۱	۳۲	۱۳

با مشاهده مربع تلفیقی، معلوم می شود که دو مربع داده شده متعامد نیستند.

زیرا عدد دو رقمی تکراری در مربع تلفیقی وجود دارد.

۱۱

برای برنامه ریزی این مسئله کافی است، دو مربع لاتین متعامد در نظر بگیریم. مربع  $A$  مربوط به ماشین ها و مربع  $B$  مشخص کننده ایالات است.

$W_1$	$W_2$	$W_3$	
روز اول	۱	۳	۲
روز دوم	۳	۲	۱
روز سوم	۲	۱	۳

 $= A$ 

$W_1$	$W_2$	$W_3$	
روز اول	۲	۱	۳
روز دوم	۳	۲	۱
روز سوم	۱	۳	۲

$W_1$	$W_2$	$W_3$	
روز اول	۱۲	۳۱	۲۳
روز دوم	۳۳	۲۲	۱۱
روز سوم	۲۱	۱۳	۳۲

$W_1$	$W_2$	$W_3$	
روز اول	۱	۳	۲
روز دوم	۳	۲	۱
روز سوم	۲	۱	۳

$W_1$	$W_2$	$W_3$	
روز اول	۲	۱	۳
روز دوم	۳	۲	۱
روز سوم	۱	۳	۲

$W_1$	$W_2$	$W_3$	
روز اول	۱۲	۳۱	۲۳
روز دوم	۳۳	۲۲	۱۱
روز سوم	۲۱	۱۳	۳۲

در مربع تلفیقی، عدد سمت چپ هر درایه نشان دهنده ماشین و عدد سمت راست آن نشان دهنده نوع ایالات است.

۱	۲	۳	۴
۴	۱	۲	۳
۳	۴	۱	۲
۲	۳	۴	۱

۱۲

در مربع تلفیقی مقابله، اعداد دو رقمی تکراری نداریم، پس دو مربع داده شده متعامد هستند.

۱۱	۲۲	۳۳
۳۲	۱۳	۲۱
۲۳	۳۱	۱۲

۱۳

۱	۲	۳	۴
۴	۱	۲	۳
۳	۴	۱	۲
۲	۳	۴	۱

۱۴

$$\begin{array}{l} 1 \rightarrow 3 \\ 2 \rightarrow 1 \\ 3 \rightarrow 1 \end{array}$$

$$B = \begin{array}{|c|c|c|} \hline 1 & 3 & 2 \\ \hline 2 & 1 & 3 \\ \hline 3 & 2 & 1 \\ \hline \end{array}$$

((ب))

۲۱	۱۳	۳۲
۳۲	۲۱	۱۳
۱۳	۳۲	۲۱

۱۵

متعامد نیستند، زیرا در مربع آخر، عدد دو رقمی تکراری داریم.

$$A = \begin{array}{|c|c|c|} \hline 2 & 3 & 1 \\ \hline 1 & 2 & 3 \\ \hline 3 & 1 & 2 \\ \hline \end{array}$$

$$\rightarrow B = \begin{array}{|c|c|c|} \hline 1 & 3 & 2 \\ \hline 2 & 1 & 3 \\ \hline 3 & 2 & 1 \\ \hline \end{array}$$

$$\Rightarrow A \Theta B =$$

۲۱	۳۳	۱۲
۱۲	۲۱	۳۳
۳۳	۱۲	۲۱

۱۶

الف :

۱۷

۱	۲
۲	۱

۲	۱
۱	۲

ب : فقط دو مربع لاتین  $2 \times 2$  متعامد وجود دارد که متعامد نیستند. زیرا در مربعی تلفیقی آنها عدد تکراری وجود دارد.

۱۲	۲۱
۲۱	۱۲

## درس ۲: روش هایی برای شمارش

### اصل شمول و عدم شمول

تعداد حالت های ممکن برای انجام این عمل معادل است با پیدا کردن تعداد تابع های پوشان از یک مجموعه  $A$  به یک مجموعه  $B$  مانند  $4^3 = 64$

۱

$$A_i = \{ f : A \rightarrow B \mid f(a_i) \neq b_i, i = 1, 2, 3, 4, j = 1, 2, 3 \}$$

$$|S| = |B|^{|A|} = 3^4 = 81$$

$$|A_1| = |A_2| = |A_3| = |A_4| = 2^3 = 8$$

$$|A_1 \cap A_2| = |A_1 \cap A_3| = |A_2 \cap A_3| = 1$$

$$|A_1 \cap A_2 \cap A_3| = 0$$

$$|\overline{A_1} \cap \overline{A_2} \cap \overline{A_3}| = |\overline{A_1 \cup A_2 \cup A_3}|$$

$$= |S| - |A_1 \cup A_2 \cup A_3| = 81 - (3 \times 8) + (3 \times 3) - 0 = 36$$

$$n(A \cup B) = n(A) + n(B) - n(A \cap B) = \left[ \frac{90}{2} \right] + \left[ \frac{90}{3} \right] - \left[ \frac{90}{6} \right]$$

$$= 45 + 30 - 15 = 60$$

۲

$n(A \cup B) = n(A) + n(B) - n(A \cap B) = \left[ \frac{200}{4} \right] + \left[ \frac{200}{3} \right] - \left[ \frac{200}{12} \right]$ $= 50 + 66 - 16 = 100$ $n(\overline{A \cup B}) = n(S) - n(A \cup B) = 200 - 100 = 100$	۳
<p>تعداد حالت های ممکن برای انجام این عمل، معادل است با پیدا کردن تعداد تابع های از یک مجموعه‌ی ۴ عضوی مانند <math>A</math> به یک مجموعه‌ی سه عضوی مانند <math>B</math> است. طوری که برد این توابع همه اعضای <math>B</math> باشند.</p> <p>(به هر عضو حداقل یک عضو از <math>A</math> نسبت داده شود.)</p> <p>پس جواب این مسئله می‌شود:</p>	۴
$ A  = 4$ و $ B  = 3$ $3^m - 3(2^m - 1) = 3^4 - 3(2^4 - 1) = 81 - 3(16 - 1) = 81 - 45 = 36$	۵
<p>مجموعه‌ی اعداد بخش پذیر بر ۴ را <math>A</math> و مجموعه‌ی اعداد بخش پذیر بر ۷ را <math>B</math> می‌نامیم. بنابراین:</p> $n(A) = \left[ \frac{400}{4} \right] = 100 \quad \text{و} \quad n(B) = \left[ \frac{400}{7} \right] = 57 \quad \text{و} \quad n(A \cap B) = \left[ \frac{400}{4 \times 7} \right] = 14$ <p>(الف)</p> $n(A - B) = n(A) - n(A \cap B) = 100 - 14 = 86$ <p>(ب)</p> $n(A - B) + n(B - A) = n(A) - n(A \cap B) + n(B) - n(B - A)$ $= 100 - 14 + 57 - 14 = 129$	۵
$n(A \cup B) = n(A) + n(B) - n(A \cap B) = \left[ \frac{350}{4} \right] + \left[ \frac{350}{6} \right] - \left[ \frac{350}{12} \right]$ $= 87 + 58 - 29 = 116$ $n(\overline{A \cup B}) = n(S) - n(A \cup B) = 350 - 116 = 234$	۶
<p>درست</p>	۷

## پاسخ سوالات موضوعی ریاضیات گسسته ..... فصل ۳

$1 \leq j \leq 3 \quad , \quad A_j = \{f : A \rightarrow B \mid f(a_i) \neq b_j \quad , \quad 1 \leq i \leq 4\}$ $A = \{a_1, a_2, a_3, a_4\} \quad \text{و} \quad B = \{b_1, b_2, b_3\}$ $ S  = 3^4 \quad \text{و} \quad  A_1  =  A_2  =  A_3  = 2^4 \quad \text{و} \quad  A_1 \cap A_2  =  A_1 \cap A_3  =  A_2 \cap A_3  = 1^4$ $\text{و} \quad  A_1 \cap A_2 \cap A_3  = .^4 = .$ $ A_1 \cup A_2 \cup A_3  =  A_1  +  A_2  +  A_3  -  A_1 \cap A_2  -  A_1 \cap A_3  -  A_2 \cap A_3  +$ $ A_1 \cap A_2 \cap A_3  = 16 + 16 + 16 - 1 - 1 - 1 + . = 45$ $ A_1 \cup A_2 \cup A_3  =  S  -  A_1 \cup A_2 \cup A_3  = 81 - 45 = 36$	۸
<p style="text-align: right;">روش دوم :</p> $ A  = 4 \quad \text{و} \quad  B  = 3$ $3^m - 3(2^m - 1) = 3^4 - 3(2^4 - 1) = 81 - 3(16 - 1) = 81 - 45 = 36$	۹
<p style="text-align: right;">تعداد حالت های ممکن برای انجام این کار معادل است با پیدا کردن تعداد تابع های یک به یک از مجموعه ۴ عضوی مجموعه ای ۸ عضوی</p> $(A)_4 = \frac{8!}{4!} = 1680$	۱۰
$A = \{n \in N \mid 1 \leq n \leq 100, n = 5k\} \rightarrow  A  = \left[ \frac{100}{5} \right] = 16$ $B = \{n \in N \mid 1 \leq n \leq 100, n = 10k\} \rightarrow  B  = \left[ \frac{100}{10} \right] = 10$ $A \cap B = \{n \in N \mid 1 \leq n \leq 100, n = 50k\} \rightarrow  A \cap B  = \left[ \frac{100}{50} \right] = 3$ $ A \cup B  =  A  +  B  -  A \cap B  = 16 + 10 - 3 = 23$	۱۱
$ S  = 200,  A  = \left[ \frac{200}{2} \right] = 100,  B  = \left[ \frac{200}{4} \right] = 28 \quad \text{و} \quad  A \cap B  = \left[ \frac{200}{8} \right] = 14$ $ A \cup B  =  A  +  B  -  A \cap B  = 100 + 28 - 14 = 114$ $ \overline{A} \cap \overline{B}  =  \overline{A \cup B}  =  S  -  A \cup B  = 200 - 114 = 86$	۱۲

پاسخ سوالات موضوعی ریاضیات گسسته ..... فصل ۳

$(6)_4 = \frac{6!}{(6-4)!} = \frac{6!}{2!} = 360 : \text{ب} : \quad 3^4 - 3(2^4 - 1) = 81 - 45 = 36 = \text{الف} :$	۱۲
<p>حل مسئله معادل با یافتن تعداد تابع ممکن از یک مجموعه‌ی ۴ عضوی به یک مجموعه‌ی ۸ عضوی است که برابر با <math>8^2</math> است.</p>	۱۳
$P(6,3) = \frac{6!}{(6-3)!} = \frac{6!}{3!} = \frac{6 \times 5 \times 4 \times 3 \times 2 \times 1}{3 \times 2 \times 1} = 6 \times 5 \times 4 = 120.$	۱۴
$ F \cup V  =  S  -  F \cap V  = 25 - (15 + 14 - 9) = 5$	۱۵
$A = \{n \in S \mid n = 5k, k \in Z\} \rightarrow n(A) = \left[ \frac{400}{5} \right] = 80.$ $B = \{n \in S \mid n = 7k, k \in Z\} \rightarrow n(B) = \left[ \frac{400}{7} \right] = 57$ $A \cap B = \{n \in S \mid n = 35k, k \in Z\} \rightarrow n(A \cap B) = \left[ \frac{400}{35} \right] = 11$ $ A \cup B  =  A  +  B  -  A \cap B  = 80 + 57 - 11 = 126$ $ \overline{A \cup B}  =  S  -  A \cup B  = 400 - 126 = 274$	۱۶
<p>فوتbal</p> <p>والبیال</p> <p>بسکتبال</p> $10 + 3 + 3 = 16 = \text{فقط در یک رشته}$	۱۷
$\text{الف} \quad 3^4 - (3 \times 2^4 - 3) = 36 \quad \text{ب} \quad P(8,4) = \frac{8!}{(8-4)!} = 1680.$	۱۸

$$A = \{1 \leq n \leq 200 \mid n = 4k\} \rightarrow |A| = \left[ \frac{200}{4} \right] = 50$$

۱۹

$$B = \{1 \leq n \leq 200 \mid n = 7k\} \rightarrow |B| = \left[ \frac{200}{7} \right] = 28$$

$$A \cap B = \{1 \leq n \leq 200 \mid n = 28k\} \rightarrow |A \cap B| = \left[ \frac{200}{28} \right] = 7$$

$$|A \cap B'| = |A| - |A \cap B| = 50 - 7 = 43$$

### اصل لانه کبوتری

$$k + 1 = 20 \rightarrow k = 19$$

۱

$$\begin{array}{r} 6 \\ 4 \\ \hline 2 \\ 1+1=2 \end{array}$$

طبق تعمیم اصل لانه کبوتری، تعداد لانه‌ها همان روزهای سال می‌باشد.  
( $n = 365$ )

$$kn + 1 = 365 \times 19 + 1 = 6936$$

$$\text{تعداد لانه‌ها : } 7 \times 12 = 84$$

$$\text{تعداد کبوترها : } 505 \text{ دانش آموز}$$

۲

$$\begin{array}{r} 505 \\ 504 \\ \hline 1 \\ 6 \\ 6+1=7 \end{array}$$


طبق اصل لانه کبوتر لاقل ۷ نفر آنها در روز هفته و ماه تولدشان یکسان است.

در این مسئله  $k + 1 = 7$  یعنی  $k = 6$  است و تعداد لانه‌ها همان تعداد ماه‌های سال یعنی  $n = 12$  است.

۳

طبق اصل لانه کبوتری، تعداد کبوترها یا معادل آن تعداد دانش آموزان، حداقل باید

$$\text{برابر } kn + 1 = 6 \times 12 + 1 = 73$$



مطابق شکل، مثلث را به ۹ مثلث متساوی الاضلاع (با ضلع‌هایی به طول ۱ واحد) تقسیم می‌کیم.

حال نقاط را به عنوان ۱۰ کبوتر و مثلث‌های کوچک را به عنوان ۹ لانه در نظر می‌گیریم. طبق اصل لانه کبوتری حداقل دو کبوتر در یک لانه جای می‌گیرند، یعنی حداقل دو نقطه درون یک مثلث کوچک قرار خواهند گرفت.

۴

از طرفی با توجه به این که طول اضلاع مثلث‌ها ۱ واحد می‌باشد، فاصله‌ی بین دو نقطه‌ی درون مثلث از ۱ واحد کمتر است.

<p>تعداد لانه ها : ۱۲ مربع مانند شکل زیر</p>	۵
<p>طبق اصل لانه کبوتری دو نقطه مانند <math>A</math> و <math>B</math> در یک لانه جای می گیرند. پس :</p> $\begin{cases} AH < 2 \\ BH < 2 \end{cases} \rightarrow AH^2 + BH^2 < 8 \rightarrow AB^2 < 8 \rightarrow AB < \sqrt{8}$ <p>تعداد کبوتر ها برابر ۴۳ و تعداد لانه ها برابر ۴۲ می باشد و می توان لانه ها را به صورت زیر در نظر گرفت:</p> <p style="text-align: center;">نیم ، نیم ، نیم ، نیم ۱,۸۴ ۲,۸۳ ۳,۸۲ ۴۲,۴۳</p> <p>چنانچه قرار باشد، کبوترها، لانه ها را اشغال کنند، آنگاه طبق اصل لانه کبوتری حداقل دو عدد وجود دارد که در یک لانه جای می گیرند و مجموعشان ۸۵ است.</p>	۶
<p>در این مسئله <math>k+1=6</math> و تعداد لانه ها <math>12</math> است. پس تعداد کبوترها یا معادل با آن تعداد دانش آموزان حداقل می بایست <math>kn+1=73 = 12(6)+1</math> باشد.</p>	۷
<p><math>k+1=20 \rightarrow k=19</math>      <math>n=7</math></p> <p><math>nk+1=(7)(9)+1=133+1=134</math>      تعداد کبوترها</p> <p>بنابراین حداقل ۱۳۴ نفر باید در سالن باشند.</p>	۸
<p>هر فصل تولد را لانه فرض می کنیم که برابر ۴ است. همچنین هر فرد خانواده را معادل کبوتر قرار می دهیم که برابر ۵ است. طبق اصل لانه کبوتری حداقل یک لانه (فصل) وجود دارد که ۲ کبوتر (دو نفر از اعضای خانواده) در آن قرار می گیرند. به عبارتی دیگر در یک فصل به دنیا آمده اند.</p>	۹
<p><math>32 \times 31 = 992</math>      <math>k+1=3 \rightarrow k=2</math></p> <p><math>2 \times 992 + 1 = 1985</math>      تعداد کبوتر ها</p>	۱۰
<p><math>k+1=5 \rightarrow k=4</math></p> <p><math>kn+1=54 \rightarrow 4n=53</math></p> $n = \left[ \frac{53}{4} \right] = 13$	۱۱

$$k + 1 = 20 \rightarrow k = 19 \rightarrow kn + 1 = 19(17) + 1 = 134$$

۱۲

تمیه کننده: جابر عامری

عضو گروه ریاضی دوره‌ی دوم متوسطه استان خوزستان

[www.mathtower.ir](http://www.mathtower.ir)

@amerimath



مای درس  
گروه آموزشی عصر

[www.my-dars.ir](http://www.my-dars.ir)