

دافترين مردم کسی است که دانش مردم را با دانش خود جمع کند.



برخی از مواد اطراف ما فقط از یک ماده تشکیل شده اند و بعضی دیگر از آنها از آمیخته شدن دو یا چند ماده با یکدیگر بدست آمده اند. بیشتر موادی که با آنها سروکار داریم آمیخته ای از دو یا چند ماده اند.

### دسته بندی مواد:

**مواد خالص:** به موادی که فقط از یک نوع اتم تشکیل شده اند.

**عنصر:** عنصر خود به دو دسته مولکول تک اتمی مثل فلزات و مولکول چند اتمی مثل نافلزات دسته بندی می شود.

مثال: آب، آمونیاک، الکل، کربن دی اکسید، آهن، مس، اکسیژن و ...

**مواد ناخالص (مخلوط):** به موادی که مواد سازنده آنها از ترکیب دو یا چند ماده مختلف تشکیل شده است.

مثال: آجیل، شربت آبلیمو، آب نمک، آب نمک، آب شکر، سکه و ...

به مواد ناخالص مخلوط هم می گویند.

بیشتر موادی که با آنها سروکار داریم مواد مخلوط هستند. مواد مخلوط در زندگی ما نقش مهمی دارند.

یکی از ویژگی های مخلوط آن است که اجزای تشکیل دهنده مخلوط خواص اولیه ای خود را حفظ می کنند.

### تعریف مخلوط:

موادی که از اجزاء تشکیل دهنده آن دو یا چند ماده است و در آن مواد خواص خود را از دست نمی دهند.

## انواع مخلوط

مخلوط همگن ( محلول )

مخلوط ناهمگن ( مخلوط معلق )

**مخلوط همگن:** به مخلوطی که اجزاء آن به صورت یکنواخت در همه جا پخش شده و غیر قابل تشخیص باشند و نتوان آنها را به سادگی از یکدیگر جدا کرد.

[www.my-dars.ir](http://www.my-dars.ir)

انواع مخلوط همگن( محلول):

۱- محلول جامد در مایع . مثل نمک در آب

۲- محلول مایع در مایع . مثل: الکل در آب

۳- محلول گاز در گاز. مثل هوا

۴- محلول گاز در مایع . مثل گاز کربنیک در نوشابه

۵- محلول جامد در جامد. مثل آلیاژ

**محلول:** مخلوطی که در آن ماده‌ای در ماده دیگر حل شده است.

**اجزاء تشکیل دهنده محلول:** هر محلول حداقل از دو یا چند جزء تشکیل شده است. ۱- ماده حل شونده ۲- حلال

**حل:** ماده‌ای که حل شونده را در خود حل می‌کند و معمولاً جزء بیشتری از محلول را تشکیل می‌دهد

**حل شونده:** به جزئی از محلول که در حلال حل می‌شود. حل شونده‌ها معمولاً لابه لای ذرات حلال می‌روند.

توجه داشته باشید برای تهیه محلول‌ها می‌توان نسبت‌های مختلفی از حل شونده و حلال را با هم مخلوط کرد. از نظر فیزیکی محلول‌ها می‌توانند جامد، مایع یا گاز باشند و حل شونده می‌توانند جامد مایع یا گاز باشند.

مثلًا مقدار نیتروژن در هوا ۷۸٪ و اکسیژن ۲۱٪ است. پس می‌توان گفت نیتروژن حلال و اکسیژن حل شونده است.

آلیاژها آمیخته‌ای از چند فلز هستند.

## ۲- مخلوط ناهمگن (مخلوط معلق)

نوعی از مخلوط که ذرات آنها به طور یکنواخت آمیخته نشده‌اند و اجراء‌ان از هم به سادگی قابل تشخیص هستند. مثل آجیل انواع مخلوط ناهمگن:

۱- جامد در جامد مثل آجیل، سالاد

۲- جامد در مایع (سوسپانسیون) مثل شربت معده

۳- مایع در مایع (امولیسیون) مثل روغن در آب یا نفت در آب

۴- جامد در گاز مثل ذرات دود و گردوغبار در هوا

**سوسپانسیون:** مخلوط ناهمگنی است که در آن ذرات به صورت معلق در آب پراکنده‌اند. مثل: دوغ، آب لیمو، شربت خاکشیر، شربت آنتی بیوتیک و شربت معده

**تعریف امولیسیون:** مخلوط ناهمگنی است که ذرات مایع به صورت معلق در مایع دیگر پراکنده شده‌اند. مثل روغن در آب

**مقایسه مخلوط همگن و ناهمگن:**

ویژگی‌های مخلوط‌های همگن (معلق)	ویژگی‌های مخلوط‌های ناهمگن (محلول)
۱- ذرات قابل تشخیص هستند.	۱- ذرات قابل تشخیص نیستند.
۲- ذرات ریز و درشت هستند.	۲- ذرات بصورت یکنواخت پخش شده‌اند.
۳- ذرات کدر هستند.	۳- زلال و شفاف هستند.
۴- ذرات حل نشده‌اند.	۴- ذرات حل شده‌اند.
۵- رسوب می‌کنند.	۵- رسوب نمی‌کنند.
۶- از کاغذ صافی عبور نمی‌کنند.	۶- از کاغذ صافی عبور می‌کنند.

## انحلال پذیری

مقدار ماده حل شونده در مقدار معینی از آب (۱۰۰ گرم آب) را انحلال پذیری می‌گویند.

مثلًا در دمای ۲۰ درجه سانتی گراد ۳۸ گرم نمک خوارکی در ۱۰۰ میلی لیتر آب حل می‌شود.

**عوامل مؤقر در انحلال پذیری :**

۱- دما ۲- فشار ۳- نوع ماده

**اثر دما بر میزان حل شدن مواد**

اثر دما در میزان حل شدن مواد به حالت ماده بستگی دارد مقدار حل شدن مواد جامد با افزایش دما افزایش می یابد اما مقدار حل شدن گازها با افزایش دما کاهش می یابد.

**محلول اشباع شده (سیر شده) :**

هر گاه لا به لای مولکول های حلal پر از حل شونده شود و دیگر جای برای مولکول های جدید نباشد می گوییم محلول سیر شده است.

**عوامل مؤثر بر انحلال پذیری گازها :**

۱- دما ۲- فشار ۳- ناخالصی

میزان حل شدن گازها در حلal با افزایش فشار افزایش می یابد (رابطه مستقیم) و با افزایش دما حل شدن گازها کاهش می یابد (رابطه معکوس) پس هر چه دما کاهش یابد فشار بیشتر باشد مقدار گاز بیشتری حل می شود.

**سوال ؟ :**

ماهی ها در آب سرد اکسیژن بیشتری دارد یا آب گرم؟ چرا؟

**جداسازی اجزاء مخلوط ها :**

برای جداسازی مخلوط ها باید از تفاوت در ویژگی مخلوط ها استفاده کرد. مثلا برای جداسازی خاک اره از آب که مخلوط دوتایی است می توان از سنگین یا سبک بودن آنها استفاده کرد.

**روش های جداسازی مخلوط ها :**

۱- صاف کردن: در این روش با کمک اختلاف در اندازه ذرات ، یعنی درشت و ریزی ذره ها .

مثال : آبکش کردن برنج با آبکش یا صاف کردن چای با چای صاف کن

۲- سریز کردن : با کمک ته نشین یا سریز شدن اجزاء یعنی سبکی و سنگینی

۳- تبخیر و تبلور : با کمک تبخیر شدن اجزاء مخلوط . یعنی تفاوت در سرعت تبخیر

مثال : بخار شدن آب موجود در آب نمک در بشقاب و به جا ماندن ذرات جامد نمک

۴- آهن ریا : با کمک خاصیت آهن ریایی اجزاء مخلوط

مثال : جدا سازی ذرات آهن از مخلوط آهن و خاک

۵- تقطری : با کمک تفاوت در نقطه جوش

مثال جدا کردن اجزای نفت ، گلاب گیری ، تصفیه آب، آب و الکل

**نکات مهم :**

**www.my-dars.ir**

✓ مقدار حل شدن برخی مواد مانند پتاسیم نیترات که نوعی نمک است با افزایش دما افزایش می یابد.

✓ شیر مخلوطی از چربی و آب است و در صنعت برای جدا سازی چربی از شیر از دستگاه سانتریفیوژ استفاده می شود.(بر اساس سبک و سنگینی)

✓ در مخلوط خاصیت اجزاء تغییر نمی کند فقط لا به لای هم می روند.

✓ گرم کردن حلal باعث می شود حل شونده بیشتری در آن حل شود.

✓ هم زدن باعث می شود حل شونده سریع تر حل شود.

✓ هوار مخلوط همگن یعنی محلول است.

✓ مخلوط ها ناخالص هستند.

✓ آلیاژها ناخالص بوده و جزء مخلوط ها هستند.

✓ نام دیگر مخلوط ناهمگن، مخلوط معلق است.

**پ) اج PH**

مقیاسی است که قدرت اسیدی یا باری بودن یک محلول را نشان می دهد.

✓ مقیاس پی اج از صفر الی ۱۴ درجه بندی شده است.

✓ در نوار پی اج اعداد کمتر از ۷ محیط اسیدی و بیشتر از ۷ محیط بازی را نشان می دهد.

✓ پی اج اسید قوی برابر ۰ صفر و پی اج باز قوی برابر ۱۴ است.

✓ پی اج هفت محیط خنثی را نشان می دهد.

✓ هرچه از ۱۴ به سمت ۷ رویم خاصیت بازی کاهش و هرچه از سمت صفر به سمت ۷ برویم خاصیت اسیدی کاهش می یابد.

✓ قوی ترین اسید جوهر نمک با پی اج ۰ و قوی ترین باز گرد باز کننده فاضلاب (سود سوز آور) با پی اج ۱۴ است.

✓ جوش شیرین و مایعی که از پوست پرتقال خارج می شود بازهای ضعیفی هستند.

✓ واکتس (مایع سفید کننده) گرد باز کننده فاضلاب (سود سوز آور) بازهای قوی صنعتی هستند.

**برخی مواد:**

جوهر نمک: ۱-۰ آبیلو: ۹ جوش شیرین: ۹ سدیم هیدراکسید: ۱۴ سرکه: ۴ شامپو: ۱۰

**۷) بازها :**

**باز (قليا):** موادی تلغی مزه که در اثر تماس با پوست حالت صابونی ایجاد می کنند و از هفت شروع تا ۱۴ ادامه دارد.



یک باز ماده ای است که می تواند یک اسید را خنثی کند. برخی از بازها قلیا هم هستند. قلیاهای بازهای هستند که در آب حل می شوند. بازها با گرفتن  $H^+$ ، اسیدها را خنثی می کنند. همه ای قلیاهای دارای  $OH^-$  هستند. قلیاهای مانند اسیدهای توانند قوی یا ضعیف باشند. هرچه قلیا، یون های هیدروکسید  $OH^-$  بیشتری تولید کنند، قوی تر است. سدیم هیدروکسید ( $NaOH$ ) نمونه ای از یک قلیای قوی است.

**ویژگی:** تلغی مزه اند/ به دست حالت صابونی می دهند/ با فلزات واکنش نشان می دهند. الکتروولیت هستند. زیرا در محلول آبی آنها یون وجود دارد گرد باز کننده ای لوله فاضلاب/ جوش شیرین / مایع سفید کننده / مایعی که در اثر فشار از پوست پرتقال خارج می شود. از واکنش یک فلز (سدیم، پتاسیم، کلسیم) با آب باز بدست می آید.

بازها با حل شدن در آب  $OH^-$  (یون هیدروکسید) ایجاد می کنند که به آن عامل بازی می گویند.

نام ترکیب	فرمول شیمیایی	نام ترکیب	فرمول شیمیایی	نام ترکیب	فرمول شیمیایی
آب	$H_2O$	آمونیاک	$NH_3$	آتانول	$C_2H_5OH$
پلی ترافلونور و اتیلن	$(C_2F_4)_n$	متان	$CH_4$	کلوكز(قدخدون)	$C_6H_{12}O_6$
نیتروژن دی اکسید	$NO_2$	کربن منو اکسید	$CO$	کربن دی اکسید	$CO_2$
ساکاروز(قند معمولی)	$C_{12}H_{22}O_{11}$	اتین گلیکول	$C_2H_6O_2$	نیتروژن اکسید	$NO$

**۷) واکنش خنثی:** به واکنش اسید و باز با یکدیگر واکنش خنثی شدن می گویند که محصول آن نمک و آب است.

**اسیدها:**

**اسید:** موادی ترش مزه که پی اج آنها از صفر شروع تا هفت ادامه می یابد.

**ویژگی:** ترش مزه اند - با فلزات واکنش نشان می دهند - الکتروولیت هستند. زیرا در محلول آبی آنها یون وجود دارد.

جوهر نمک / سرکه / آبیلو / ویتامین ث / آسپرین از جمله اسید ها هستند

هر گاه اسیدی در آب حل شود (یونیزه شود) اسیدها با حل شدن در آب  $H^+$  (یون هیدرونیم) ایجاد می کند که به آن عامل اسیدی می گویند.

## نام و فرمول شیمیایی برخی اسیدها میم:

نام اسید	فرمول شیمیایی	نام اسید	فرمول شیمیایی
هیدرو کلریک اسید(جوهر نمک)	H <sub>3</sub> PO <sub>4</sub>	فسفریک اسید	HCl
سولفوریک اسید(جوهر گوگرد)	CH <sub>3</sub> COOH	استیک اسید(جوهر سرکه)	H <sub>2</sub> SO <sub>4</sub>
نیتریک اسید(جوهر شوره)	C <sub>6</sub> H <sub>8</sub> O <sub>7</sub>	سیتریک اسید	NHO <sub>3</sub>
کربنیک اسید	HCOOH	فرمیک اسید	H <sub>2</sub> CO <sub>3</sub>

فرمول کلی اسیدهای عالی به صورت R-COOH می باشد که عامل آنها COOH است. این عامل یک ظرفیتی می باشد و آن را کربوکسیل می نامند.

## ۷ شناساگرها:

چشیدن یک مایع راه خوبی برای شناسایی یک اسید نیست، روش بهتر استفاده از شناساگرهاست. شناساگر ماده ای است که بسته به اسید یا باز بودن ماده ای مورد آزمایش تغییر رنگ می دهد. بیشتر مواد طبیعی مانند آب کلم و آب انگور سیاه از شناساگرها طبیعی هستند.

لیتموس (تورنسل)، رنگینه ای ارغوانی است که از گلشنک به دست می آید و در اسید به رنگ سرخ در می آید. کاغذ تورنسل کاغذی است که ابتدا در محلول لیتموس خیسانده و سپس خشک شده است. تورنسل (لیتموس). فنول فتالین . برموتیمول بلو. هلیاتین (متیل اورانث) از جمله شناساگرها شیمیایی اند.

شناساگر	محیط اسیدی	محیط بازی	محیط خشی
تورنسل(لیتموس)	قرمز	آبی	بنفش
فل فتالین	بی رنگ	ارغانی	بی رنگ
هلیاتین(متیل اورانث)	قرمز	زرد	نارنجی
برموتیمول بلو	زرد	آبی تیره	آبی کم رنگ

شناساگر فنل فتالین فقط در محیط بازی تغییر رنگ داده به همین علت اختصاصی بازه است. توجه:

برای تشخیص اسیدی یا بازی بودن مواد هیچگاه آنها را نچشید. برای تشخیص اسیدی یا بازی بودن مواد از کاغذ بی اج یا سایر شناسه گرها استفاده نمایید.

## نکات مهم این فصل:

- کلسیم کربنات(آهک)، کلسیم سولفات(گچ) جزء نمک ها هستند اما غیر الکترولیت هستند. چون این مواد در آب حل نشده و یونیزه نمی شوند.
- محلول آب و آهک و محلول آمونیاک خاصیت بازی داشته و شناساگر فنول فتالین در آن ارغوانی می شود.
- اگر پوسته ای آهکی تخم مرغ را در اسید قرار دهیم پوسته آهکی در اسید حل شده و گاز کردن دی اکسید آزاد می شود.
- هر گاه مقداری براده فلزاتی مانند آهن و آلومینیوم را در اسید هیدرو کلریک یاندازیم گاز هیدروژن آزاد می شود و ترکیبی به نام آهن کلرید یا آلومینیوم کلرید حاصل می شود که نوعی نمک هستند.
- برای تشخیص گاز هیدروژن در یک آزمایش کبریت افروخته ای را به ظرف محتوى آزمایش نزدیک می کنیم که مشاهده می شود شعله با صدای انفجار خفیفی خاموش می شود.

## سوالات فصل

۱- جاهای خالی را با کلمات مناسب پر کنید.

- موادی که آمیخته از دو یا چند ماده اند ..... نامیده می شوند.

- بیشتر موادی که با آنها سروکار داریم ..... هستند.

- به مخلوط های همگن ..... می گوئیم.

مخلوط ناهمگنی که در آن ذرات یک جامد بصورت معلق در آب پراکنده اند ..... نامیده می شوند.

- میزان حل شدن گازها در حلال با افزایش فشار ..... می یابد.

۲- جملات صحیح را با علامت ص و جملات غلط را با علامت غ مشخص نمائید.

- در مخلوط، خاصیت اجزاء مخلوط تغییر نمی کند فقط لابه لای هم می روند.

- مقدار نیتروژن هوا ۷۸٪ و اکسیژن ۲۱٪ است. پس می توان گفت نیتروژن حلال و اکسیژن حل شونده است.

- آب و الكل جزء مواد خالص هستند.

- در روش سرریز کردن اجزاء مخلوط با کمک اختلاف در اندازه ذرات ، یعنی ریزی و درشتی ذره ها از هم جدا می شوند.

۳- به سوالات زیر پاسخ علمی مناسب ارائه دهید.

- منظور از ماده خالص چیست؟ پنج ماده خالص بنویسید.

- مواد زیر را به دو دسته خالص و مخلوط دسته بندی کنید.

"دوغ ، مس ، شکر ، سکه"

- اصطلاحات زیر را تعریف کنید.

ماده خالص: ماده ناخالص: حال:

- دو ویژگی مخلوط ناهمگن را بنویسید.

- برای جداسازی مخلوط براده آهن و گوگرد دو را بنویسید.

- ماهی در آب سرد اکسیژن بیشتری دارد یا در آب گرم؟ چرا؟

- عوامل موثر در حل شدن گاز در مایع را نام برد و تاثیر هر یک را بنویسید.

- دو مخلوط مثال بزنید که راه جداسازی آنها صاف کردن باشد؟

- محلول فوق اشباع (فوق سیر شده) را چگونه تهیه می کنند؟

- دو مخلوط مثال بزنید که راه جداسازی آن سرریز کردن باشد.

- روش های جداسازی مخلوط را بنویسید

- نمودارهای زیر را تفسیر کنید.

[www.my-dars.ir](http://www.my-dars.ir)



«دانش آموز گرامی لطفاً به این سؤالات اکتفا ننمایید و مطالب کتاب را نیز با دققت زیاد مطالعه فرمائید به امید موفقیت در امتحانات.»