

فصل ۱

قدر هدایای زمینی را بدانیم



..... ● أَلَمْ تَرَوْ أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَ... (سورة لقمان- آية ۲۰)

آیا ندیدید خداوند آنچه را در آسمان‌ها و زمین است مسخر شما کرده و نعمت‌های آشکار و پنهان خود را به طور فراوان بر شما ارزانی داشته است.

ما در دریا
گروه آموزشی عصر
@ches

فصل یک شبیه یازدهم 122 نکته

www.my-dars.ir

1) گسترش فناوری به میزان دسترسی به مواد مناسب وابسته است، به طوری که کشف و درک خواص یک ماده جدید پرچم دار توسعه فناوری است.

← برای نمونه گسترش صنعت خودرو مدیون شناخت و دسترسی به فولاد است. همچنین پیشرفت صنعت الکترونیک بر اجزایی مبتنی است که از موادی به نام نیمه رساناها ساخته می شوند.

2) علم شیمی را میتوان مطالعه هدف دار، منظم و هوشمندانه رفتار عناصرها و مواد برای یافتن روندها و الگوهای رفتار فیزیکی و شیمیایی آنها دانست.

3) عناصرها در جدول دورهای بر اساس بنیادیترین ویژگی آنها یعنی عدد اتمی Z چیده شده اند.

← در این جدول، عناصرهایی که شمار الکترون های بیرونی ترین لایه الکترونی اتم آنها برابر است، در یک گروه جای گرفته اند.

← این جدول شامل 7 دوره و 18 گروه است.

4) عناصرهای جدول دوره ای را بر اساس رفتار آنها میتوان در سه دسته شامل فلز، نافلز و شبه فلز جای داد.

5) همه 118 عنصر جدول دوره ای شناسایی و توسط آیوپاک تأیید شده است،

www.my-dars.ir

به طوری که هیچ خانه ای در جدول خالی نیست.

6) شناسایی عناصرها با عدد اتمی بیشتر از 118 سبب خواهد شد تا طبقه بندی تازه ای از عناصرها ارائه شود زیرا در جدول دوره ای امروزی، جایی برای آنها پیش بینی نشده است.

7) شارل ژانت شیمی دان فرانسوی در سال 1927 با کنار هم چیدن عنصرهای شناخته شده در زمان خود، الگویی ارائه کرد که بر اساس آن می توان عنصرهای با عدد اتمی بزرگتر از 118 را نیز طبقه بندی کرد.

8) رفتارهای فیزیکی فلزها شامل داشتن جلا، رسانایی الکتریکی و گرمایی، خاصیت چکش خواری، شکل پذیری (مانند قابلیت ورقه و مفتول شدن) و... است .

← در حالیکه رفتار شیمیایی فلزها به میزان توانایی اتم آنها به از دست دادن الکترون وابسته است .

9) هر چه اتم فلزی در شرایط معین آسانتر الکترون از دست بدهد، خصلت فلزی بیشتری دارد و فعالیت شیمیایی آن بیشتر است .

10) مطابق مدل کوانتمومی، اتم را مانند کره ای در نظر میگیرند که الکترون ها پیرامون هسته و در لایه های الکترونی در حال حرکت اند .

← بنابراین میتوان برای هر اتم شعاعی در نظر گرفت و آن را اندازه گیری کرد.

11) بدیهی است که شعاع اتم های مختلف، یکسان نیست و هر چه شعاع یک اتم بزرگتر باشد، اندازه آن اتم نیز بزرگتر است .

12) مقایس ^h نسبی شعاع اتمی لیتیم (الف) و پتاسیم (ب).

www.my-dars.ir

ب

الف

13) هرچه شعاع اتمی یک فلز بزرگتر باشد، آسانتر الکترون از دست میدهد



الف) لیتیم



ب) سدیم



پ) پتاسیم

14) تولید نور، آزادسازی گرمای تشکیل رسوب و خروج گاز نشانه هایی از تغییر شیمیایی هستند.

15) هرچه شدت نور \uparrow یا آهنگ خروج گاز آزاد شده بیشتر باشد، واکنش شیمیایی سریعتر \uparrow و شدیدتر بوده و واکنش دهنده فعالیت شیمیایی بیشتری دارد.


16) در یک گروه، از بالا به پایین شعاع اتمی افزایش میابد، زیرا تعداد لایه های الکترونی بیشتر می شود.

→ در حالیکه در یک دوره، شعاع اتمی عنصرها از چپ به راست کاهش میابد، زیرا در یک دوره، تعداد لایه های الکترونی ثابت میماند در حالی که تعداد پروتون های هسته افزایش میابد. با افزایش تعداد پروتون ها، نیروی جاذبهای که هسته به الکترون ها وارد میکند افزایش یافته و بدین ترتیب شعاع اتم کاهش می یابد.

17) نافلزها در واکنش های شیمیایی برخلاف فلزها تمایل دارند با گرفتن الکtron به آنیون تبدیل شوند.

برای مثال نافلزهای گروه 17 (هالوژن ها) با گرفتن یک الکtron به آنیون با یک بار منفی (یون هالید) تبدیل می شوند.

18) تغییر شعاع اتمی در دوره سوم جدول دوره ای



19) در تولید لامپ چراغ های جلوی خودروها، از هالوژن ها استفاده می شود



کروه آموزش
ماهی درس

20) مقایسه واکنش پذیری هالوژن ها در واکنش با گاز هیدروژن

نام هالوژن	شرایط واکنش با گاز هیدروژن
فلوئور	حتی در دمای -200°C به سرعت واکنش می دهد.
کلر	در دمای اتاق به آرامی واکنش می دهد.
برم	در دمای 200°C واکنش می دهد.
ید	در دمای بالاتر از 400°C واکنش می دهد.

21) جلای نقره ای فلز سدیم در مجاورت هوا به سرعت از بین می رود و سطح آن کدر می شود



22) اگرچه همه فلزها در حالت های کلی رفتارهای مشابهی دارند،

→ اما تفاوت های قابل توجهی میان آنها وجود دارد، به طوری که هر فلز رفتارهای ویژه خود را دارد.

→ برای نمونه، فلز سدیم نرم است و با چاقو بریده شده و به سرعت در هوا تیره میشود اما آهن فلزی محکم است و از آن برای ساخت در و پنجره فلزی استفاده میشود. این فلز با اکسیژن در هوای مرطوب به کندی واکنش میدهد و به زنگ آهن تبدیل میشود. این در حالی است که طلا در گذر زمان جلای فلزی خود را حفظ میکند و همچنان خوش رنگ و درخشان باقی می ماند.

→ فلزهای دسته d نیز رفتاری شبیه فلزهای دسته S و P دارند. آنها نیز رسانای جریان الکتریکی و گرمای هستند، چکش خوارند و قابلیت ورقه شدن دارند. با وجود این، هر یک از این فلزها نیز رفتارهای ویژه ای دارند.

www.my-dars.ir


23) فلزهای دسته d به فلزهای واسطه معروف اند در حالیکه فلزهای دسته S و P به فلزهای اصلی شهرت دارند.

24) فلزهای دسته d دسته های از عنصرهای جدول دوره ای هستند که زیر لایه d اتم آنها در حال پرشدن است. نخستین سری از این فلزها که در دوره چهارم جدول جای دارند.

(25) اغلب فلزات واسطه در طبیعت به شکل ترکیب های یونی همچون اکسیدها، کربناتها و... یافت می شوند.

برای نمونه آهن، دو اکسید طبیعی با فرمولهای FeO و Fe_2O_3 دارد.

(26) فلزهای دسته^d نیز به هنگام تشکیل کاتیون، الکترونهای بیرونی ترین زیر لایه خود را از دست میدهند.



(27) آرایش الکترونی یونهای Fe^{2+} و Fe^{3+} همانند آرایش الکترونی هیچ گاز نجیبی نیست.

→ بررسی ها نشان می دهد که اتم اغلب فلزهای واسطه با تشکیل کاتیون به آرایش گاز نجیب دست نمی یابند.

→ در حالیکه کاتیون حاصل از ▶ فلزهای اصلی اغلب ▶ به آرایش پایدار گاز نجیب ▶ می رسد. ►

(28) فلز طلا به اندازهای چکش خوار و نرم است که چند گرم از آن را می توان با چکش کاری به صفحه ای با مساحت چند متر مربع تبدیل کرد.

(29) رسانایی الکتریکی بالای طلا و حفظ این رسانایی در شرایط دمایی گوناگون،

→ همچنین واکنش ندادن آن با گازهای موجود در هوایکره و مواد موجود در بدن انسان

← □ بازتاب زیاد پرتوهای خورشیدی از جمله ویژگی های خاص طلاست که سبب شده کاربردهای این فلز گسترش یافته و تقاضای جهانی آن روزبه روز افزایش یابد.

(30) اغلب عنصرها در طبیعت به شکل ترکیب یافت می شوند،

- ◀ هرچند برخی نافلزها مانند اکسیژن، نیتروژن، گوگرد و ... به شکل آزاد در طبیعت وجود دارند.
- ◀ وجود نمونه هایی از فلزهای نقره، مس، پلاتین نیز در طبیعت گزارش شده است .
- ◀ البته در میان فلزها، تنها طلا به شکل کلوخه های رگه های زرد لابه لای خاک یافت میشود.

(31) آهن فلزی است که در سطح جهان بیشترین مصرف سالانه را در بین صنایع گوناگون

دارد

← □ آهن اغلب در طبیعت به شکل اکسید یافت می شود.

(32) واکنش پذیری، تمایل یک فلز را برای انجام واکنش شیمیایی نشان میدهد. هرچه فلز واکنش پذیرتر \uparrow باشد، تمایل آن برای انجام واکنش بیشتر \uparrow است.

(33) به طور کلی در هر واکنش شیمیایی که به طور طبیعی انجام میشود، واکنش پذیری

فراورده ها از واکنش دهنده ها کمتر است.

(34) واکنش پذیری هر عنصر به معنای تمایل اتم آن به انجام واکنش شیمیایی است .

□ هرچه واکنش پذیری اتم های عنصری بیشتر باشد، در شرایط یکسان تمایل آن برای تبدیل شدن به ترکیب بیشتر است .

□ هرچه فلز فعال تر باشد، میل بیشتری به ایجاد ترکیب دارد و ترکیب هایش پایدارتر از خودش است .

← به دیگر سخن هرچه واکنش پذیری فلزی بیشتر باشد، استخراج آن فلز دشوارتر است.

□ فلزها از جمله هدایای زمینی هستند که اغلب در طبیعت به شکل سنگ معدن یافت می شوند.

□ چگونه میتوان فلز Fe از Fe_2O_3 استخراج کرد؟

← برای انجام این کار میتوان از واکنش Fe_2O_3 با فلز سدیم یا عنصر کربن بهره برد . از آنجا که دسترسی به کربن آسانتر است و صرفه اقتصادی بیشتری دارد،

در فولاد مبارکه مانند هم^ه شرکت های فولاد جهان، برای استخراج آهن از کربن استفاده میشود.

□ به مقدار فراورده^ه مورد انتظار در هر واکنش، مقدار نظری و به مقدار فراوردهای که در عمل به دست می آید، مقدار عملی می گویند.


□ واکنش های شیمیایی همیشه مطابق آنچه انتظار می رود پیش نمیروند، زیرا ممکن است واکنش دهنده ها ناخالص باشند یا ممکن است واکنش به طور کامل انجام نشود، حتی گاهی نیز همزمان با آن واکنش های ناخواسته^ه دیگری انجام می شود .

www.my-dars.ir

← با این توصیف مقدار واقعی فراورده از انتظار کمتر است. در واقع بازده درصدی واکنش های شیمیایی از صد کمتر ↓ است

41) امروزه مزارع زیادی را برای تهیه سوخت سبز، روغن و خوراک دام به کشت ذرت اختصاص می دهند.

42) یکی از واکنش هایی که در صنعت جوشکاری از آن استفاده می شود واکنش ترمیت است.



43) از فلز آهن مذاب تولید شده در واکنش ترمیت برای جوش دادن خطوط راه آهن استفاده میشود.

44) در اعماق دریاها در برخی مناطق سولفید چندین فلز واسطه و در برخی مناطق دیگر کلوخه ها و پوسته هایی غنی از فلزهایی مانند منگنز، کبات، آهن، نیکل، مس و ... یافت می شود.

45) در استخراج فلز تنها در صد کمی از سنگ معدن به فلز تبدیل میشود.

46) از بازگردانی هفت قوطی فولادی آنقدر انرژی ذخیره میشود که میتوان یک لامپ 60واتی را در حدود 25 ساعت روشن نگه داشت.

47) نفت خام مخلوطی از هیدروکربن هاست.

48) امروزه نفت خام در دنیای کتونی دو نقش اساسی ایفا می کند. نقش نخست آن، منبع تأمین انرژی بوده و در نقش دوم، ماده اولیه برای تهیه بسیاری از مواد و کالاهایی است که در صنایع گوناگون از آنها استفاده میشود.

(49) هر بشکه نفت خام هم ارز با 159 لیتر است.

(50) حدود نیمی از نفتی که از چاه های نفت بیرون کشیده میشود به عنوان سوخت در وسایل نقلیه استفاده میشود.

(51) کمتر از ده درصد از نفت خام مصرفي در دنیا برای تولید الیاف و پارچه، شوینده ها، مواد آرایشی و بهداشتی، رنگ، پلاستیک، مواد منفجره و لاستیک به کار می رود.

(52) نفت خام، مخلوطی از هزاران تر کیب شیمیایی است که بخش عمده آن را هیدروکربن های گوناگون تشکیل می دهند.

(53) عنصر اصلی سازنده نفت خام کربن است.

(54) کربن، اساس استخوان بندی هیدروکربن ها

(55) عنصر کربن در خانه شماره 6 جدول دوره ای جای داشته و اتم آن در لایه ظرفیت خود چهار الکترون دارد. این اتم رفتارهای منحصر به فردی دارد که آن را از اتم دیگر عناصرهای جدول متمايز میسازد. به طوریکه ترکیبهای شناخته شده از اتم کربن، از مجموع ترکیبهای شناخته شده از دیگر عناصرهای جدول دوره ای بیشتر است.

www.my-dars.ir

(56) اتم کربن افرون بر تشکیل پیوند اشتراکی یگانه، توانایی تشکیل پیوندهای اشتراکی دو گانه و سه گانه را با خود و برخی اتم های دیگر دارد .

57) کربن توانایی تشکیل زنجیر و حلقه های کربنی را دارد، به دیگر سخن اتم های کربن میتوانند با پیوند اشتراکی به یکدیگر متصل شوند و زنجیرها و حلقه هایی در اندازه های گوناگون بسازند

58) اتم کربن می تواند با اتم عنصرهای هیدروژن، اکسیژن، نیتروژن و ... به شیوه های گوناگون متصل شده و مولکول شمار زیادی از مواد مانند کربوهیدرات ها، چربی ها، آمینواسیدها، آنزیمهها، پروتئینها و ... را بسازد.

59) □ اتم های کربن میتوانند با یکدیگر به روشهای گوناگون متصل شده و دگر شکلهای متفاوتی مانند گرافیت، الماس و ... ایجاد کنند. این دگر شکل ها ساختارها و خواص متفاوتی دارند.


60) گلووله و میله - فضا پر کن - ساختار لویس



61) اتم کربن افرون بر تشکیل پیوند اشتراکی یگانه، توانایی تشکیل پیوندهای اشتراکی دو گانه و سه گانه را با خود و برخی اتمهای دیگر دارد.




(62) کربن توانایی تشکیل زنجیر و حلقه های کربنی را دارد.



ب



الف




(63) اتم کربن می تواند با اتم عنصرهای هیدروژن، اکسیژن، نیتروژن و ... به شیوه های گوناگون متصل شده و مولکول شمار زیادی از مواد مانند کربوهیدراتها، چربی ها، آمینواسیدها، آنزیم ها، پروتئین ها و ... را بسازد.

(64) آلkan ها دسته ای از هیدروکربن ها هستند که در آنها هر اتم کربن با چهار پیوند یگانه به اتمهای کناری متصل شده است.


(65) متان CH₄ ساده ترین و نخستین عضو خانواده آلkanهای است.

(66) در هر آلkan راست زنجیر هر اتم کربن به یک یا دو اتم کربن دیگر متصل است، در حالیکه در آلkan شاخه دار، برخی کربن ها به سه یا چهار اتم کربن دیگر متصل اند.


(67) الف) دو نمونه آلkan راست زنجیر و ب) دو نمونه آلkan شاخه دار



الف



این اتم کربن به چهار اتم
کربن دیگر متصل است



این اتم کربن به سه اتم
کربن دیگر متصل است

ب

www.my-dars.ir

(68) در نمایشی ساده‌تر، فرمول نقطه – خط را به کار می‌برند. در این روش، اتم‌های کربن را با نقطه و پیوند بین آنها را با خط تیره نشان میدهند



اما اتمهای هیدروژن نشان داده نمی‌شوند




(69) شمار اتمهای کربن نقش مهمی در رفتار هیدروکربن‌ها دارد. به طوریکه با تغییر تعداد اتم‌های کربن، اندازه و جرم مولکول‌های هیدروکربن تغییر می‌یابد و در پی آن نیروی بین مولکولی، نقطه‌جوش و... تغییر می‌کنند.

(70) برخی ویژگیها و رفتارهای فیزیکی و شیمیایی آلکانهای راست زنجیر با توجه به تعداد کربن آن‌ها



(71) نقطه‌جوش و جرم مولی آلکان‌ها



72) آلکانها به دلیل ناقطبی بودن در آب نامحلول اند.

← □ این ویژگی سبب می شود تا بتوان از آنها برای حفاظت از فلزها استفاده کرد. به طوری که قرار دادن فلزها در آلکان های مایع یا اندود کردن سطح فلزها و وسایل فلزی با آنها، مانع از رسیدن آب به سطح فلز می شود و از خوردگی فلز جلوگیری می کند.

73) □ ویژگی مهم و برجسته آلکانها این است که در ساختار آنها هر اتم کربن با چهار پیوند اشتراکی به چهار اتم دیگر متصل بوده و به اصطلاح سیرشده هستند. از این رو آلکانها تمایل چندانی به انجام واکنشهای شیمیایی ندارند. این ویژگی سبب می شود تا میزان سمی بودن آنها کمتر شده و استنشاق آنها بر ششها و بدن تأثیر چندانی نداشته باشد تنها سبب کاهش مقدار اکسیژن در هوای دم میشوند.

← □ با وجود این هیچ گاه برای برداشتن بنزین از باک خودرو یا بشکه از مکیدن شیلنگ استفاده نکنید، زیرا بخارهای بنزین وارد شش ها شده و از انتقال گازهای تنفسی در شش ها جلوگیری میکند و نفس کشیدن دشوار میشود.

74) نام و فرمول مولکولی ده آلکان راست زنجیر

فرمول مولکولی	نام	نم	متان	اتان	پروپان	بوتان	پنتان	هگزان	اوکتان	نونان	دکان
C_1H_2	C_2H_6	C_3H_8	C_4H_{10}	C_5H_{12}	C_6H_{14}	C_7H_{16}	C_8H_{18}	C_9H_{20}	$C_{10}H_{22}$		

75) مطابق جدول بر اساس قواعد آیوپاک برای نامیدن آلکان راست زنجیر کافی است شمار اتم های کربن را با پیشوند معادل بیان کرده و پسوند «آن» را بیفزایید. توجه کنید که در چهار عضو نخست آلکانها، پیشوندی که شمار اتمهای کربن را معلوم کند، وجود ندارد و نام آنها بر اساس این روش انتخاب نشده است.

76) پیشوند نامگذاری آلکانها

تعداد کربن	پیشوند
۵	پنت
۶	هگز
۷	هبت
۸	اوكت
۹	نون
۱۰	دک

77) شاخه فرعی

فرمول شاخه فرعی (آلکیل)	نام شاخه فرعی
$-CH_3$	متیل
$-CH_2CH_3$	اتیل

78) پیشوند های تعداد شاخه ها

معنی	پیشوند
دو	دی
سه	تری
چهار	تترا

79) برای نامگذاری آلکانها باید نخست نام زنجیر اصلی را براساس نام آلکان راست زنجیر نوشته سپس نام شاخهٔ فرعی را به صورت آلکیل پیش از نام زنجیر اصلی بنویسید. البته باید محل شاخهٔ فرعی را با شمارهٔ کربنی که به آن متصل است، نیز پیش از نام شاخهٔ فرعی مشخص کنید.

80) آلکن‌ها، هیدروکربنهایی با یک پیوند دوگانه این هیدروکربنهای در ساختار خود یک پیوند دوگانهٔ کربن $C=C$ دارند.

81) برای نامگذاری آلکن‌های راست زنجیر، کافی است پسوند «آن» را در نام آلکان راست زنجیر بردارید و به جای آن پسوند «-ن» قرار دهید؛ سپس محل پیوند دوگانه را با شمارهٔ نخستین کربنی که به پیوند دوگانه متصل است، مشخص کنید.

82) اتن نخستین عضو خانوادهٔ آلکن‌هاست. این ماده در بیشتر گیاهان وجود دارد. موز و گوجه فرنگی رسیده گاز اتن آزاد می‌کنند. اتن آزاد شده از یک موز یا گوجه فرنگی رسیده به نوبه خود موجب رسیدن سریعتر میوه‌های نارس می‌شود. به همین دلیل در کشاورزی، از گاز اتن به عنوان «عمل آورنده» استفاده می‌شود.

83) در گذشته گاز اتن را با نام گاز اتیلن می‌خوانند.

84) رفتار آلکن‌ها همانند همه مواد به ساختار آنها وابسته است.

← وجود پیوند دوگانه در آلکن‌ها سبب شده است تا رفتار آنها با آلکان‌ها تفاوت زیادی پیدا کند. به گونه‌ای که آلکن‌ها برخلاف آلکان‌ها، واکنش پذیری بیشتری دارند و در واکنش‌های گوناگونی شرکت می‌کنند.

← واکنش پذیری زیاد آلکن‌ها به این دلیل است که در ساختار آنها دو اتم کربن به سه اتم دیگر متصل بوده و از این رو «سیر نشده» هستند؛ این در حالی است که اتم کربن تمایل دارد تا از حداکثر امکان خود برای تشکیل پیوندهای یگانه استفاده کند و چهار پیوند یگانه تشکیل دهد.


85) گاز اتن سنگ بنای صنایع پتروشیمی است؛ زیرا در این صنایع با استفاده از اتن حجم انبوهی از مواد گوناگون تولید می‌شود.

(86) وارد کردن گاز اتن در محلول آب و اسید در شرایط مناسب، اتانول را در مقیاس صنعتی تولید می‌کنند.




(87) اتانول، الکلی دوکربنی، بی رنگ و فرار است که به هر نسبتی در آب حل می‌شود. این الکل یکی از مهمترین حلالهای صنعتی است که در تهیه مواد دارویی، بهداشتی و آرایشی به کار می‌رود. از اتانول در بیمارستانها به عنوان ضدعفونی کننده استفاده می‌شود.

(88) اتانول



(89) صنعت پتروشیمی یکی از صنایع مهم جهان است. در این صنعت، ترکیبها، مواد و وسایل گوناگون از نفت یا گاز طبیعی بهدست می‌آیند که به فراورده‌های پتروشیمیایی معروف هستند.



(91) مولکول برم به پیوند دو گانه کربن در مولکول اتن افزوده می‌شود، و فراورده‌ای سیرشده پدید آمده است. همه آلکن‌ها در این واکنش شرکت می‌کنند به گونه‌ای که این واکنش یکی از روش‌های شناسایی آنها از هیدروکربن‌های سیرشده است.

92) واکنش تکه ای گوشت چرب با بخار برم



93) پلیمری شدن دست دیگری از واکنش آلکن هاست که با استفاده از آن میتوان انواع لاستیک ها، الیاف و پلیمرهای سودمند را تهیه کرد.

94) در جوش کاربیدی از سوختن گاز اتین، دمای لازم برای جوشادن قطعه های فلزی تأمین می شود.

95) اتین هیدروکربنی است که در ساختار خود یک پیوند سه گانه کربن - کربن دارد.

96) به هیدروکربنهای سیر نشده با یک پیوند سه گانه کربن - کربن، آلكین گفته میشود. برای نامگذاری آنها به جای پسوند «آن» در نام آلکان هم کربن، پسوند «ین» قرار می گیرد.

97) اتین با فرمول مولکولی C_2H_2 ساده ترین آلكین و پروپین دومین عضو خانواده آلكین ها است.

(98) مدل گلوله – میله اتین




(99) آلکین ها واکنش پذیری زیادی دارند و با مواد شیمیایی مختلف واکنش می دهند.

(100) ترکیب های آلی بسیاری شناخته شده است که در آنها اتم های کربن طوری به یکدیگر متصل شده اند که ساختاری حلقوی به وجود آورده اند.



← □ سیکلو Cyclo پیشوندی به معنای حلقوی است که برای نامگذاری برخی ترکیب های آلی حلقوی به کار می رود

(101) سیکلو هگزان




(102) بنزن، هیدروکربنی سیرنشده با فرمول مولکولی C_6H_6 و سرگروه خانواده مهمی از هیدروکربن ها به نام آروماتیک است. نفتالن نیز از جمله این ترکیب هاست. نفتالن $C_{10}H_8$ مدت ها به عنوان ضدبیکاری نگهداری فرش و لباس کاربر داشته است.

بنزن (103)



نفتالن (104)




105) نفت خام مخلوطی از هیدروکربن های گوناگون، برخی نمکها، اسیدها، آب و... است. البته مقدار نمک و اسید در نفت خام کم بوده و در نواحی گوناگون متغیر است.

106) آلкан ها بخش عمدۀ هیدروکربن های موجود در نفت خام را تشکیل میدهند و به دلیل واکنش پذیری کم اغلب به عنوان سوخت به کار می روند.


www.my-dars.ir

107) بیش از 90درصد نفت خام صرف سوزاندن و تأمین انرژی میشود و تنها مقدار کمی از آن به عنوان خوراک پتروشیمی در تولید مواد پتروشیمیایی به کار می رود.

108) نسبت میزان سوخت و خوراک پتروشیمی در یک بشکه از نفت خام



109) مقایسه چهار نوع نفت خام بر اساس مواد و اجزای سازنده



110) پالایش و تقطیر جز به جز نفت خام

← □ پس از جدا کردن نمکها، اسیدها و آب، نفت خام را پالایش می کنند.

www.my-dars.ir

← □ در واقع با استفاده از تقطیر جزء به جزء، هیدروکربن های آن را به صورت مخلوط هایی با نقطه جوش نزدیک به هم جدا می کنند.

← □ برای این کار، نفت خام را درون محفظه ای بزرگ گرما میدهند و آن را به برج تقطیر هدایت میکنند. برجی که در آن از پایین به بالا دما کاهش می‌یابد.

← □ هنگامی که نفت خام داغ به قسمت پایین برج وارد میشود، مولکولهای سبک‌تر و فرارتر از جمله مواد پتروشیمیایی، از مایع بیرون آمده و به سوی بالای برج حرکت می‌کنند.

← □ به تدریج که این مولکول‌ها بالاتر میروند، سرد شده و به مایع تبدیل میشوند و در سینی‌هایی که در فاصله‌های گوناگون برج قرار دارند وارد شده و از برج خارج میشوند. بدین ترتیب مخلوط‌هایی با نقطه جوش نزدیک به هم از نفت خام جداسازی می‌شوند.

111) زغال سنگ یکی از سوختهای فسیلی است.

← □ برآوردهانشان میدهد که طول عمر ذخایر زغال سنگ به 500 سال می‌رسد.

← □ از این رو زغال سنگ میتواند به عنوان سوخت، جایگزین نفت شود. اما جایگزینی نفت با زغال سنگ سبب ورود مقدار بیشتری از انواع آلاینده‌ها به هوایکره شده و تشدید اثر گلخانه‌ای می‌شود.

112) مقایسه بنزین با زغال سنگ


نام سوخت	گرمای آزاد شده (kJ/g)	فرآورده‌های سوختن	مقادیر کربن دی‌اکسید به ازای هر کیلوژول انرژی تولید شده (g)
بنزین	۴۸	$\text{CO}_\text{f} + \text{CO} + \text{H}_\text{f} \text{O}$	۰/۶۵
زغال سنگ	۳۰	$\text{SO}_\text{f} + \text{CO}_\text{f} + \text{NO}_\text{f} + \text{CO} + \text{H}_\text{f} \text{O}$	۰/۱۰۴

113) راه های بهبود کارایی زغال سنگ

← □ شست وشوی زغال سنگ به منظور حذف گوگرد و ناخالصی های دیگر

← □ به دام انداختن گاز گوگرد دی اکسید خارج شده از نیروگاهها با عبور گازهای خروجی از روی کلسیم اکسید

114) به دام انداختن گاز گوگرد دی اکسید خارج شده از نیروگاه ها با عبور گازهای خروجی از روی کلسیم اکسید



115) یکی از مشکلات زغال سنگ، شرایط دشوار استخراج آن است.

← □ به گونه ای که در سده اخیر بیش از 500000 نفر در سطح جهان در اثر انفجار یا فروریختن معدن جان خود را از دست داده اند.

← □ این انفجارهای اغلب به دلیل تجمع گاز متان آزاد شده از زغال سنگ در معدن رخ می دهد.

116) متان گازی سبک، بی بو و بی رنگ است و هرگاه مقدار آن در هوای معدن به بیش از 5 درصد برسد، احتمال انفجار وجود دارد.

117) سوخت هوایپما از پالایش نفت خام در برجهای تقطیر پالایشگاه ها تولید میشود. این سوخت به طور عمده از نفت سفید که مخلوطی از آلkan هاست تهیه میشود.

118) نفت سفید شامل آلkan هایی با ده تا پانزده کربن است.

www.my-dars.ir


119) یکی از مسائل مهم در تأمین سوخت، انتقال آن به مراکز توزیع و استفاده آن است که در حدود 66 درصد آن از طریق خطوط لوله و بقیه

با استفاده از راه آهن، نفت کش جاده پیما و کشتی های نفتی انجام می شود.

120) سیلیسیم عنصر اصلی سازنده سلولهای خورشیدی است که از این واکنش تهیه می‌شود.



121) روند کلی تغییر واکنش پذیری عنصرهای دوره دوم جدول دوره ای



122) تیتانیم فلزی محکم، کم چگال و مقاوم در برابر خوردگی است. یکی از کاربردهای آن استفاده در بدنه دوچرخه است

ما در 
گروه آموزشی عصر